

De 1

19257/B

E xv h

18

J. E. Duncan

Xmas 1902

Handwritten text, possibly a date or reference number, appearing as "1820" or similar.

Handwritten text, possibly a name or title, appearing as "Xmas" or similar.

Dr. Charles Ogilvie

45574

SYNOPSIS

NOSOLOGIÆ METHODICÆ,

EXHIBENS

CLARISS. VIRO RUM

SAUVAGESII, LINNÆI, VOGELII,

SAGARI, MACBRIDII, ET

CULLENI

SYSTEMATA NOSOLOGICA:

AUCTORE

GULIELMO CULLEN, M. D.

EDITIO SEPTIMA.

EDINBURGI,
VENEUNT APUD ROSS & BLACKWOOD;
LONDINI,
APUD LONGMAN & REES.

1802.



EXCUDERANT C. STEWART, ET SOCIJ,
ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.

LECTORI.

Hic habes, lector studiose, opus magnum celeberrimi Auctoris, jam septima vice vulgatum, et uno volumine compressum. In prioribus editionibus, distributio methodica non semper obvia est, et sensus haud raro obscurus, vitia haud dubie orta ex cupiditate Bibliopolarum, quibus magis librum magnae molis edere, quam famae auctoris, vel commoditati lectoris consulere, semper cordi est. In hac, ab ipsa concinnitate et compressione typographica, dispositio methodica multo dilucidior fit, et ad usum accommodatior. In Systematis Vogelii et Sagari, observationes quasdam, quae definitiones generum onerant et obfuscant, vel diverso caractere distinxi, vel in notis collocavi; et in systemate ipsius auctoris, dispositionem, quam in versione ejus Anglica, a me nuper facta, secutus sum, ut plurimum observavi. Tabulam, denique, synopticam, Classium, Ordinum et Generum adjeci, qua systema Cullenianum, uno conspectu, facilius pateat.

Quum a Medicis fere omnibus, systema de quo agitur caeteris anteponatur, supervacaneum forte videri potest, systemata Sauvagesii aliorumque iterum in lucem trudere. Sed, ut praetermittam quae in Prolegomenis ab auctore proferuntur, bene notum est peritis, morbum, qui in uno systemate quovis ad suum genus difficilius refertur, in alio saepe facillime et certe locum proprium occupare. Maxime igitur prodest varia systemata suppeditare, a quibus auxilium petere licebit, siquando systema, quo utimur, investigationibus rite absolutis defecerit.

C. S.

Litera S. indicat genus vel speciem Sauvagesii, et ubi deest litera initialis, species ad systema ejusdem auctoris referenda est.

PARS PRIMA.

GENERA MORBORUM

DEFINITA

AB ERUDITISSIMO
FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

EX NOSOLOGIA METHODICA, 2 TOM 4to

AMSTEL. 1768.

S E R I E S
CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

- ORDO I. Maculæ.
- II. Efflorescentiæ.
- III. Phymata.
- IV. Excrefcentiæ.
- V. Cystides.
- VI. Ectopiæ.
- VII. Plagæ.

CLASSIS II. FEBRES.

- ORDO I. Continuæ.
- II. Remittentes.
- III. Intermittentes.

CLASSIS III. PHLEGMASIÆ.

- ORDO I. Exanthematicæ.
- II. Membranaceæ.
- III. Parenchymatofæ.

CLASSIS IV. SPASMI.

- ORDO I. Tonici partiales.
- II. Tonici generales.
- III. Clonici partiales.
- IV. Clonici generales.

CLASSIS V. ANHELATIONES.

- ORDO I. Spasmodicæ.
- II. Oppressivæ.

CLASSIS VI. DEBILITATES.

- ORDO I. Dyſæſtheſiæ.
 II. Anepithymiæ.
 III. Dyſcineſiæ.
 IV. Leipopſychiæ.
 V. Comata.

CLASSIS VII. DOLORES.

- ORDO I. Vagi.
 II. Dolores capitis.
 III. Dolores pectoris.
 IV. Dolores abdominales interni.
 V. Dolores externi et artuum.

CLASSIS VIII. VESANIÆ.

- ORDO I. Hallucinationes.
 II. Morositates.
 III. Deliria.
 IV. Vefaniæ anomalæ.

CLASSIS IX. FLUXUS.

- ORDO I. Sanguifluxus.
 II. Alviſfluxus.
 1. *Sanguinolenti.*
 2. *Non Sanguinolenti.*
 III. Serifluxus.
 IV. Aëriſfluxus.

CLASSIS X. CACHEXIÆ.

- ORDO I. Macies.
 II. Intumeſcentiæ.
 III. Hydropes partiales.
 IV. Tubera.
 V. Impetigines.
 VI. Icteritiæ.
 VII. Cachexiæ anomalæ.

GENERA MORBORUM

CLASSIS I. VITIA.

CHARACTER. Symptomata cutanea levidentia,
vel mechanicis chirurgiæ auxiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

LEUCOMA. (1)

Macula opacans corneam.

VITILIGO. (2)

Macula corymbosa, seu ex minoribus maculis composita,
cum depreffione cutis.

EPHELIS. (3)

Maculae acquisitæ, umbrinæ, glabræ, corymbosæ, faciem
vel tibias, rarius partes tectas, afficientes.

GUTTA ROSEA. (4)

Maculae faciei rubræ, guttatæ, parum prominentes, aut
asperæ, et diu permanentes.

NÆVUS. (5)

Macula congenita, quæ vulgo tribuitur vehementi cupidi-
tati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quando-
que cum partis eminentia.

ECCHYMOMA. (6)

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livefcens, successu
temporis flavefcens, non congenita, nec aspera, sed plana,
aut parum promineas, et subfolitaria.

ORDO

ORDO II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humores exiguï gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, simileſve aſperitates. *

HERPES. (7)

Efflorefcentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginofis, in ſquamas furfuraceas, raro cruſtaceas, abeuntibus.

EPINYCTIS. (8)

Phlyctænæ atro-rubræ, aggregatæ, trium vel quatuor linearum in diametro, tibiaſ ut plurimum aſſicientes, et noctu potiſſimum acriter pungentes.

PSYDRACIA. (9)

Phymata eryſipelatoſa.

HIDROA. (10)

Exanthemata miliaria phlyctænoidea.

ORDO III. PHYMATA.

Tumores humores, notabiles, ſolitarii.

ERYTHEMA. (11)

Tumor ſine febre, ſuperficiarius, ſolitarius, diffuſus, rubro roſeus, preſſione evaneſcens.

CEDEMA. (12)

Tumor diffuſus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

EMPHYSEMA. (13)

Tumor diffuſus, elatiſcus, preſſione crepitans, cuti concolor.

SCIRRHUS. (14)

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

PHLEGMONE. (15)

Tumor ſpheroideus, rubore, calore, tenſione, dolore pulſatili inſignis, ſponte in ſuppurationem vergens.

BUBO. (16)

Tumor partim ſcirrhoſus, partim inflammatorius, glandulæ unius aut alterius inguinalis.

PAROTIS.

* a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

b. Papula. Phyma parvulum deſquamari ſolitum.

c. Phlyctæna. Vesicula ſtuido ſeroſo plena.

d. Varus. Tuberculum durum conſtans.

PAROTIS. (17)

Tumor scirrhuso-phlegmonodeus glandulæ parotidis dictæ in suppuratum lentissimè vergens.

FURUNCULUS. (18)

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum suppuratus est, occupant fibræ crassæ, qui in pus non colliquesunt.

ANTHRAX. (19)

Phyma apice gangrænosum, ambitu inflammatum.

CANCER. (20)

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

PARONYCHIA. (21)

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

PHIMOSIS. (22)

Phlegmone præputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

ORDO IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lentè crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

SARCOMA. (23)

Excrefcentia carnis consistentiam circiter obtinens.

CONDYLOMA. (24)

Excrefcentia firma carnibus durior, ossibus mollior.

VERRUCA. (25)

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens.

PTERYGIUM. (26)

Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vasculosa, ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, et versus corneam se extendens.

HORDEOLUM. (27)

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, rarè rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphæricus, piso ut plurimum minor.

BRONCHOCELE. (28)

Excrefcentia vel tumor scirrhusus anticæ partis colli.

EXOSTOSIS. (29)

Tumor ossis vel totalis vel partialis.

EXCRESCENTIÆ.

GIBBOSITAS. (30)

Offium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distortionē, aut alio principio oriunda.

LORDOSIS. (31)

Offium distortio, unde hinc protuberant, inde verò excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ defleſcunt.

ORDO V. CYSTIDES.

Protuberantiæ factæ à fluidis intra membranas proprias vel alienas maximè dilatatas contentis, vel receptacula quævis distendentibus.

ANEURISMA. (32)

Cystis arteriosa.

VARIX. (33)

Cystis venosa.

HYDATIS. (34)

Cystis lymphæductuum.

MARISCA. (35)

Tumores in ani margine enati, rubri, sæpe dolentes, et cruorem sæpe fundentes, sponte dein recedere soliti.

STAPHYLOMA. (36)

Cystis aquosa a corneæ proptosi, et dilatatione, vel ab uveæ hernia trans foramen corneæ elapsa.

LUPIA. (37)

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

HYDARTHROS. (38)

Cystis articuli aquosa.

APOSTEMA. (39)

Cystis purulenta.

EXOMPHALUS. (40)

Cystis umbilicalis sæpius aquosa.

OSCHEOCELE. (41)

Cystis in seroto.

ORDO

SAUVAGES. VITIA.

ORDO VI. ECTOPIÆ.

Partium solidarum è sua fede dimotio sensibus obvia.

Ptofes, Celes, Pararthremata, *Græc.*

Prolapsus, Herniæ, Aberrationes, Luxationes, *Lat.*

EXOPHTHALMIA. (42)

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibilibiter nativa ipsius magnitudine.

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerb. de Morb. Ocul. pars II. cap. 5.*

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buphthalmia, Ophthalmoptosis, Ecpiesmus *Græcorum. Mauchart, diss. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter Haller. Disput. Chir. tom. 1.*

Grosſeur contre Nature, Hydropisie, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan, part II. chap. 6. ; Saint Yves, Part. II. chap. 1.*

BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii.* (43)

Palpebræ utriusque vel alterutrius elongatæ, retractæ, introversæ, vel extroversæ ectopia.

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.* Palpebræ superioris casus, Retractio, Palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, enaillement des paupieres, trichiasis avec introversion des tarses. Vide *Platner, Instit. Chirurg. § 577. § 584. ; Maitre-Jan, part. III. chap. 18. 19. 20. 21. ; Saint Yves, part. I. chap. 8. 9. 10. ; Dionis, Dem. 6. ; Boerb. de Morb. ocul. part. I. cap. 5. , Heister. Chir. tom. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48. ; Gorter. Chir. reparg. lib. 5. cap. 10.*

HYPOSTAPHYLE. (44)

Gurgulionis seu uvulæ laxatæ, inflammatae, ulceratae, in-craſſatae, attenuatae, bicornis, procidentia.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretæi, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellæ.*

Uvulæ prolapsus, *Nenter. tab. 25. cap. 8.*

Uvula nimium producta, *Heister, Chir. tom. 2. p. 659.*

Uvulæ inflammatio, catarrhus, paralysis, casus, *Gorter, Praxis Med. Syst. p. 165.*

Relachement de la luette, *Dionis, Dem. V.*

PARA-

PARAGLOSSE. (45)

Linguae motu deglutitorio in fauces revolutæ vel ore extrusæ, exundantis, exertæ ectopia.

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen. Method. med. libr. xiv. Valeſci de Taranta Philon. lib. 2. c. 59.; Marc. Donat. Med. Hiſtor. Mirab. lib. 3. cap. 4.*

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Gloſſocele *Gaubii Pathol. § 242. ; Linguae extruſio, Idem, § 254.*

Renverſement de la langue dans le goſier, *Petit. Mem. de l'Acad. des Sc. 1742.*

PROPTOMA. (46)

Partis externæ, etiam ante lapſum conſpicuæ, et a palpebris, bulbo oculi, lingua, ac gurgulione, diverſæ procidentia.

EXANIA. (47)

Sphincteris ani, et inteſtini recti inverſi, procidentia.

Proctocele *Pathol. Meth. edit. 3.*

Morbus pœnalis Gerhamenſium, lib. Regum I. cap. 5.

Prolapſus ani *Auſtorum, ut Plaſeri, Prax. lib. ii. cap. 2. Nenter, tab. 126, &c.*

Chute de fondement *Dionis, Dem. iv. p. 392.; Arnaud des Hernies, tom. i. cap. 28.; Levret obſ. ſur les polypes, ſect. 3. p. 165.*

EXOCYSTE. (48)

Membranæ tum veſicæ corpus, tum ipſius collum, interne obveſcientis procidentia, per meatum urinarium facta.

Prolapſus, inverſio veſicæ urinarie *Auſtorum; Salzmanni diſſ. de Hern. veſicæ inter Halleri Diſp. Sel. tom. iii.; Solingen de mulierum et infant. morb. chir. p. 741.*

Renverſement de la veſſie urinaire, *Noel obſ.; Recherches ſur la Hernie de la veſſie par Verdier; Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 2.*

HYSTEROPTOSIS. (49)

Uteri vel vaginæ procidentia.

Hysterocelus nudæ *Pathol. Method. edit. 3.*

Relaxatio, prolapſus, procidentia, inverſio uteri vel vaginæ *Auſtorum, ut Heiſteri Inſt. Chir. tom. 2.; Gunzii de Herniis, &c.*

Relachement, chute, deſcente, renverſement de la matrice ou du vagin. *Arnaud, tom. i. cap. 24, &c.; Puzos ſur les maladies de la matrice; Sabatier, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom. 3.*

ENTEROCELE. (50)

Hernia intestini.

EPIPLOCELE. (51)

Hernia omenti.

GASTROCELE. (52)

Ventriculi trans laxatos, diductos, regionis epigastricæ parietes, imo et per umbilici annulum elapsi ectopia herniosa.

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad *Doring*. p. 915; *Blegney* *Zod. med. Gall. ann. i. Febr. Obs. 2.* pag. 44; *Gunzii* libell. de hern. cap. 20. *Ign. la Chauffe* *Diff. de hernia ventrali*, et *Kirschbaum* *Diff. de hern. ventriculi in disp. Chir. Haller*, tom. 3. *Diff. 68, 69.*

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, p. 121; *Arnaud* *Tr. des hernies*, pref. p. 81; *Sharp* *Rech. Crit.* cap. i.; *Garengot*, *Mem. de l'Acad. R. de Chir.* tom. 1. p. 703.

HEPATOCELE. (53)

Hepatis trans laxatos, diductos in umbilici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

Hernia hepatis, *E. N. C. Dec. i. Ann. ii. et Dec. ii. Ann. vii. Bobnii* *Chir. rational.* p. 230. *Gunzii* *Libell. de hern.* p. 4.

Hernie du foye, *Arnaud* *des hern.* tom. 1.

SPLENOCELE. (54)

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, *epist. lv.* p. 999; *Spigelii* *de corp. hum. fabric. lib. 8. cap. 14*; *Ruyseii* *Advers. Anat. Dec. ii. p. 23.* *Gunzii* *Libell. de hern.* p. 4.

Hernie de la Rate, *Arnaud* *des hern.* tom. 1. p. 29.

HYSTEROCELE. (55)

Uteri trans annulos inguinales, ut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

Hernia uteri *Sennert.* lib. 4. *Med. Pract. part ii. sect. ii. cap. 17*; *Doringii* *epist. ad G. Fabr. Hildanum* *de hernia uterina*, p. 893; *Graaf.* *de mulier. organ. cap. 8*; *Ruyseb. Adv. Dec. ii. p. 23.*

Hernie de la Matrice, *Arnaud* *des hernies*, tom. 1. p. 29; *Sabatier* *Mem. de l'Acad. R. de Chir.* tom. 3.

CYSTOCELE. (56)

Vesicæ urinaricæ trans annulos inguinales, sub arcubus cruralibus,

CYSTOCELE.

ralibus, et per laxatos, diductos perinæi, hypogastrii, necnon vaginæ parietes elapsæ ectopia herniosa.

Hernia cystica *quorundam*. *Platner*. *Inst. Chir.* *Ign. la Chaussée* de hern. ventrali.

Hernia vesicæ urinariæ *Salzmanni* *Diff. inter Halleri* *Disp. Chir.* tom. 3. diff. 72; *Gunzii* *Libell.* de hern. &c.

Hernie de la vessie urinaire *Mery*. *Mem. de l'Acad. R. des Sc.* 1713; *Garengot* *Oper. de Chir.*; *Leuret* *Obs.* sur les Polypes; *Sharp* *Rech. Crit.*; *Verdier* *Mem. de l'Acad. R. de Chir.* tom. 2.

ENCEPHALOCELE, (57)

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo Encephali, per ossum cranii non penitus ossificatorum hiatus prorumpentis, ectopia herniosa.

Hernia cerebri, *Reisselii* *Eph. N. C.* Dec. ii. Ann. ii. *Obs.* 115; *Lechellii* *ibid.* *Obs.* 158; *Treu* *Comm. Litt.* 1738, *Hebd.* 52. n. 3; *Taconi* *Diff. de humano monstro Bononæ nato*; *Corvini* *Diff. de hern. Cerebri, inter Halleri, Disp. Chir.* tom. 2. diff. xlvii.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* *Obs. de Chir.* *Obs.* 1.

HYSTEROLOXIA. (58)

Uteri, sæpius gravidi, et contra quam in hysterocèle fit, abdominis claustris contenti situs in obliquum errans.

Obliquitas uteri *Rædereri*, *Elem. art. Obstetric.* sect. 449 — 507; *Leuret* *Observ. sur les Accouch.*

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap. 46, 57, 48; *Ruysschii*, *observ.* xcvi.

Inclinaison, obliquité de le matrice, *Sabatier*, *Mem. de l'Acad. de Chir.* tom. 3, &c.

PARORCHIDIUM. (59)

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post nativitatem sedes naturalior scrotum est, situs in alienum aberrans.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felic. Plateri* *Mantiss. Observ.*; *Ambr. Paræi* lib. vii; *Thom. Bartholini* *Hist. Anat.*; *Morgagn.* *Advers.* iv; *Dionis* *Oper. de Chir.* Dem. iv; *Quelmalzii* *inter Halleri* *Disput. Anatom.* tom. 5. differt. 1; *Verdier* *sur la Hernie de la Vessie*, *Mem. de l'Acad. R. de Chir.* tom. 2.

EXARTHREMA, (60)

Separatio contigui in ossium articulis diarthrolice, non vero immobiliter combinatis.

Exarthrosis, Parathrema *Græc.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister.* *Inst. Chir.* tom. 1; *Boerb.*

EXARTHREMA.

Boerb. Aph. Comment. tom. 1; Gorter. Chir. repurgat. cap. 6; Platner. Inst. Chir. sect. 1096—1213.

Luxation, entorse, Petit Malad. des Os, tom. 2; Coll de Villars Chir. tom. 5; de la Faye Princ. de Chir.; Duverney Malad. des Os, tom. 2.

DIASTASIS, (61) Græc.

Offium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

Offium recessus, Latin; Petit. tom. 2. cap. 8, et 13; La Faye Princ. de Chir. p. 474; Duverney tom. 2. c. 1 et 5.

LOXARTHROS. (62)

Offium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

Perversio capitis offium ac muscutorum appensorum, Duverney, tom. 2. cap. 2.

Artis vari Duverney, tom. 2. cap. 2.

Gibbositas scapularis Auctorum.

ORDO VII. PLAGÆ.**Solutiones continui.****VULNUS. (63)**

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

PUNCTURA. (64)

Continui solutio intus tantum extensa.

EXCORIATIO. (65)

Cuticulæ vel cutis à carnibus subjectis separatio.

CONTUSIO. (66)

Textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio, ecchymoma sæpius inferens.

FRACTURA. (67)

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohærentia.

FISSURA. (68)

Separatio ossis in duas partes rima tantum dissitas, et alterutro saltem extremo cohærentes.

RUPTURA.

RUPTURA. (69)

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum, solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

AMPUTATURA. (70) *Il Lin. G. 241.*

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum osseis, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo trunco.

ULCUS. (71) *Il Lin. G. 241.*

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

EXULCERATIO. (72)

Excoriatio ulcerosa suppurans.

SINUS. (73)

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus, sæpe multiplex definit in angustum orificium.

FISTULA. (74)

Cavitas ulcerosa, finuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

RHAGAS. (75)

Solutio continui sicca in partium marginibus.

ESCHARA. (76)

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

CARIES. (77)

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio, et subsequens fragilitas ac erosio.

ARTHROCACE. (78)

Ulcus medullæ ossium, sæpius in epiphyfis, cum carie, exostosi, et dolore.

CLASSIS II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam à virium vitalium gradu foret expectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Impetus febrilis à frigore sæpius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat.

EPHEMERA. (79)

Decursus ægritudinis intra dimidiam septimanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

SYNOCHA. (80)

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

SYNOCHUS, (81) Galeni.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

TYPHUS, (82) Hippocratis 1. et 2. de intern. affect. Fœtii 553.

Decursus ultra duas septimanas, sæpius tres, cum calore et urina sanorum similibus, pulsuque quoad frequentiam sano ferè simili, et quoad robur non majori, artubus interea maximè prostratis.

HECTICA, (83) Galeni et ejus Sequacium; Sydenhami, p. 524.

Decursus ultra mensem, debilitas parva, pyrexia exigua, cum pulsu post partum frequentiori.

ORDO

ORDO II. REMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit et decrescit,
non omnino recedit, typus sæpe confusus.

AMPHIMERINA. (84)

Remissio quotidianæ typum servat. Exacerbationes cum
horrore.

TRITÆOPHYA. (85)

Remissionis typus tertianarius, frigus ferè nullum.

TETARTOPHYA. (86)

Remissio quartanæ typum servans.

ORDO II. INTERMITTENTES.

Pyrexia pluries in decursu ægritudinis deserit et re-
currit, cum intervallis lucidis.

QUOTIDIANA. (87)

Accessus similes quolibet die accidunt.

TERTIANA. (88)

Accessus similes alternis diebus revertuntur.

QUARTANA. (89)

Accessus similes duobus interpositis diebus redeunt.

ERRATICA. (90)

Accessus similes distantes ab invicem pluribus quam qua-
tuor diebus, aut typi omnino incerti.

CLASSIS

CLASSIS III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

ORDO I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneæ cum pyrexia sæpius maligna, quandoque lenta.

PESTIS. (91)

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

VARIOLA. † (92)

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

PEMPHIGUS. (93)

Eruptio phlyctænarum avellanæ circiter magnitudine sero dilutè flavo turgidarum.

RUBEOLA, * (94)

Eruptio papularum in squamulas furfuraceas abeuntium. Præcedunt tussis ficca, sternutatio, lachrymatio, et febris catarrhalis.

MILIARIS. (95)

Eruptio phlyctænarum milii semini non majorum.

PURPURA. (96)

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel atra, indolens, cum typho vel remittente febre.

ERYSIPELAS. (97)

Eruptio erythematis cum synocha febre.

SCARLATINA. (98)

Eruptio maculosa, rubra, pruriens, papulosa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine præludio catarrhali, et sæpe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

ESSERA.

† Haly Abbatis, Jouberti, et antiquorum.

* Sic primitus nominata a traductoribus Haly Abbatis Practicæ, lib. 3. c. 1. de Variolæ et Rubeolæ Medela.

ESSERA. (99)

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatoſa, ſubito accedens per vices et recedens.

APHTHA. (100)

Eruptio puſtuloſa, phlyctænodes, et ulceroſa, in ore aut pudendis.

ORDO II. MEMBRANACÆ.

Pyrexia magna typo ſynochæ vel ſynochi, cum dolore viſceris cujuſdam.

PHRENITIS. (101)

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum pulſusque major, pyrexia acuta.

PARAPHRENEſIS. (102)

Symptomata phrenitidis et peripneumonix.

PLEURITIS. (103)

Dolor lateris, reſpiratio et pulſus frequens, tuſſis.

GASTRITIS. (104)

Dolor epigaſtrii, naufea, vomituriſio, febris typhodes, vel remittens maligna.

ENTERITIS. (105)

Dolor circa umbilicum vehemens, cum meteorifmo, pyrexia acuta, ileo, vel dyſenteria.

EPIPLOÏTIS. (106)

Dolor circa hypogaſtrium, et umbilicum juxta epiploi extensionem.

METRITIS. (107)

Dolor et tumor in regione et extensione uteri ac lumbis et inguinibus cum febre.

CYSTITIS. (108)

Dolor, tumor, tenſio hypogaſtrii, cum dyſuria vel iſchuria.

ORDO III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus fardis, non facciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

CEPHALITIS. (109)

Febris acuta cum delirio somnolento, et carphologia.

CYNANCHE. (110)

Dolor gutturis cum dyspnœa strangulante, dysphagia, et pyrexia acuta.

CARDITIS. (111)

Dolor sub sternum, pulsus inæqualis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

PERIPNEUMONIA. (112)

Pyrexia acuta, dyspnœa gravis, gravatius pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis.

HEPATITIS, * (113)

Dolor, tensio, calor in regione hepatis, cum pondere, tussis sicca, respiratione difficili.

SPLENITIS. (114)

Dolor, tumor in regione lienis, tactum vix tollerans, cum febre ut plurimum remittente.

NEPHRITIS. (115)

Dolor acutus in regione renum juxta ureteres in vesicam directus, cum febre acuta, dysuria, ischuriave, &c.

CLASSIS

* Galeni I. Epid. Comm. 3.

CLASSIS IV. SPASMI.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus intervientium.

ORDO I. TONICI PARTIALES.

Rigiditas et immobilitas artûs vel organi determinati.

STRABISMUS. (116)

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

TRISMUS. (117)

Maxillæ inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

OBSTIPITAS. (118)

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

CONTRACTURA. (119)

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

CRAMPUS. (120)

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

PRIAPISMUS. (121)

Penis injucunda rigiditas.

ORDO II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius ferè corporis.

TETANUS. (122)

Spasmus generalis subito ortus, cum dyspnœa.

CATOCHUS. (123)

Spasmus generalis sensim factus, sine dyspnœa.

ORDO III. CLONICI PARTIALES.

Agitatio invita et coacta cujusdam organi, vel artûs, cujus motivum non percipitur.

NYSTAGMUS. (124)

Spasmus clonicus oculi, palpebræ.

CARPHOLOGIA. (125)

Motus velut convulsivus manuum, quo ægri floccos e vestibus evellere, paleas colligere, muscas venari, &c. videntur.

PANDICULATIO. (126)

Diffensio semivoluntaria plurium vel omnium successive membrorum, ut plurimum cum oscitatione.

APOMYTOSIS. (127)

Succussio cutis et capitis tremula, violenta, cum expiratione sonora, quasi stertorosa.

CONVULSIO. (128)

Agitatio invita artus vel muscoli brevis et superfite in paroxysmis animæ functionum exercitio.

TREMOR. (129)

Artus alterna per itus et reditus frequentes motitatio cum movendi facultate concurrens.

PALPITATIO. (130)

Pulsatio in regione cordis pulsui arteriarum numero, minime verò intensitate, respondens.

CLAUDICATIO. (131)

Inter gradiendum cruris motus, quo centrum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum vel sinistrorsum transfertur.

ORDO IV. CLONICI GENERALES.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

RIGOR. (132)

Totius cutis succussio siigorifera.

ECLAMPSIA. (133)

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuracione.

EPILEPSIA.

EPILEPSIA. (134)

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus artuum, cum sensuum obscuratione.

HYSTERIA. (135)

Artuum, organorumque etiam internorum spasmus clonicus, tonicusve, paroxysmis fugacibus leviter variantibus, cum mortis formidine intensissima.

SCELOTYRBE. (136)

Motus semivoluntarius vel unius lateris, vel totius corporis, inter gradiendum, gesticationem, aut ridiculam histrionis festinationem referens.

BERIBERIA. (137)

Motus gradientium genu retrahens cum tremore, formicationis sensu, vocis rauedine, Indis familiaris.

CLASSIS V. ANHELATIONES.

Agitatio invita, defatigans, muscutorum pectoris, unde respiratio difficilis, frequens, sine febre acuta.

ORDO I. SPASMODICÆ.

Insultus fugaces, sed sæpius iterati spasmodicorum motuum pectoris cum expiratione sonora.

EPHIALTES. (138)

Anhelatio difficilis, querula, cum insomnio terrifico.

STERNUTATIO. (139)

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

OSCEDO. (140)

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiantē, sæpius cum pandiculatione.

SINGULTUS. (141)

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

TUSSIS. (142)

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

ORDO II. OPPRESSIVÆ.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequente anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

STERTOR. (143)

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, sæpe cum alterno sibilo.

DYSPNŒA. (144)

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

ASTHMA. (145)

Difficultas respirandi periodicè recurrens, chronica.

ORTHOPNŒA. (146)

Præceps ut plurimum et acuta respirandi difficultas.

ANGINA. (147)

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in gutture, et sæpe deglutitione difficili, sine phlegmasia.

PLEURODYNE. (148)

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum respirandi difficultate citra phlegmasiam acutam.

RHEUMA. (149)

Difficultas respirandi cum sensu gravitatis in pectore, quam comitantur vel præcedunt coryza, sternutatio, raucedo, &c.

HYDROTHORAX. (150)

Difficultas respirandi decubitu horizontali aucta, cum faciei pallore, manuum et pedum œdemate, symptomatis ephialticis, alterutrius brachii stupore et ægritudine chronica non remittente.

EMPYEMA. (151)

Symptomata hydrothoracis, prægressa pulmonis inflammatione suppurata, et comitante febre hæctica.

CLASSIS VI. DEBILITATES.

Impotentia clarè et distinctè sentiendi, appetendi, consueta vi artus organave movendi, necnon imaginandi, vigilandi, &c.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clarè ac distinctè sentiendi sine sopore.

CATARACTA. (152)

Vifus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

CALIGO. (153)

Vifus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

AMBLYOPIA. (154)

Vifus debilitas respectu ad citum, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

AMAUROSIS. (155)

Vifus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate infueta.

ANOSMIA. (156)

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

AGHEUSTIA. (157)

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

DYSECÆA. (158)

Auditus debilitas obicibus extra labyrinthum positis.

PARACUSIS. (159)

Voces articulatas distinctè audiendi difficultas vel impotentia.

COPHOSIS. (160)

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

ANÆSTHESIA. (161)

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas, sine stupore et sopore.

ORDO II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum fenſitivorum debilitas notabilis, vel ſuppreſſio inſolita ſine ſopore.

ANOREXIA. (162)

Appetitus eſculentorum ſuppreſſio, ſeu famis feriatio.

ADIPSIA. (163)

Appetitus potulentorum ſuppreſſio, ſeu ſitis feriatio.

ANAPHRODISIA. (164)

Appetitus venereorum, ſeu libidinis, ſuppreſſio.

ORDO III. DYSCINESIAE.

Impotentia motûs ac ſæpe ſenſûs in organis libertati ſubditis, ut lingua, larynge, artubus.

MUTITAS. (165)

Voces articulatas edendi impotentia.

APHONIA. (166)

Plenaria vocis ſuppreſſio, citra ſtuporem et ſyncopem.

PSELLISMUS. (167)

Quaſdam ſyllabas literaſve pronunciandi impotentia.

PARAPHONIA. (168)

Vocem ſolitam edendi impotentia.

PARALYSIS. (169)

Motus aut tactus, vel utriuſque in uno tantum artu debilitas.

HEMIPLEGIA. (170)

Debilitas motus aut tactus vel utriuſque in alterutro corporis latere.

PARAPLEXIA. (171)

Debilitas ſenſus et motus in dimidio corporis tranſverſim ſumpti.

ORDO IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

ASTHENIA. (172)

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensus integris.

LEIPOTHYMIA. (173)

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superflite.

SYNCOPE. (174)

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuracione.

ASPHYXIA. (175)

Omnium motuum et sensuum apparens cessatio, mortem ferè referens.

ORDO V. COMATA.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi, phantasiæ, memoriæque feriaciones.

CATALEPSIS. (176)

Status soporofus, cum artuum flexilitate, et ad quosvis novos situs retinendos aptitudine.

ECSTASIS. (177)

Status soporofus a gravi pathemate subito ortus, ægrum in eodem situ quo prehensus est retinens, sine aptitudine cataleptica.

TYPHOMANIA. (178)

Apparens sopor cum pervigilio reali, vel sopor levis e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

LETHARGUS. (179)

Status soporofus facile excitabilis cum summo imaginacionis et memoriæ torpore ac febre.

CATAPHORA. (180)

Status somnolentus facile excitabilis sine febre, delirio, et oblivione.

CARUS. (181)

Sopor profundus sine stertore.

APOPLEXIA. (182)

Sopor profundissimus cum stertore vel sonora respiratione.

CLASSIS VII. DOLORES.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla definitione distinctè explicabiles sunt.

ORDO I. VAGI.

Dolores et molestiæ vagæ sæpius universales aut cutaneæ ad phlegmasias non referendæ.

ARTHRITIS. (183)

Articulorum dolor spontaneus periodicus.

OSTOCOPUS. (184)

Offium dolor non erraticus et internus in artubus.*

RHEUMATISMUS. (185)

Dolor diuturnus in parte carnosa artuum.

CATARRHUS. (186)

Collo vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, &c.

ANXIETAS. (187)

Molestia quæ ad continuam loci mutationem cogit.

LASSITUDO. (188)

Molestia cum debilitate quæ ad quietem invitat.

STUPOR. (189)

Molestia quæ sensum tactus obscurat.

PRURITUS. (190)

Molestia quæ ad scalpendum nos cogit.

ALGOR. (191)

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur.

ARDOR. (192)

Molestia qualis a summo aëris calore producitur.

ORDO

ORDO II. DOLORES CAPITIS,

Scilicet vel capillitii vel faciei.

CEPHALALGIA. (193)

Gravativus capitis dolor.

CEPHALÆA. (194)

Periodicus, diuturnus, tenfivus capitis dolor.

HEMICRANIA. (195)

Dolor alterutrius lateris frontis.

OPHTHALMIA. (196)

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

OTALGIA. (197)

Dolor aurium.

ODONTALGIA. (198)

Dolor maxillarum dentiumve.

ORDO III. DOLORES PECTORIS.

Dolores cordis et œsophagi, anhelationis expertes.

DYSPHAGIA. (199)

Molestia deglutionem impediens sine notabili respirationis læsione.

PYROSIS. (200)

Sensus ardoris in ventriculo et œsophago sine febre acuta.

CARDIOGMUS. (201)

Gravis pertinaxque molestia in præcordiis, cum sensu ponderis et magnæ molis pulsantis a minimo motu increfciens.

ORDO IV. DOLORES Abdominales Interni.

CARDIALGIA. (202)

Molestia in stomacho syncopem minitans.

GASTRODYNIA. (203)

Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non slipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gastritis.

COLICA. (204)

Dolor intestinorum.

HEPATALGIA. (205)

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quævis in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

SPLENALGIA. (206)

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

NEPHRALGIA.* (207)

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

DYSTOCIA. (208)

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

HYSTERALGIA. † (209)

Dolor uteri sine nifu parturitionis.

ORDO V. DOLORES Externi et Artuum.

MASTODYNIA. (210)

Dolor mammarum,

RACHIALGIA. ‡ (211)

Dolor abdominis et spinæ dorsæ in brachiorum paralyfin aut convulsiones definens.

LUMBAGO. (212)

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

ISCHIAS. (213)

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem sæpius inducens.

PROCTALGIA. (214)

Dolor podicis citra tenesmum.

PUDENDAGRA. (215)

Dolor genitalium citra dysuriam.

CLASSIS

§ Zwingeri.

† Montalti.

‡ Astrucii.

CLASSIS VIII. VESANIÆ.

Error in imaginatione, appetitu, vel iudicio.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum
externorum vitio.

VERTIGO. (216)

Objecta licet quiescentia e loco moveri vel in gyrum versari
nobis videntur. Ipse æger sibi quandoque nutare videtur.

SUFFUSIO. (217)

Objectorum, quæ non sunt, imaginaria visio.

DIPLOPIA. (218)

Objectum duplicatum vel multiplicatum apparet.

SYROGMOS. (219)

Auditio imaginaria soni, cujus nullum est extra aures prin-
cipium.

HYPOCHONDRIASIS. (220)

Morbus diuturnus quo affectus se in mortis periculo versari
ex ructu, palpitatione, aliisque levidentibus malis, imagi-
natur.

SOMNAMBULISMUS. (221)

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium munia exsequuntur,
et se sæpe diversis periculis exponunt.

ORDO II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averfationes depravatæ.

PICA. (222)

Alimentorum consuetorum averfatio, cum inassuetorum,
fanisque infalubrium, appetitu.

BULIMIA. (223)

Appetitus esculentorum copix majoris quam quæ digeri
possit.

POLYDIPSIA. (224)

Appetitus majoris solito copię potulentorum.

ANTIPATHIA. (225)

Quorundam obsectorum tanta averfatio ut ex eorum visu, vel olfactu, æger gravia fymptomata patiatur.

NOSTALGIA. (226)

Parentum patriæve tanta cupiditas, ut hac non expleta æger gravi morbo decumbat.

PANOPHOBIA. (227)

Summus pavor inter dormiendum fine causa evidenti.

SATYRIASIS. (228)

Effrænis, impudensque veneris cupiditas cum libidinosa penis tentigine.

NYMPHOMANIA. (229)

In fœminis effræne veneris defiderium.

TARANTISMUS. (230)

Effrænis choreas agendi, vel faltandi cupiditas.

HYDROPHOBIA. (231)

Effrænis potulentorum averfatio, fæpius a morfu animalis rabidi.

ORDO III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

PARAPHROSYNE. (232)

Delirium fugax, a veneno, ut altero morbo dependens.

AMENTIA. (233)

Delirium univerfale mite, fine furore et audacia, cum morbo diuturno.

MELANCHOLIA. (234)

Delirium particulare mite, cum mœrore, ac morbo diuturno.

MANIA. (235)

Delirium univerfale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

DÆMONOMANIA. (236)

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentie tribuitur.

ORDO IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

AMNESIA. (237)

Omnis memoriæ feriatio.

AGRYPNIA. (238)

Pervigilium continuum immodicumve.

CLASSIS IX. FLUXUS.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quæ quantitate, qualitate, defuetudine notabilis est.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis vel sanguinolentæ materiæ ejectio sine alvi fluxu.

HÆMORRHAGIA. (239)

Fluxus sanguinis e naribus.

HÆMOPTYSIS. (240)

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

STOMACACE. (241)

Fluxus sanguinis e gingivis sæpius fœtidis, putridisve.

HEMATEMESIS. (242)

Sanguinis rejectio ex œsophago cum vomitorio conatu.

HÆMATURIA. (243)

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

MENORRHAGIA. (244)

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

ABORTUS. (245)

Fœtus immaturus, sæpius cum menorrhagia ex utero, exclusio.

ORDO

ORDO II. ALVIFLUXUS.

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

* *Alvifluxus sanguinolenti.*

HEPATIRRHŒA. (246)

Alvifluxus per inferiora seroso-cruentus nec ater nec torminosus.

HÆMORRHOIS. (247)

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfito.

DYSENTERIA. (248)

Frequens, torminosa, sæpe tenesmodes, fæcum cruentarum per inferiora dejectio.

MELÆNA. (249)

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora, frequens rejectio.

** *Alvifluxus non sanguinolenti.*

NAUSEA. (250)

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri fluxibus.

VOMITUS. (251)

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, œsophagumque rejectio frequens.

ILEUS. (252)

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et fæculentæ demum materiæ vomitio.

CHOLERA. (253)

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhœa violenta cum dolore abdominis, virium prostratione, et non raro furarum crampis.

DIARRHŒA. (254)

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiva, dejectio.

COELIACA. (255)

Albescentium, aut chilacearum materierum dejectio.

LIENTERIA. (256)

Celeris statim a pastu facta ingestorum, vix mutatorum, dejectio.

TENESMUS. (257)

Muci pauci frequens dejectio cum intensa deijciendi cupiditate, et affiduo conatu.

ORDO III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

EPHIDROSIS. * (258)

Sudoris quantitate, qualitate, intempestivitate peccantis, effluxus.

EPIPHORA. (259)

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis, sebacei, vel purulenti effluxus.

CORYZA. † (260)

Humoris serosi, mucosive e naribus effluxus sine ozæna, sæpius cum gravedine.

PTYALISMUS. (261)

Salivæ vel muci sine expectoratione ac vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

ANACATHARSIS. ‡ (262)

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humoris facta cum tussi expectoratio constans et notabilis.

DIABETES. (263)

Subito post pastum potulentorum, cum magna siti per urinæ vias, emissio.

ENURESIS. (264)

Involuntaria, doloris et ardoris expers, mictio.

DYSURIA. (265)

Difficilis et dolorifica, sæpius ardens, urinæ emissio.

PYURIA. (266)

Purulenta, albescentis, aut viscido-mucosæ materie mictio.

LEUCORRHŒA. || (267)

Serofo-flavæ, vel puriformis materiæ ex utero delapsus.

E

GO.

* Hippocratis.

† Hippocr. Gorræi, Def. Med.

‡ Hippocr. Galen. in Aph. 8. lib. 5.

|| Castell. Lex. Bonet Anat. Pr. lib. 3.

GONORRHŒA. (268)

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra, aut ex vagina.

DYSPERMATISMUS.* (269)

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda, impedita, et ad generationem insufficiens, emissio.

GALACTIRRHOEA. (270)

Stillicidium lactis ex mammis.

OTORRHOEA.† (271)

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte postica,

ORDO IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

FLATULENTIA. (272)

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

ÆDOPSOPHIA. (273)

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum, emissio.

DYSODIA. (274)

Miasmatum foetidorum exhalatio.

CLASSIS

* D. Cusson.

† Linn. gen.

CLASSIS X. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis in corporis habitu depravatio.

ORDO I. MACIES.

Corporis partium mollium extenuatio.

TABES. (275)

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

PHTHISIS, (276) *Græc.*

Corporis emaciatio cum amphimerina lenta, tussi, dyspnœa, et ut plurimum puris sputo.

ATROPHIA. (277)

Macies sine febre.

ARIDURA.* (278)

Macies unius tantum partis.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

POLYSARCIA. (279)

Intumescencia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

PNEUMATOSIS. (280)

Elastica et flatulenta cutis intumescencia.

ANASARCA. (281)

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

PHLEGMATIA. (282)

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

PHYSCONIA. (283)

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

GRA-

* Etmulleri.

GRAVIDITAS. (284)

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

ORDO III. HYDROPEs PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicæ contento.

HYDROCEPHALUS. (285)

Tumor capitis, facie sæpius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

PHYSOCEPHALUS. (286)

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

HYDRORACHITIS. * (287)

Tumor cysticus sero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anæsthesia.

ASCITES. (288)

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis et fluctuosus.

HYDROMETRA. (289)

Hypogastrii in mulieribus successive crescens tumor, uteri figuram referens, pressioni cedens, fluctuansve, ab ischuria et graviditate diversus.

PHYSOMETRA. (290)

Constans, permanensque tumor levis, elasticus, uteri figuram et sedem referens, in mulierum hypogastrio.

TYMPANITES. (291)

Hydrops totius abdominis a flatu, seu elasticus et levis.

METEORISMUS. (292)

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in morbo acuto ipsius abdominis.

ISCHURIA. (293)

Tumor hypogastrii ex urinæ retentione, sæpius intra vesicam.

Species

* Morgagni.

ISCHURIA.

Species sunt,

a. Ischuriæ renales.

1. Ischuria (*nephritica*,) a renum inflammatione. *Schacht.* Institut. med. pract. lib. viii. c. 1 et 8. *Gort.* Syft. prax. med. de Ischur. *Fabric. Hildan.* de Lithot. c. 4. *Leal a Fonte*, conf. 59. *Bonet.* Sepulchr. lib. iii. sect. 24. obs. iv. § 3. *Schenck.* lib. iii. de Ischur. fall. cap. 4 et 5. *Etmuller* coll. p. 994.
2. ——— (*nephrolithica*,) a renum calculo. *Schacht.* lib. citat. cap. 2 et 8. *Gort.* lib. citat. de morb. renum. *Car. Pison* de morb. a colluv. ferof. *Schenck.* de Ischur. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. et Medic. septentrional. de Ischur. *Edinb. Ess.* ii, 31.
3. ——— (*nephroplethorica*,) renalis a plethora. *River.* Cent. i. obs. 1 et 89. *Etmull.* *Schacht.* loco citat. *Gaub.* Pathol. de vit. miſt. *Ludwig.* Institut. med. clin. *Seb. Naſſi* Specul. method. med. p. 167.
4. ——— (*lunatica*,) renalis lunatica. *Tulp.* obs. med. lib. ii. cap. 49.
5. ——— (*nephrospasmodica*,) renalis spasmodica. *Schacht.* *Gort.* lib. citat. *Sydenh.* Differt. epist. tom. 1. *Raulin* des malad. vapor. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1715.
6. ——— (*nephrelemtica*,) renalis verminosa. *Gort.* lib. citat. *Gaub.* Pathol. de vit. miſt.
7. ——— (*nephrothromboides*,) renalis a sanguine con-
grumato. *Mercat.* de morb. intern. cur. cap. 12. *Etmull.* de læs. urin. secret. p. 314. *Fernel.* Pathol. lib. vi. cap. 13. *Gort.* *Gaub.* loc. citat.
8. ——— (*nephropyica*,) a renum purulentia. *Schenck.* lib. iii. de ren. tumorib. *Gort.* *Gaub.* loc. citat. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. *Sal. Diverſ.* de affect. particularib. cap. 14.
9. ——— (*nephroplegmatica*,) renalis pituitosa seu mu-
cosa. *Sal. Diverſ.* loc. citat. *Grasii* Ephem. natur. cur. ann. iii. obs. 212. *Schacht.* *Gort.* *Gaub.* *Mercat.* loc. citat. *Varand.* de ren. affect. *Bonet.* Sepulchr. de Ischur. obs. iv, v.
10. ——— (*nephroplegica*,) renalis paralytodea. *Sal. Diverſ.* *Mercat.* loc. citat. *Horſt.* tom. ii. lib. iv. obs. 49. *Marcel. Donat.* Histo. med. mirab. lib. iv. cap. 28. *Barthol.* Cent. iv. epist. 18, 38, 39. *Hoechstet.* Obs. Dec. v. cas. 20. *Claud.* Chaptal. pract. Monſpel.

ISCHURIA.

11. Ischuria (*suppleta*), renalis ab alia evacuatione suppleta.
- a. A diarrhœa et sudore, *Marcell. Donat. Hist. med. mirab. lib. iv. cap. 27. Schenck. lib. iii. de diabete, obs. 9.*
 - b. Ab otorrhagia, *Sennert. ex plat. pract. lib. iii. part. 8. sect. 2. cap. 9.*
 - c. A perspiratione, *Vandermond. Journ. de med. tom. iv.*
 - d. A sudore, *Vandermond. Journ. de med. tom. x.*

b. Ischuriæ uretericæ.

- 12. ——— (*ureteritica*), ureteritica inflammatoria. *Sal. Divers. loc. citat. Ludwig. Instit. clin. Gaub. Pathol. de vit. miſt. Schacht. Instit. pract. de Ischur. spur.*
- 13. ——— (*ureterolithica*), Ischuria ureterica calculosa. *Tulp. Obs. med. lib. ii. cap. 45. Monro Essais d'Edinb. tom. iv. art. 68. Bonet. Sepulchr. lib. iii. de urin.-suppress. Schenck. lib. iii. de ureterib. Sal. Divers. loc. citat.*
- 14. ——— (*urethro-thromboides*), Ischuria ureterica, a sanguinis grumo. *Sal. Divers. Schacht. Gaub. loc. cit. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. obs. i.*
- 15. ——— (*urethro-phlegmatica*), ureterica a pituita. *Gort. Prax. med. syst. Schacht. Sal. Divers. loc. cit. Bonet. Sepulchr. de urin. suppress. Sebast. Nas. Spec. meth. med. loc. citat. Epiphan. Ferdinand. hist. 97.*
- 16. ——— (*uretoropyica*), ureterica purulenta. *Gort. lib. cit. de ureter. morb. Schacht. Sal. loc. cit.*
- 17. ——— (*ureterostomatica*) ab orificiî ureterum inferioris clausura, *Theod. Eller. Miscell. Berolin. tom. iv. pag. 381. Verdier ex Noel. Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. ii. obs. 17. Lieutaud. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1753. Franc. Sylv. Deleboe, Prax. med. lib. ii. Salizmann. obs. anat. p. 62.*

c. Ischuriæ vesicales.

- 18. ——— (*cystitica*), a vesicæ inflammatione. *Schacht. Instit. practic. Mem. de l'Acad. R. des Sc. ann. 1704, 1753. Boneti Sepulchr. lib. iii. de urin. suppress. Forest. lib. xxv. obs. 27, 28. Zacuti Lusitani ex Galeno, Hist. med. princ. l. ii. hist. 150.*

ISCHURIA.

19. Ischuria (*cystolithica*) a vesicæ calculo. *Tulpîi* observ. med. lib. iv. cap. 37. *Essais d'Edinbourg*, tom. iv. *Foresti* lib. xxv. obs. 23. *Fabric. Hildani*, Cent. iii. obs. 67. *Car. Pisonis* de morb. a colluv. seros. *Boneti* Sepulchr. de urin. suppress. obs. x, &c.
20. ——— (*cystospastica*) a sphincteris vesicæ spasmo. *Mercati* de morb. intern. cur. lib. iv. cap. 22. *Sebas. Nassi* Specul. method. med. part. ii. p. 267. *Nenteri* de Ischur. *Schachtii*, *Gorterii*, *Gaubii*, *Varandæi*, loc. citat.
21. ——— (*cystoplegica*) a vesicæ paralyfi. *Lieutaud*. Compend. medic. de Ischur. *Zacut. Lusitan.* ex *Galeno* Hist. princ. hist. 140. *Mangeti* Biblioth. medic. pract. tom. iv. *Serane* Thes. pro Reg. Cathedr. *Hollerii* de morb. intern. cap. 47. *Amat. Lusitan.* Cent. iv. cur. 10. *Pringle* *Essais d'Edinbourg*, tom. i, artic. 32. *Lond. Med. Obs.* i, 10.
22. ——— (*polyurica*) a vesica lotio diutius cohibito distenta. *Halleri* Prælect. in *Boerhaave*, tom. ii. § 384. p. 336. *Forest.* lib. xxv. obs. 14. *Nenter* de Ischuria. *Paræi* lib. xvi. cap. 48. *Sennert.* Pract. lib. iii. part. viii. sect. i. cap. 4. *Etmulleri*, *Riverii*, *Varandæi* de Ischur. &c.
23. ——— (*cystopyica*) vesicalis purulenta, *Felic. Plateri* *Mantiss.* obs. 29. *Camerar.* Ephem. natur. curios. tom. ii. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno*, Hist. medic. princip. hist. 148. *Hollerii* de morb. intern. c. 47. *Sebas. Nassi* Specul. method. med. pag. xi, p. 167. *Andre* des maladies de l'urethre, obs. 16. *Vandermonde* Journ. de med. tom. ix.
24. ——— (*cystothromboides*) vesiculis a sanguinis grumo, *Claudini* consult. 141. *Fabric. Hildani* Cent. iii. obs. 66. *Foresti* lib. xxv. obs. 20. *Zacuti Lusitani* ex *Galeno* Hist. med. princip. hist. 145. et ejusdem *Prax. med. admirab.* lib. ii, cap. 65. *Mercati* de morb. intern. cur. cap. 12.
25. ——— (*cystophlegmatica*) vesicalis a muc. *Mercati* loc. citat. *Schacht.* Instit. medic. pract. lib. viii, cap. 9. *Etmulleri* de Ischur. vesicat. *Amati Lusitani*, Cent. vi, cur. 12. *Zacuti Lusitani*, *Prax. med. admirab.* lib. ii, obs. 64. *Boneti* ex *Thom. Barbolin.* de urin. suppress. obs. 17.

ISCHURIA.

26. Ischuria (*ectopocystica*) a vesicæ ectopia.
 a. Herniosa, seu a cystocele, *Verdier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. ii, obs. 4, 6, 9, 10, 14. *Felic. Plater.* obs. p. 830.
 b. Proptoica, seu ab exocyste, *Verdier* ex Noel. lib. citat. obs. 17.
27. ——— (*cystoproctica*) vesicalis ab intestino recto, scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, hæmorrhoidibus turgente. *Dodonæi* Obs. medic. cap. 47. *Schenck.* lib. iii, de Ischur. obs. 6. *Wepferi* Diff. de Apopl. p. 391. *Vandermonde* Journ. de med. tom. ix. p. 261. *Boneti* Sepulchret. de urin. suppress. observ. 18, sect. 4. *Schacht. Gaubii,* loc. citat.
28. ——— (*hysterocystica*) vesicalis ab utero.
 a. Gravido, *Nordman.* Diff. de Ischur. gravidar. *Mauriceau,* lib. i, cap. 15. *Roderici a Castro,* lib. ii. cap. 15.
 b. Parturiente, *Boneti* ex *Riolani* de urin. suppress. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. v.
 c. Hydropico, *Hippocrat.* de morb. mulier. lib. 12. *Sennerti* Pract. lib. iv, part. i, sect. ii, c. x, xi. *Schenck.* lib. iv, de mol. fals. *Schachtii, Gaubii,* loc. citat.
 d. Tumoribus distento, *Gaubii, Schachtii,* loc. cit. *Sennerti* ibidem, ac supra, cap. xiii. *Knoeffelii,* E. N. C. ann. iv.
 e. Procidue, *Nordmann.* Differt. citata. *Sabatier* Mem. de l'Acad. de Chirurg. tom. iii. *Sennerti* ibid. ac supra, cap. xvi.
29. ——— (*atretarum*) urethrocystica a menstruis in vagina retentis. *Amyand* Transact. philos. ann. 1732, num. 442, art. 8, p. 45. *Schenck.* lib. iv, de part. genit. mulier. obs. 9. *Heister.* Chirurg. tom. ii, p. 951. *Astruc.* de morb. mulier. tom. i, lib. i, cap. 5.
30. ——— (*paradoxa*.) *Morgagni* Epistol. *Le Clerc.* Journ. de med. Juill. 1755. p. 11.
- d. Ischuriæ urethrales.

31. ——— (*perinæalis*) urethralis a perinæi tumore. *Galen.* lib. de affect. loc. et ex eo *Zacuti Lusitan.* Hist. 149. *Vandermonde* ex *Daran.* Journ. de med. tom. v, p. 291. *Tulp.* Observ. med. lib. iii, cap. 10. *Forest.* lib. xxvi, obs. 2.

ISCHURIA.

32. Ischuria (*urethrolibica*) a calculo urethræ impacto. *Schmid.* Eph. nat. cur. decad. i, ann. viii, obs. 89. *Winckler.* ibid. tom. vi, obs. 34. *Zacut. Lusitan.* Prax. med. admirab. lib. ii, observ. 66, 67, 68. *Tulp.* Obser. med. lib. iii, c. 8. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. observ. 14. *Barthol.* cent. iv, epist. 5. *Heister.* Chirurg. tom. ii, p. 839.
33. ——— (*urethroblegmatica*) a mucō urethram infarciēte. *Bonet.* Sepulchr. et medic. septent. *Manget.* Biblioth. medic. pract. *Amat. Lusitan.* cent. v, obs. 71. *Forest.* lib. xxv, obs. 25. *Varand.* de Ischur. *Lud. Apin.* Eph. nat. cur. dec. iii, ann. iii, obs. 69.
34. ——— (*urethrobromboides*) a sanguinis grumo urethram opplente. *Bonet.* Medic. septentrion. de Ischur. et Sepulchr. de urin. suppress. observ. xi. *Forest.* lib. xxv, obs. 25.
35. ——— (*urethropyica*) a purē urethram obstruente. *Bonet.* Med. septentr. de Ischur. *Forest.* Scholio modo citat. *Boerhaave* Præfat.
36. ——— (*urethrobymenodes*) a membrana in urethram impacta. *Hist. de l'Acad. R. des Sc.* ann. 1714, hist. p. 22.
37. ——— (*urethrelmintica*) urethralis verminosa. *Jo. Petr. Albreicht.* Vide *Bonet.* Medicinam septentrionalem de urin. cap. 31, et *Manget* Biblioth. med. pract. tom. iv, de morb. urin. spectant. *Vandermonde* Journ. de med. Septembre 1758, p. 245. *Joan. Rhodii* Centur. iii, obs. 36. *Collect. Acad.* tom. iii, p. 497, obs. 77.
38. ——— (*urethritica*) ab urethræ inflammatione. *Hildan.* Cent. iv, obs. 54. *Forest.* de incert. urin. judiciis, lib. iii, cap. 3. versus finem. *Varand.* de affectib. ren. et vesic. cap. 7. *Bonet.* Medic. septentr. de Ischuria, cap. 1, num. 5. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. ii, p. 838. *Lond. Med. Obs.* vi, 24.
39. ——— (*carunculosa*) a morbis, ut vocant, urethræ. *Amat. Lusitan.* cent. iv, cur. 19. cent. v, cur. 48. *Sharp* Recherches critic. cap. 4. *Goulard.* des Malad. de l'urethre. *Heister.* Chirurg. tom. ii, p. 834. *Andre* des maladies de l'urethre, passim.

ISCHURIA.

40. Ischuria (*hydrocelodes*) ab urethræ ruptura in scrotum hiantem. *Joan. Lud. Apin.* Miscell. nat. cur. decad. iii, ann. iii, obs. 68.
41. ——— (*cryptopyica*) a penis intra corpus retractio-
ne, *Fred. Hoffm.* Consult. de morb. abdom. cas. 105.
42. ——— (*peridesmica*) a vinculo strictiori peni injecto.
Bonet. med. septentr. de Ischuria, cap. 1, num. 8.
43. ——— (*phimosica*) urethralis a phimosi. *Horst.* tom. ii, lib. iv, p. 274. *Goulard.* de malad. de l'urethre. *Heist.* Chirurg. tom. ii, p. 818. *Bonet.* Sepulchr. de Ischur. obs. 15.
44. ——— (*aspadialis*) ab urethræ clausura. *Heister.* Chirurg. tom. ii, p. 818 et 951. *Horst.* tom. ii, obs. 55. *Joan. Wieri* obs. p. 221. *Bonet.* Sepulchr. de urin. suppress. obs. xv, schol. et med. septentr. de Ischur. cap. 2. sect. 6.

ORDO IV. TUBERA.

Tumores partium solidarum, non hydropici.

RACHITIS. (294)

Deformitas ex articulorum tumore duro, carniū marcore, capitis mole, cum ingenio præcoci, in puerulis.

SCROPHULA. * (295)

Tumor schirrhosus glandularum colli, mesenteriique, cum labiis et naso crassioribus.

CARCINOMA. (296)

Ulcera cancroſa cum doloribus lancinantibus.

LEONTIASIS. (297)

Papillæ ſetaceæ vel corniculatæ cutim exasperantes.

MALIS. (298)

Tumores sæpius purulenti, vel ulcera, cum infectis vermi-
formibus, paſſim enata.

FRAMBÆSIA. (299)

Excreſcentiæ fungoſæ, mori inſtar granulofæ sæpius cum
ulceribus, &c.

ORDO

ORDO V. IMPETIGINES.

Morbi chronici sæpius contagiosi, qui cutis excrescentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

SYPHILIS. (300)

Post impurum concubitum ulcuscula, porri, bubones, fici primo ut plurimum in genitalibus, prægressa non raro gonorrhœa, dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, exostoses, caries, &c. in cæteris partibus.

SCORBUTUS. (301)

Stomacace cum maculis lividis, flavis, purpuro-violaceis, potissimum tiliarum.

ELEPHANTIASIS. (302)

Facies deformis tuberibus callofis, ozæna, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosæ, in extremis artubus anæsthesia.

LEPRA. (303)

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

SCABIES. (304)

Pustulæ crustosæ, lentis magnitudine, pruriginosæ manus potissimum obsidentes.

TINEA. (305)

Crustæ flavæ vel griseæ, ulcerosæ, per caput dispersæ.

ORDO VI. ICTERITIÆ.

Totius cutis color inassuetus, sine pyrexia acuta.

AURIGO. (306)

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantiam vergens.

MELASICTERUS. (307)

Cutis color niger, vel atro-lividus, atro-fuliginosus.

PHOENIGMUS. (308)

Rubor diffusus, vel maculosus, sine pyrexia.

CHLOROSIS. * (309)

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, sæpius cum pica.

ORDO

* Sennerti, qui falso nomen Hippocrati tribuit.

ORDO VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

PHTHIRIASIS. (310)

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas prorigine, ulcusculisque defœdant, aut puncturis, pruritu discruciant.

TRICHOMA. * (311)

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, sæpius cum phthiriasi.

ALOPECIA. (312)

Capillorum lapsus cum cuticulæ desquamatione.

ELCOSIS. (313)

Numerosa vel ampla ulcera chronica, cariosa, fœtida, cum pyrexia lenta.

GANGRÆNA. (314)

Initio mors partis, dein ejus putrida dissolutio.

NECROSIS. (315)

Partis mors, sine tumore prævio, deinde vero exsiccatio, induratio, nigredo.

* Jachii,

PARS SECUNDA.

GENERA MORBORUM

DEFINITA

AB ILLUSTRIBUS
CAROLO A. LINNÆ,
EQUITE AURATO, ARCHIATRO, ETC. ETC.

UPSALIÆ—M DCC LXIII.

CLAVIS CLASSIUM.

M O R B I.

Febriles (e fanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I.

CRITICI II.

PHLOGISTICI III.

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV.

Judicii MENTALES V.

Motus QUIETALES VI.

MOTORII VII.

Fluidi secretionis

SUPPRESSORII VIII.

EVACUATORII IX.

Solidi

Interni DEFORMES X.

Externi VITIA XI.

EX-

EXANTHEMATICI	Febris cum efflorescentia cutis maculata.
CRITICI	Febris cum Urinæ hypo- stasi lateritia.
PHLOGISTICI	Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.
DOLOROSI	Doloris sensatio.
MENTALES	Judicii alienatio.
QUIETALES	Motus abolitio.
MOTORII	Motus involuntarius.
SUPPRESSORII	Meatuum impeditio.
EVACUATORII	Fluidorum evacuatio.
DEFORMES	Solidorum facies mutata.
VITIA	Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra
ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

CLASSIS

CLASSIS I. EXANTHEMATICI.

ORDO I. CONTAGIOSI.

MORTA. (1)

Phlyctænæ (274) aliquot in Abdomine five Artubus, magnitudine avellanæ.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

PESTIS. (2)

Anthraces (273) seu Bubones (272) gangrænosî (234).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima, Vertigo (74),
Anxietas (89), Lipyria.

VARIOLA. (3)

Pustulæ (275) erysipelaceæ, suppurantes, escharoticæ (281),
decidua, cicatrisantes (318).

Febris Synochus (13), Cephalalgia (40), Lumbago (62).

RUBEOLA. (4)

Papulæ (276) uniformes, rubræ, evanescenti-furfuracæ.

Febris Synocha (12), Sternutatio (154), Epiphora (173)
Tussis (155) ficca.

PETECHIA. (5)

Sudamina (322) livido-lurida, superficialia, insensibilia.

Febris exacerbans (23), Asthenia (92), Agrypnia (130).

SIPHYLIS. (6)

Nodi (263) Ulcuscula, Myrmecia (280).

Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), Marcore
(209), Stranguria (197), Angina (46).

ORDO II. SPORADICI.

MILIARIA. (7)

Papulæ (276) rotundæ, immersæ, diversicolores, confertæ,
intacta facie, pruriginosæ.

Febris synocha (12), fudore (208), fœtido, punctorio.

UREDO.

UREDO. (8)

Sudamina (322) inæqualia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hæctica (24) benigna brevis.

APHTHA. (9)

Escharæ (281) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

ORDO III. SOLITARI.

ERYSIPELAS. (10)

Macula rubens, urens, pressione diffimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamatione finienda.

Febris synocha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Prototypus Exanthematicorum Erysipelas (10) est.

Dysenteria (192) ad Contagiosos referretur, modo Scabies interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: Lipothymia (93), Delirium (65), Vertigo (74), Oblivio (107), Anæsthesia (118), Lipyria, Carpologia (135), Anhelatio (157), Aphonia (115), Aglutitio (164).

CLASSIS II. CRITICI.

ORDO I. CONTINENTES.

DIARIA. (11)

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

SYNOCHA. (12)

Febris terminanda intra septimanam unicam.

SYNOCHUS. (13)

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

LENTA. (14)

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

ORDO II. INTERMITTENTES.

QUOTIDIANA. (15)

Febris paroxysmi fimiles nycthemeris singulis.

TERTIANA. (16)

Febris paroxysmi fimiles nycthemeris alternis.

QUARTANA. (17)

Febris paroxysmi fimiles nycthemeris tertiis.

DUPLICANA. (18)

Febris paroxysmi fimiles alternati.

ERRANA. (19)

Febris paroxysmi diffimiles omnes.

ORDO III. EXACERBANTES.

AMPHIMERINA. (20)

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

TRITÆUS. (21)

Febris continens (14) cum Tertia (16).

TETARTOPHIA. (22)

Febris continens (14) cum Quartana (17).

HEMITRITÆA. (23)

Febris Tritæus (21) cum Amphimerina (20).

HECTICA. (24)

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Prototypus Criticorum Tertia (16) fit, aut potius Rhe -
matismus (62).

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (209) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo
naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

CLASSIS III. PHLOGISTICI.

ORDO I. MEMBRANACEI.

PHRENITIS. (25)

Inflammatiō (232) Meningum.

Febris synocha (12), Cephalalgia (40), Furor (68), Anxietas (89), Syringmos (72), Ophthalmia (43), Carpalgia (135), Oblivio (107).

PARAPHRENESES. (26)

Inflammatiō (232) Diaphragmatis.

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

PLEURITIS. (27)

Inflammatiō (232) Pleuræ.

Febr. Synocha (12), Dyspnœa (160), Tussis (155), Hæmoptysis (180), Pleuritica (53).

GASTRITIS. (28)

Inflammatiō (232) Ventriculi.

Febr. Amphimerina (20), Lipyria, Anxietas (89), Vomitus (184) ingestorum, Cardialgia (48).

ENTERITIS. (29)

Inflammatiō (232) Intestini.

Febr. cum evacuatione abdominis, colica (50) atroci, tenfiva, calente.

PROCTITIS. (30)

Inflammatiō (232) Ani.

Febr. Proctica (59) cum Tenefmo (194).

CYSTITIS. (31)

Inflammatiō (232) Veficæ.

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore inflammatorio, Dysuria (57), Tenefmo (194).

ORDO II. PARENCHYMATICI.

SPHACELISMUS. (32)

Inflammatiō (232) Encephali.

Febr. Synochus (13), Delirium (65), Carpologia (135), Asthenia (92), Immobilitas, Anæsthesia (118), Aphonia (115).

CYNANCHE. (33)

Inflammatiō (232) Faucis.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Aglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescencia.

PERIPNEUMONIA. (34)

Inflammatiō (232) Pulmonis.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Hæmoptysis (180), Dyspnoea (160), Interscapuli dolor, Cubatus supinus.

HEPATITIS. (35)

Inflammatiō (232) Jecinoris.

Febr. Amphimerina (20), Tussis (155) ficca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

SPLENITIS. (36)

Inflammatiō (232) Lienis.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

NEPHRITIS. (37)

Inflammatiō (232) Renis.

Febr. synochus (13) irregularis, Nausea (183), Singultus (153), Ructus (182), Urinæ varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

HYSTERIIS. (38)

Inflammatiō (232) Uteri.

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor hypogastrici tumorque calens.

ORDO III. MUSCULOSI.

PHLEGMONE. (39)

Inflammatiō (232) Partis Externæ.

Febris ex partis externæ tumore pulsatorio, Rubore tensivo, calente.

Lipyrria dum externa frigent, interna fervent.

Prototypus Phlogisticorum Phlegmone (39) est.

Delirium (65) quasi primus gradus Phrenitidis est.

CLASSIS

CLASSIS IV. DOLORES.

ORDO I. INTRINSECI.

CEPHALALGIA. (40)

Capitis totius aut portionis dolor gravativus.

HEMICRANIA. (41)

Capitis lateralis dolor tensivus.

GRAVEDO. (42)

Frontis dolor pressorius.

OPHTHALMIA. (43)

Oculi dolor.

OTALGIA. (44)

Auris dolor.

ODONTALGIA. (45)

Dentis dolor maxillaris.

ANGINA. (46)

Faucis dolor cum suffocatione (158).

SODA. (47)

Oesophagi dolor rancido-deurens, Ructibus (182) calidis.

CARDIALGIA. (48)

Cordis dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

GASTRICA. (49)

Ventriculi dolor epigastrii.

COLICA. (50)

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

HEPATICA. (51)

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

SPLENICA. (52)

Lienis dolor hypochondrii sinistri, suspiria (150).

PLEURITICA. (53)

Thoracis dolor lateralis punctorius.

PNEUMONICA. (54)

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162), Tussi (155), Hæmoptyæ (180).

HY-

HYSTERALGIA. (55)

Uteri dolor.

NEPHRITICA. (56)

Renis dolor.

DYSURIA. (57)

Vesicæ dolor.

PUDENDAGRA. (58)

Genitalis dolor.

PROCTICA. (59)

Ani dolor.

ORDO II. EXTRINSECI.**ARTHRITIS.** (60)Geniculorum dolor periodicus ;
a Synovia corrupta.**OSTOCOPUS.** (61)Articulorum dolor internus fixus ;
a Pyriostio infecto.**RHEUMATISMUS.** (62)Musculorum dolor ad motum ;
a Tunica cellulosa infecta.**VOLATICA.** (63)

Vaforum dolor migrans.

PRURITUS. (64)

Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessitatem inducens.

Raphania (145) dolore intensio his affinis : ob Spasmos
vero et Convulsiones sequentibus.

CLASSIS V. MENTALES.

ORDO I. IDEALES.

DELIRIUM. (65)

Infania acuta, transitoria, symptomatica cum febre.

PARAPHROSYNE. (66)

Infania acuta, periodica, sine febre.

AMENTIA. (67)

Infania chronica, universalis, innocua.

MANIA. (68)

Infania chronica, universalis, furibunda.

DÆMONIA. (69)

Infania chronica, partialis, furibunda, meticulosa, de Dæmonibus.

VESANIA. (70)

Infania chronica, partialis, tranquilla.

MELANCHOLIA. (71)

Infania chronica, partialis, mœsta, meditabunda.

ORDO II. IMAGINARIII.

SYRINGMOS. (72)

Perceptio Soni tinnitantis falsi.

PHANTASMA. (73)

Perceptio Visibilis objecti falsi.

VERTIGO. (74)

Perceptio circumgyrationis falsæ.

PANOPHOBIA. (75)

Imaginatio mali falsi in solitudine.

HYPOCHONDRIASIS. (76)

Imaginatio fati lethalis e levi malo, Borborygmi (123), Ructus (182) acidi, Palpitationes (132), Præcordia tremula, Persuasio.

SOMNAMBULISMUS. (77)

Imaginatio somniantis fortior, qua motus voluntarii excitantur.

ORDO

ORDO III. PATHETICI.

CITTA. (78)

Defiderium non Esculenti ingerendi.

BULIMIA. (79)

Defiderium Cibi inexplebile.

POLYDIPSIA. (80)

Defiderium Potus continuum.

SATYRIASIS. (81)

Defiderium Veneris enorme.

EROTOMANIA. (82)

Defiderium Amantium pudicum.

NOSTALGIA. (83)

Defiderium Patriæ Affiniumve.

TARANTISMUS. (84)

Defiderium Choreæ (sæpe a morfuro infecti.)

RABIES. (85)

Defiderium Mordendi lacerandique innocuos (sæpe a Morfura Mammalis.)

HYDROPHOBIA. (86)

Aversatio Potulentorum cum Rigore (141) et Sardiasi (125);
(sæpius præcedenti maritata.)

CACOSITIA. (87)

Aversatio Cibi cum horrore.

ANTIPATHIA. (88)

Aversatio objecti particularis.

ANXIETAS. (89)

Aversatio mundanarum rerum.
(Cordis dolor.)

CLASSIS VI. QUIETALES.

ORDO I. DEFECTIVI.

LASSITUDO. (90)

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

LANGUOR. (91)

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

ASTHENIA. (92)

Debilitas successiva virium omnium.

LIPOTHYMIA. (93)

Defectio motus sensusque subita; superstita Pulsu Menteque.

SYNCOPE. (94)

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

ASPHIXIA. (95)

Lapsus virium animalium vitaliumque persistens.

ORDO II. SOPOROSI.

SOMNOLENTIA. (96)

Sopor vigiliis protractior.

TYPHOMANIA. (97)

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

LETHARGUS. (98)

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) obliuioſo.

CATAPHORA. (99)

Sopor constans allocutione evigilans.

CARUS. (100)

Sopor constans cum insensibilitate, respirationeque tacita.

APOPLEXIA. (101)

Sopor constans cum insensibilitate, respirationeque stertorosa (156).

PARAPLEGIA. (102)

Sopor constans partium sub thorace.

HEMIPLEGIA. (103)

Sopor constans lateris alterius.

PARALYSIS. (104)

Sopor constans partis alicujus.

STUPOR. (105)

Sopor transitorius partis alicujus cum sensu formicationis.

ORDO III. PRIVATIVI.

MOROSIS. (106)

Imaginationis defectus.

OBLIVIO. (107)

Memoriæ defectus.

AMBLYOPIA. (108)

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CATARACTA. (109)

Visus privatio cum vitio observabili.

AMAUROSIS. (110)

Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla dilatata.

SCOTOMIA. (111)

Visus Lypothymia (93) momentanea.

COPHOSIS. (112)

Auditus defectus.

ANOSMIA. (113)

Olfactus defectus.

AGEUSTIA. (114)

Gustus defectus.

APHONIA. (115)

Loquelæ privatio.

ANOREXIA. (116)

Famis defectus.

ADIPSIA. (117)

Sitis defectus.

ANÆSTHESIA. (118)

Tactus sensationis defectus.

ATECNIA. (119)

Libidinis defectus.

ATONIA. (120)

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

CLASSIS VII. MOTORII.

ORDO I. SPASTICI.

SPASMUS. (121)

Artus distentio violenta, subitanea, fugax.

PRIAPISMUS. (122)

Penis spastica intumescencia.

BORBORYGMUS. (123)

Intestinorum contractio boans.

TRISMOS. (124)

Mandibularum clausura arcta.

SARDIASIS. (125)

Oris retractio risum mentiens, fugax.

HYSTERIA. (126)

Præcordiorum pressio sub pectore, cum flatulentia (165),
Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132),
verticis pressione.

TETANUS. (127)

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CATOCHUS. (128)

Corporis rigiditas cum insensibilitate.

CATALEPSIS. (129)

Corporis totius recepta forma, constans, flexilis, cum insensibilitate.

AGRYPNIA. (130)

Sensorii rigiditas spastica, continua (Pervigilium).

ORDO II. AGITATORII.

TREMOR. (131)

Partium agitatio continua, chronica, absque frigoris sensu.

PALPITATIO. (132)

Cordis Viscerisque motus subsultorius.

ORGASMUS. (133)

Arteriarum subsultus.

SUBSULTUS. (134)

Tendinum subsultoria elevatio.

CARPOLOGIA. (135)

Digitorum tremula contractio infcia.

STRIDOR. (136)

Manducatio sonora, vacua.

HIPPOS. (137)

Palpebrarum nictitatio frequentissima.

PSELLISMUS. (138)

Loquelæ titubatio in quibusdam literis.

CHOREA. (139)

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

BERIBERI. (140)

Partium tremor (131), Genuum contractura (300), Stupor (105), Raucedo (146).

RIGOR. (141)

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

CONVULSIO. (142)

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

EPILEPSIA. (143)

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

HIERANOSOS. (144)

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

RAPHANIA. (145)

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolore violentissimo, periodico.

CLASSIS VIII. SUPPRESSORII.

ORDO I. SUFFOCATORII.

RAUCEDO. (146)

Vocis fibilans elocutio ab arescentia pneumatica.

VOCIFERATIO. (147)

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad corpus indurandum.

RISUS. (148)

Expiratio profunda, agitatoria, cum Sardiasi (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

FLETUS. (149)

Inspiratio interfecta, singultuosa, cita, suspiriosa, cum mœstitia, gemitu, lacrymis (173).

Ad sanguinem intra pulmones inglutiendum.

SUSPIRIUM. (150)

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

Ad sanguinem e pulmonibus expellendum.

OSCITATIO. (151)

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per pectus.

PANDICULATIO. (152)

Inspiratio profunda, prefforia, cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per vasorum anastomoses propellendum.

SINGULTUS. (153)

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

STERNUTATIO. (154)

Expiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentæ succedens.

Ad finem Frontis evacuandum.

TUSSIS.

TUSSIS. (155)

Expiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad trachæam evacuandam.

STERTOR. (156)

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum faucium subigendum.

ANHELATIO. (157)

Respiratio citatissima, profunda, levis, fugax.

Ad sanguinem per pulmones accelerandum.

SUFFOCATIO. (158)

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A trachææ angustatione.

EMPHYEMA. (159)

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A pure in cavum thoracis effuso.

DYSPNŒA. (160)

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A pulmonum substantia oppilata.

ASTHMA. (161)

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

ORTHOPNŒA. (162)

Respiratio suspiciosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per pulmones difficili transitu.

EPHIALTES. (163)

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

ORDO II. CONSTRICTORII.**AGLUTITIO.** (164)

Deglutitio impedita.

FLATULENTIA. (165)

Ructus (182) Crepitusque (195) impeditus, cum abdominis intumescencia.

OBSTIPATIO. (166)

Fœcum exoneratio impedita.

ISCHURIA. (167)

Mictus impeditus.

DYSMENORRHŒA. (168)

Menstrua suppressa s. dolorifica.

DYSLOCHIA. (169)

Lochiorum suppressio.

AGLACTATIO. (170)

Lactis defectus.

STERILITAS. (171)

Genituræ suppressio.

CLASSIS IX. EVACUATORII.

ORDO I. CAPITIS.

OTORRHOEA. (172)

Auris purulentus fluxus.

EPIPHORA. (173)

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

HÆMORRHAGIA. (174)

Naris sanguineus fluxus.

CORYZA. (175)

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.

STOMACACE. (176)

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

PTYALISMUS. (177)

Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

ORDO II. THORACIS.

SCREATUS. (178)

Faucis mucis sonora evacuatio.

EXPECTORATIO. (179)

Pulmonis serosa et trachea evacuatio.

HÆMOPTYSIS. (180)

Pulmonis sanguinea cum tussi evacuatio.

VOMICA. (181)

Pulmonis purulenta, copiosa, improvise evacuatio.

ORDO III. ABDOMINIS.

RUCTUS. (182)

Rejectionis Flatuum frequens.

NAUSEA. (183)

Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.

VOMITUS. (184)

Rejectionis ingestorum convulsiva.

HÆMATEMESIS. (185)

Vomitum (184) sanguinis.

ILIACA. (186)

Vomitum (184) cum Obstipatione (166) fixa, et Colica (50).

CHOLERA. (187)

Vomitum (184) cum Diarrhœa (188), Colica (50).

DIARRHOEA. (188)

Rejectionis Fœcum liquidarum frequens.

LIENTERIA. (189)

Diarrhœa (188) Cibi immutati.

COELIACA. (190)

Diarrhœa (188) Chymi.

CHOLIRICA. (191)

Diarrhœa (188) rubella, absque Colica.

DYSENTERIA. (192)

Diarrhœa (188) cruenta, cum Colica (50), Tenesmo (194).

HÆMORRHOIS. (193)

Dejectio sanguinis cum Proctica (59), absque colica.

TENESMUS. (194)

Dejectio Muci frequens, parca, cum desiderio.

CREPITUS. (195)

Dejectio Flatuum copiosa, crebra.

ORDO IV. GENITALIUM.

ENURESIS. (196)

Urinæ stillicidium involuntarium, indolens.

STRANGURIA. (197)

Urinæ parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

DIABETES. (198)

Urinæ copiosissimæ frequens micturitio.

HÆMATURIA. (199)

Urinæ cruentæ micturitio.

GLUS. (200)

Urinæ viscosæ micturitio.

GONORRHOEA. (201)

Genituræ stillicidium.

LEUCORRHOEA. (202)

Muci e sinu muliebri effluxus.

MENORRHAGIA. (203)

Menstruatio copiosa, inordinata.

PARTURITIO. (204)

Fœtus maturi enixus laboriosissimus.

ABORTUS. (205)

Fœtus præmatura ejectio.

MOLA. (206)

Massæ carneæ, intus cyclicosæ, ex utero ejectio.

ORDO V. CORPORIS EXTERNI.

GALACTIA. (207)

Lactis effluxus.

SUDOR. (208)

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

CLASSIS X. DEFORMES.

ORDO I. EMACIANTES.

PHTHISIS. (209)

Marcor cum Hæctica (24), Tussi (155), Dyspnœa (160),
Expectoratione (179) purulenta, copiosa.

TABES. (210)

Marcor cum Hæctica (24), absque Expectoratione.

ATROPHIA. (211)

Marcor cum Atonia (120), absque Expectoratione et Hæctica.

MARASMUS. (212)

Marcor cum Aridura (227), absque Atonia, Expectoratione,
Hæctica.

RACHITIS. (213)

Marcor carnum tumentibus artuum Geniculis Capiteque;
ossibusque sæpe flexilibus.

ORDO II. TUMIDOSI.

POLYSARCIA. (214)

Corporis pinguedinosa intumescencia.

LEUCOPHLEGMATIA. (215)

Corporis emphysematosa (229) intumescencia.

ANASARCA. (216)

Corporis œdematosa (230) intumescencia.

HYDROCEPHALUS. (117)

Capitis œdematosa (230) intumescencia, hiantibus suturis
cranii.

ASCITES. (118)

Abdominis œdematosa (330) intumescencia.

HYPOSARCA. (219)

Abdominis nodosa intumescencia.

TŸMPANITES. (220)

Abdominis flatulenta (165) intumescencia, confians, sonora.

GRAVIDITAS. (221)

Abdominis a fœtu intumescencia nimia.

ORDO III. DECOLORES.

CACHEXIA. (222)

Pallor corporis œdematofus (230), cum debilitate, mœrore.

CHLOROSIS. (223)

Viridi-cinereus color faciei fœmineæ cum Citta (78).

SCORBUTUS. (224)

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (176), Labario (310).

ICTERUS. (225)

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, fœcibus albidis (Obstipatio Bilis).

PLETHORA. (226)

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnœa (160).

HYDROPIS nomine veniunt Anasarca (216), Ascites (218), Hypofarca (219), Hydrocephalus (217), Oedema (230), et Tympanites (220).

CLASSIS XI. VITIA.

ORDO I. HUMORALIA.

ARIDURA. (227)

Pars exsiccata, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

DIGITUM. (228)

Articuli exsiccatio friabilis occulta.

Digiti marcor Dolore periodico intensissimo.

EMPHYSEMA. (229)

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumore elasticus, concolor, subdiaphanus, indolens.

OEDEMA. (230)

Lympha stagnans intra tunicam cellulofam, Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

SUGILLATIO. (231)

Cruor effusus in tunicam cellulofam.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

INFLAMMATIO. (232)

Sanguis obstructus in vasis.

Tumor tensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

ABSCESSUS. (233)

Inflammatio suppurata, in Pus collecta.

Tumor mollis, æqualis, pruriens.

GANGRÆNA. (234)

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, mortua serpens in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

SPHACELUS. (235)

Gangræna (234) omnium solidorum partis.

Mortificatio putida ad ossa penetrans, indolens, properans.

ORDO II. DIALYTICA.

(Solutiones Continui.)

FRACTURA. (236)

Ossis solutio citra substantiæ dissolutionem.

LUXÂTURA. (237)

Geniculi solutio citra substantiæ dissolutionem.

RUPTURA. (238)

Tendinis solutio citra substantiæ dissolutionem.

CONTUSURA. (239)

Fibrarum solutio citra substantiæ dissolutionem.

PROFUSIO. (240)

Sanguinis effluxus copiosus e substantiæ dissolutione.

VULNUS. (241)

Substantiæ dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

AMPUTATURA. (242)

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

LACERATURA. (243)

Vulnus Fibrarum Cutisque laceratione factum.

PUNCTURA. (244)

Vulnus tendinis punctione factum.

MORSURA. (245)

Vulnus punctum armis animalium venenatis.

COMBUSTURA. (246)

Vulnus igne factum, inducta Eschara (281).

EXCORIATURA. (247)

Cutis remota a Carnibus vivis.

INTERTRIGO. (248)

Cuticulæ erosio madens dolensque.

RHAGAS. (249)

Fissura Cutis arida.

ORDO III. EXULCERATIONES.

(Suppurationes apertæ.)

ULCUS. (250)

Vulnus suppuratum partis carnosæ.

CACOETHES. (251)

Ulcus superficiale serpens, manans, perenne.

NOMA. (252)

Ulcus carnes integumentaue depascens, cicatricem inducens.

CARCINOMA. (253)

Ulcus schirri (284) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radiculatum, periodicè dolens.

OZENA. (254)

Ulcus intra antrum Highmori.

Ulcus occultum e Naribus fœtens.

FISTULA. (255)

Ulcus cortice calloso vaginatum.

Ulcus finuoso penetrans, intus cortice obtectum, ore angustatum.

CARIES. (256)

Ulcus Ossis separato perioestio.

Ulcus connivens, cum raris punctationibus indolens, sanie passim nigra se prodens.

ARTHROCACE. (257)

Ulcus Medullæ cum ossis Carie (256).

Ulcus malignum, tumens, dolore ostocopo (61).

COCYTA. (258)

Animalculum venenatum intra partem receptum.

Partis stigma dolore furioso.

PARONYCHIA. (259)

Serum corruptum sub tendinibus perioestioque.

Partis rubor dolentissimus, os destruens.

PERNIO. (260)

Partis ustio Gelu facta.

Pars albo-cærulescens, tempestatibus recrudescent, sæpe exulcerans.

PRESSURA. (261)

Digiti inflammatio (232) a frigore, in casum unguis tendens.
Inflammatio digiti circum unguem in suppurationem vergens.

ARCTURA. (262)

Unguis curvatura lateralis cutem secans.
Inflammatio digiti cum ulceratione laterali unguis.

ORDO IV. SCABIES.** Multiplicativa.***LEPRA.** (263)

Pustulæ (275), Eschara (281) ficca colorata, cum Nodis immerfis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (249).

TINEA. (264)

Pustulæ (275) Capillitii ficcæ, eschara (281) albo-flavescente, Pilisque abbreviatis erectis bulbosa-radicatis.

ACHOR. (265)

Pustulæ (275) exulcerantes, manantes communi pinguedinosa.

PSORA. (266)

Pustulæ (275), ichorosæ, escharoticæ (281), noctu imprimis pruriginosæ (64).

LIPPITUDO. (267)

Pustulæ (275) excoriantes Palpebrarum margines.

SERPIGO. (268)

Pustulæ (275) ficcæ, obsoletæ, serpentes, subfarinaceo-desquamantes.

HERPES. (269)

Pustulæ (275) escharoticæ (281), basi communi erysipelacea (10).

VARUS. (270)

Pustulæ (275) Glandularum sebacearum rubræ dispersæ, chronicæ.

BACCHIA. (271)

Vari (270) faciei cum nodis maculisque coloratis chronicis.

*** Simplex.*

* * *Simplex.***BUBO.** (272)

Glandula conglomerata inflammata, in suppurationem tendens.

ANTHRAX. (273)

Glandula subcutanea inflammata, in suppurationem malignam vergens.

Tumor rotundus, erisipelaceus (10), immerfus, dolentissimus, suppurandus apice acuto, pustula purifera.

PHLYCTÆNA. (274)

Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi inflammata, rupta dolens.

PUSTULA. (275)

Vesicula purulenta, turgens, delihcens pure.

PAPULA. (276)

Tuberculum fardum, coloratum, inflammatum, vix suppurandum.

HORDEOLUM. (277)

Tuberculum cysticosum, ovatum, in limbo palpebrarum, suppurans sæpius apice.

VERRUCA. (278)

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CLAVUS. (279)

Verruca (278) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

MYRMECIUM. (280)

Verruca (278) madida, mollis, denudata.

ESCHARA. (281)

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

ORDO V. TUMORES Protuberantes.

ANEURISMA. (282)

Arteriæ dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

VARIX.

VARIX. (283)

Venæ dilatatio.

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

SCIRRHUS. (284)

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione infensilis.

STRUMA. (285)

Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

ATHEROMA. (286)

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

ANCHYLOSIS. (287)

Tumor geniculorum, ligamenti capsulæque tensione expressa synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus, concolor.

GANGLION. (288)

Tumor tendinibus innatus, ovatus, mobilis, pulposus, indolens.

NATTA. (289)

Tumor tunicatus, musculis irradicatus, eminens, pulposus, indolens.

SPINOLA. (290)

Tumor supra vertebrae lumborum mollis, exiguus, Vertebrarum processibus dehiscentibus.

EXOSTOSIS. (291)

Tumor durus ex osse prominente enatus.

ORDO VI. PROCIDENTIÆ.

HERNIA. (292)

Intestini obiecti ultra propriam sedem protrusio.

PROLAPSUS. (293)

Viscus nudum relaxatum, elongato propendens ultra proprium locum.

CONDYLOMA. (294)

Tunica interior relaxata gibba.

SARCOMA. (295)

Caro nuda enata e vivo vulnere.

PTERYGIUM. (296)

Cuticula excrescens e cantho oculi, superficiem ejus obtegens.

ECTROPIUM. (297)

Palpebra inferior refupinato-inversa.

PHIMOSIS. (298)

Præputii intumescencia inflammata, glandem denudans incarcerationisve.

CLITORISMUS. (299)

Clitoridis intumescencia extra finum pudoris.

ORDO VII. DEFORMATIONES.**CONTRACTURA.** (300)

Geniculorum fixatio rigida.

GIBBER. (301)

Thoracis dilatatio prominens.

LORDOSIS. (302)

Ossium incurvatio.

DISTORTIO. (303)

Ossium ad latus non naturale flexio.

TORTURA. (304)

Oris ad latus flexio.

STRABISMUS. (305)

Oculi distorti et inæqualiter moti.

LAGOPHTHALMIA. (306)

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

NYCTALOPIA. (307)

Oculi visus nocturnus.

PRESBYTIA. (308)

Oculi visus remotus.

MYOPIA. (309)

Oculi visus approximatus.

LABARIUM. (310)

Dentes vacillantes in suis alveolis.

LAGOSTOMA. (311)

Labium superius oris fissum.

APELLA. (312)

Præputii abbreviatio absque inflammatione.

ATRETA. (313)

Meatus corporis imperforatus.

PLICA. (314)

Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

HIRSUTIES. (315)

Pili copiosiores longioresque.

ALOPECIA. (316)

Pilorum defluvium.

TRICHIASIS. (317)

Ciliorum distortio.

ORDO VIII. MACULÆ.

CICATRIX. (318)

Callus replens ulcerationes consolidatas.

NÆVUS. (319)

Macula quæcunque congenita.

MORPHÆA. (320)

Macula alba, depressa, lata.

VIBEX. (321)

Lineæ sanguinicolores subcuticula.

SUDAMEN. (322)

Maculæ rubræ, pulicares, glabræ, pungentes, evanescentes.

MELASMA. (323)

Macula cærulescens in parte tecta.

HEPATIZON. (324)

Macula grisea, subaspera, pruriens.

LENTIGO. (325)

Maculæ griseæ, confluentes, insensiles.

EPHELIS. (326)

Color fuscus partis insolatæ.

Heu mihi! tot mortes Homini, quot membra, malisque

Tot sumus infecti, Mors ut Medicina putetur.

THEORIA.

THEORIA.

1. CORPUS vivum constat Medullari cerebroso, et Corticali solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in medullari primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arctè custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium, et fluida hæc vicissim per solida præparat.
4. Medullare hoc nutritur tenuissimo spirituoso liquido corticali, sed flagrat electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad gratum salutare, et movens se retrahit ad ingratum noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque Acidis aut Putridis, utrisque multiplicativis. Sic vitatur Sanguis putrido, Serum acido.
7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: Criticæ ab acefcente, Phlogisticæ a putrescente, at Exanthematicæ a vivo? peregrino multiplicabili.
8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo hæc periculosiora, eo citius, per datam sic portam, simul ejecit quævis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhaustiatur. *
9. Quicquid præcipue adversum sentit, præcipue curat vel minora majoribus adfociat †, ut tota se his apponat.
10. CORTICALE solidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem Diæta eaque multiplici; ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, Morbi dicti.
11. MORBI tolluntur contraria causa ‡; hanc ut citius natura obtineat, Toxicæ misceantur ingerendis, Medicamenta dicta.
12. CONTRARIA hæc ex sapidis in fluida Solidaque et ex Oligis in medullare agentibus dignoscenda sunt: E contrariis itaque saporibus et odoribus primaria medicamenta eruenda; in his itaque Clavis Materiæ Medicæ.

* Evacuaciones duæ simul et semel possunt vix stare.

† Dolor dolorem trahit.

‡ Morbi morbis curantur.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. SAPIDA.

		Agunt in <i>Corticalæ</i> Vitale :			
		in <i>Fluidis</i> .	in <i>Solidis</i> .		
1	AQUOSA.	Mundificantia, Absorbentia,	Humectantia. Exsiccantia	SICCA.	1
2	ACIDA.	Refrigerantia, Balsamica,	Attenuantia. Tonica	AMARA.	2
3	DULCIA.	Edulcorantia, Incidentia,	Impinguantia. Corrodentia	ACRIA.	3
4	VISCOSA.	Inviscantia, Penetrantia,	Lubricantia. Abstergentia	SALSA.	4
5	PINGUIA.	Obtundentia, Inspissantia,	Emollientia. Adstringentia	STIPTICA.	5

II. OLIDA.

		Agunt in <i>Medullare</i> Animatum.			
Sensum	<i>Excitant</i>	AROMATICA,	<i>Sopiant</i>	VIROSA.	
Motum	<i>Spasificant</i>	ORGASTICA,	<i>Evacuant</i>	NAUSEOSA.	
Judicium	<i>Acuunt</i>	SPIRITUOSA,	<i>Confundunt</i>	TETRA.	
Libidinem	<i>Provocant</i>	AMBROSIACA,	<i>Suffocant</i>	HIRCINA.	

其行而後之

PARS TERTIA.

DEFINITIONES
GENERUM MORBORUM

A CLARISSIMO
RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,
PHILOS. ET MEDIC. D. HUIUSQUE PROFESS. ETC. ETC.

GOTTINGÆ—M DCC LXIV.

- CLAVIS CLASSIUM.

I. FEBRES.

Innati caloris augmentum præternaturale,
cum oris ficitate et gravitate corporis.

II. PROFLUVIA.

Humorum evacuatio, ab ordine, quantitate,
aut qualitate naturali abhorrens.

III. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

IV. DOLORES.

Sensationes molestæ, corporis et animi tran-
quillitatem turbantes.

V. SPASMI.

Solidorum mobilium contractiones, vel agi-
tationes.

VI. ADYNAMIÆ.

Sensationum, motuum, naturaliumve fun-
ctionum defectus, aut imminutiones.

VII. HYPERÆSTHESES.

Sensationes auctæ, vel perversæ.

VIII. CACHEXIÆ.

Male colorata corporis constitutio, cum de-
bilitate.

IX. PARANOIÆ.

Mentis aberrationes.

X. VITIA.

Mutationes in superficie corporis conspicuæ.

XI. DEFORMITATES.

Aberrationes solidorum ab ordine, positura,
habitu, figura, numero, aliisque qualita-
tibus.

CLASSIS I. FEBRES.

ORDO I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat, dein aliquandiu cessat, posteaque revertitur prævio frigore.

* *Simplices.*

QUOTIDIANA. (1)
Quolibet die aut nocte recurrit.

TERTIANA. (2)
Uno die vel nocte una invadit, sequente intermittit, tertio repetit.

QUARTANA. (3)
Uno die vel una nocte invadit, deinde biduum intermittit, quarto iterum redit.

QUINTANA. (4)
Singulo quinto die redit.

SEXTANA. (5)
Singulo sexto die repetit.

SEPTANA. (6)
Singulo septimo die revertitur.

OCTANA. (7)
Quolibet octavo die redit.

NONANA. (8)
Quovis nono die recurrit.

DECIMANA. (9)
Quovis decimo die recurrit.

VAGA. (10)
Alio post decimum diem, sed hæud fixo, recurrit.

MENSTRUUA. (11)
Viris circa fluxum hæmorrhoidalem, vel etiam citra illum, fœminis circa catamenia accidit.

L

** *Duplicata.*

* * *Duplicatæ.*

TERTIANA duplex. (12)

Quotidie accedit, interdum quoque bis uno die vacuo, accessionis verò tempora alternis diebus respondent.

QUARTANA duplex. (13)

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim præcedenti insultui respondent.

* * * *Triplicatæ.*

QUARTANA triplex. (14)

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

ORDO II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quæ vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

* *Simplices.*

QUOTIDIANA continua. (15)

Quotidie cum frigore accedit, calor verò per totum reliquum tempus durat.

SYNOCHUS. (16)

Facie rubra, cute humida, pulsu magno et frequenti, crisi perfecta terminantur intra 21 dies.†

AMATORIA. (17)

Febris paucarum horarum a magno frigore incipiens, ex vehementi concubitus expectatione.

PHRENITIS. (18)

Febris acuta, dolor capitis, delirium constans et vehemens.

EPIALA. (19)

In qua frigoris sensus perpetuus cum rigore contingit.

CAU-

† Ephemera est species.

CAUSOS. (20)

Febris ardentissima, tertio quoque die acerbior, cum im-
mensa siti, et siccissima atque nigra lingua.

ELODES. (21)

Febris cum profusissimo ac perpetuo sudore inde a primo
die, et magno virium lapsu. †

LETHARGUS. (22)

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox
opprimente iterum sopore.

TYPHOMANIA. (23)

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

LEIPYRIA. (24)

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus par-
vus et obscurus.

PHRICODES. (25)

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

LYNGODES. (26)

Febris in qua æger a principio usque ad crisin singultit.

ASSODES. (27)

Febris in qua æger ferè irrequietus est, et implacide mo-
lesteque habet, vel fastidio agitatur.

CHOLERICA. (28)

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

SYNCOPALIS. (29)

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

HYDROPHOBIA. (30)

Febris cum averfatione liquidorum, singultu, convulsione,
et delirio.

OSCITANS. (31)

Febris cum perpetua oscitatione.

ICTERICODES. (32)

Auriginosa febris, quæ cutem colore flavo inquinat, citra
hepatis inflammationem.

PES-

† Typhodes et Sudor Anglicanus ejus species sunt.

PESTILENTIALIS. (33)

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculæ oriuntur cum leipyrria, ingenti siti, spiritu, sudore, et dejectionibus fœtidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

SIRIASIS. (34)

Febris infantibus propria, in qua cutis sicca, pallida, inapetentia, oculi concavi, fontanellæ subsidientia.

* * *Compositæ.***1. Exanthematicæ.****VARIOLOSA. (35)**

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia, et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculæ erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

MORBILLOSA. (36)

Synochus contagiosa, cum tussî sicca et madore oculorum, in qua maculæ rubellæ, latecentes, paulum elevatæ erumpunt, quæ deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

MILIARIS. (37)

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure, ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulæ prurientes milii feminis magnitudine, rubræ vel albæ, sero primum limpidio, deinceps subalbo perlaram colore non dissimili, plenæ, facie intacta, sudor multus, fœtidus.

PETECHIALIS. (38)

Febris maligna, exanthemata morfibus pulicum ferè similia, flavescientia, rubra, vel livida.

SCARLATINA. (39)

Synochos, maculæ coccineæ crebriores ac latiores, quam morbilli, nodulis subflavis ad inflar capitis acicularum, ornatae, fugaces, in squamulas dehiscentes.

URTICATA. (40)

Synochos quotidiana continua mitior, tubercula punctuosis urticarum similia, rubra, promiaentia, fugacia.

BULLOSA. (41)

Maligna, vesiçulæ fero sublimpido repletæ, magnitudine nucis avellanæ et majores, in variis corporis partibus, facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

VARICELLA. † (42)

Variolæ spurix; ephemera, pustulæ variolis fimillimæ, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccata, et in squamulas deciduæ, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

PEMPHINGODES. (43)

Febris, quæ pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

APHTHOSA. (44)

Maligna, cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

2. Inflammatoriæ.

PHRENISMUS. (45)

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quæ signa vero admodum ambigua.

CHEMOSIS. (46)

Vehemens adnatæ oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

OPHTHALMITES. (47)

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et præcipue choroideæ; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio.

Vulgo Phlegmone dicitur.

OTITES. (48)

Inflammatio auris internæ; dolor immanis in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

ANGINA. (49)

Faucium inflammatio; febris continua, respirandi ac deglutiendi difficultas, præfocationis metus.

PLEU-

† Hæc Varicella facillime illudere Medicis sub specie variolosæ potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

PLEURITIS. (50)

Pleuræ inflammatio; febris continua, dolor in latere thoracis pungens, tussis sicca, dyspnœa.

PERIPNEUMONIA. (51)

Pulmonum inflammatio; febris continua, dolor thoracis obtusus, gravativus, tussis humida aliquando cruenta, difficultas anhelitus angustiae.

MEDIASTINA. (52)

Mediastini inflammatio; febris continua, incendium in thorace, offendiculum quoddam ad sternum in inspiratione, respiratio frequens, tussis cum sputis coloratis, orthopnœa; an semper?

PERICARDITIS. (53)

Pericardii inflammatio; omnia ut in Mediastina, urgente morbo syncope.

CARDITIS. (54)

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in Peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inæqualis, hydrophobia; an semper?

PARAPHRENITIS (55)

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnœa, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

GASTRITIS. (56)

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, fitis, vomitus ingestorum, singultus.

ENTERITIS. (57)

Intestini inflammatio; febris afflodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

HEPATITIS. (58)

Jecinoris inflammatio; febris continua hypochondrii dextri dolor tensivus, tussis sicca, icterus, interdum vomitio bilis et per alvum dejectio.

SPLENITIS. (59)

Lienis inflammatio; febris continua, hypochondrii finistri distentio atque tumor, dolor pulsans, molestus dexter decubitus.

MESENTERITIS. (60)

Mesenterii inflammatio; febris varia occulta et lenta phricodes aut quotidiana continua, dolor colicæ similis, egestiones chylosæ et ichorosæ, nullo doloris sensu defluentes.

OMENTITIS. (61)

Omenti inflammatio; febris continua cum dolore et tumore in regione epigastrica et hypogastrica.

PERITONITIS. (62)

Peritonæi inflammatio; febris assidua, tumor ventris, et dolor punctorius.

MYOCOLITIS. (63)

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in Peritonite.

PANCREATICA. (64)

Pancreatis inflammatio. Notæ deficient.

NEPHRITIS. (65)

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina parca flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio.

CYSTITIS. (66)

Vesicæ urinariæ inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

HYSTERITIS. (67)

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

ERYSIPELACEA. (68)

Ephemera, erysipelatis expulsionem efficiens.

PODAGRICA. (69)

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

PANARITIA. (70)

Continua, panaritii gravioris comes.

CYSSOTIS. (71)

Ani inflammatio, dolor, tenesmus.

3. Symptomaticæ.

APOPLECTICA. (72)

Continua apoplexiæ superveniens.

CATARRHALIS. (73)

Vespertina, catarrhis focia.

RHEUMATICA. (74)

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulæ purulentæ.

HÆMORRHOIDALIS. (75)

Ephemera, dolor spinæ, hæmorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

LACTEA. (76)

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

VULNERARIA. (77)

Graviori vulnere superveniens.

SUPPURATORIA. (78)

Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superveniens, continua.

LENTA. (79)

Febricula quotidiana in morbo longo.

HECTICA. (80)

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquativa et phthisi.

CLASSIS II. PROFLUVIA.

* *Hæmorrhagiæ.*

HÆMORRHAGIA. (81)

Sanguinis e vulnere profusio.

EPISTAXIS. (82)

Sanguinis e naribus profusio.

HÆMOPTOE. (83)

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

HÆMOPTYSIS. (84)

Sanguinis e pulmonibus aut trachea rejectio per tussim.

STOMACACE. (85)

Gingivarum cruentatio.

ODONTIRRHŒA. (86)

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi eruptio.

OTORRHŒA. (87)

Sanguinis ex aure effluxus.

OPHTHALMORRHAGIA. (88)

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

HÆMATEMESIS. (89)

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

HEPATIRRHŒA. (90)

Fluxus hepaticus; diarrhœa aquosa rubella instar loturæ carniū recentium.

CATARRHEXIS. (91)

Sanguinis puri ex alvo profusio.

HÆMATURIA. (92)

Mictio e renibus cruenta, quæ sanguine urinæ exquisitè permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

CYSTIRRHAGIA. (93)

Mictio cruenta e vesica dolorifica, qua sanguis urinam non æqualiter perfundit, ac in imo subsidens in grumos con-
crescit; ejus quoque portio aut grumus interdum citra
urinam excidit.

Hæmorrhoides vesicæ appellant.

STYMATOSIS. (94)

Hæmorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

HÆMATOPEDESIS. (95)

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

MENORRHAGIA. (96)

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

ABORTIO. (97)

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo
aut mola subsequente.

* * *Apocenosfes.*

CATARRHUS. (98)

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

EPIPHORA. (99)

Lachrymæ involuntarium profluvium.

CORYZA. (100)

Catarrhus narium cum feri tenuioris distillatione.

OTOPUOSIS. (101)

Puris ex aure effluxus; catarrhus auris sordidus.

OTOPLATOS. (102)

Humiditatis olidæ retro aurem excretio.

PTYALISMUS. (103)

Copiosa salivæ profusio.

VOMICA. (104)

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis nigri e pulmonibus
resectio per tussim.

DIARRHOEA. (105)

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo profluvium, sine
vehementi sensu doloris.

PUORRHOEA. (106)

Puris sinceri ex alvo excretio.

DYSENTERIA. (107)

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmodes alvi dejectio.

LIENTERIA. (108)

Lævitas intestinorum qua, quæ per alvum descendunt, alimentis assumptis substantia et colore finitima.

COELIACA. (109)

Lævium æqualium et quasi chyli aut cremoris specie dejectio.

CHOLERA. (110)

Vomitus biliosi multi alvique dejectiones, cum periadynia.

PITUITARIA. (111)

Mera pituitæ, loco stercoris, excretio diuturna, cum contabescencia.

LEUCORRHOIS. (112)

Pituitæ sinceræ et cruentæ ex alvo excretio tenesmodes, periodica.

ENEURESIS. (113)

S. incontinentia urinæ; mictio urinæ involuntaria constans, sine aerimonix et doloris sensu.

DIURESIS. (114)

Immodica urinæ prorsus aqueæ excretio, in morbo spastico, periodica.

DIABETES. (115)

Immodicum urinæ profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

PUOTURIA. (116)

Mictio purulenta.

CHYLARIA. † (117)

Urinæ mucosæ, albæ, paucae, et quasi verminosæ, excretio.

GONORRHOEA. (118)

Invita feminis, liquoris prostaticarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis insomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

LEU-

LEUCORRHOEA. (119)

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

EXONEIROSI. (120)

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido coele profusio.

HYDROPEDESIS. (121)

Sudor immodicus.

GALACTIA. (122)

Lactis ex mammis stillicidium.

HYPERCATHARSIS. (123)

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

ECPHYSE. (124)

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

DYSODIA. (125)

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

CLASSIS III. EPISCHESES.

GRAVEDO. (126)

Catarrhus narium impeditus cum carebaria, voce haud bene sonora, spiritu nonnihil difficili, qui nec nisi hiantе ori duci potest.

FLATULENTIA. (127)

Flatuum impedita supra infraque expulsio, cum intumescencia ventris.

OBSTIPATIO. (128)

Stercoris excretio impedita.

ISCHURIA. (129)

Urinæ suppressio.

AMENORRHOEA. (130)

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex toto vel ex parte cohibitus.

DYSLOCHIA. (131)

Lochiorum suppressio aut imminutio.

DEUTERIA. (132)

Secundinarum retentio.

AGALAXIS. (133)

Lactis defectus.

CLASSIS IV. DOLORES.

ANXIETAS. (134)

Molesta sensatio circa præcordia, quæ præsentem rerum statum fastidit.

BLESTRISMUS. (135)

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

PRURITUS. (136)

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CATAPSYXIS. (137)

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

RHEUMATISMUS. (138)

Cutis et musculorum dolor. †

ARTHRITIS. (139)

Articulorum dolor. ‡

CEPHALALGIA. (140)

Capitis dolor brevis.

CEPHALÆA. (141)

Capitis dolor longus.

CLAVUS. (142)

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

HEMICRANIA. (143)

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CAREBARIA. (144)

Molestia capitis velut gravitas quædam.

ODONTALGIA. (145)

Dolor dentium.

HÆMODIA. (146)

Dentium stupor cum dolore.

ODAXISMUS. (147)

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

OTAL-

† Lumbago, Ischias, Glossagra, et Pleurodyne Sauvag. sunt species.

‡ Species sunt Chiragra et Gonagra.

OTALGIA. (148)

Dolor auris internæ et externæ.

ACATOPOSIS. (149)

Deglutitio difficilis.

CIONIS. (150)

Dolorifica uvulæ crassities.

HIMANTOSIS. (151)

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CARDIOGMUS. (152)

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

MASTODYNIA. (153)

Mammarum dolor.

SODA. (154)

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

PERIADYNIA. (155)

Ventriculi dolor.

PNEUMATOSIS. (156)

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CARDIALGIA. (157)

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea sæpeque vomitu.

ENCAUSIS. (158)

Ardor in stomacho cum inextinguibili siti.

NAUSEA. (159)

Inane vomendi desiderium.

COLICA. (160)

Dolor spasticus intestinorum cum obstipatione, nausea, et vomitu.

EILEMA. (161)

Dolor in intestino fixus velut clavi muro impacti.

ILEUS. (162)

Colica acuta cum vomitu demum excrementorum.

STRANGURIA. (163)

Urinæ densæ rubræ mictio parca, frequens, ardore in urethra excepta.

DYSURIA. (164)

Urinæ stillicidium dolorificum citra ardorem in urethra.

LITHIASIS. (165)

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subsidentibus.

TENESMUS. (166)

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil præter pauca mucosa et cruenta egeritur.

CLUNESIA. (167)

Dolor in podice.*

CEDMA. (168)

Dolor in partibus genitalibus. †

HYSTERALGIA. (169)

Dolor ventris parturientium similis.

DYSMENORRHOEA. (170)

Profluvium sanguinis uterini menstruum dolorificum.

DYSTOCIA. (171)

Partus laboriosus, difficilis.

ATOCIA. (172)

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus absolvi non potest.

PRIAPISMUS. (173)

Colis erectio dolorifica permanens, citra libidinis stimulum.

PSORIASIS. (174)

Durities scroti cum intensa prurigine, et interdum quoque exulceratione.

PODAGRA. (175)

Dolor rheumatico-arthriticus in pede acutus.

OSTEOCOPUS. (176)

Dolor in osse fixus.

PSOPHOS. (177)

Streptus ossium.

VOLATICA. (178)

Dolor per tractum majorum cutis vasorum oberrans.

EPIPHLOGISMA. (179)

Ardor alicujus partis velut a pruna obortus.
In aure dicitur Pyrosis.

* Proctica Sauvages. et Linn.

† Pudendagra Linn.

CLASSIS V. SPASMI.

TETANUS. (180)

Totius corporis aut folius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

OPISTHOTONUS. (181)

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

EPISTHOTONUS. (182)

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CATOCHUS. (183)

Tetanus cum privatione sensuum.

TREMOR. (184)

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

FRIGUS. (185)

Cum extremæ partes membrorum inalgescunt.

HORROR. (186)

Totius corporis albor cum tremore.

RIGOR. (187)

Idem et violentior cum trismo et sensu frigoris in interioribus partibus.

EPILEPSIA. (188)

Agitatio convulsiva universalis, chronica, periodica, cum oppressione sensoriorum, exituque spumæ ex ore.

ECLAMPsia. (189)

Epilepsia acuta.

HIERANOSOS. (190)

Agitatio corporis vel artuum convulsiva, continua, chronica, cum integritate sensuum.

CONVULSIO. (191)

Agitatio corporis vel artuum violenta, periodica, cum integritate sensuum.

RAPHANIA. (192) Linn.

Convulsio cum spastica articularum contractione et dolore immani, periodica.

CHOREA. (193)

Convulsio saltatoria aut procursiva.

Tarantismus est species.

CRAMPUS. (194)

Digitorum, manuum, pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

SCELOTYRBE. (195)

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

ANGONE. (196)

Faucium prælocatio acuta, sine inflammatione.

Angina convulsiva et Suffocatio hysterica ejus sunt species.

GLOSSOCELE. (197)

Linguae violenta, acuta, extrusio.

GLOSSOCOMA. (198)

Lingua violenta, acuta, revulsio.

HIPPOS. (199)

Oculorum constans agitatio; malum ab ortu contractum.

ILLOSIS. (200)

Oculorum perversio acuta.

CINCLESIS. (201)

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CATACLASIS. (202)

Alterutrius oculi oclusio spastica, acuta.

CILLOSIS. (203)

Cilii superioris perpetuus tremor.

STERNUTATIO. (204)

Membranæ narium agitatio convulsiva, impetuosam aëris inspirationem, similemque mox expulsionem per nares cum strepitu inducens.

TUSSIS. (205)

Convulsiva et sonora aëris e pulmonibus expulsio.

CLAMOR. (206)

Vocis anxia exaltatio.

TRISMUS. (207)

Stridor dentium inter se colliforum.

CAPISTRUM, (208) f. Spasmus Maxillæ inferioris.

Immobilitas ejus, qua os arctè clauditur.

SARDIASIS, (209) f. Spasmus Cynicus.

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

GELASMUS, (210) f. Rîsus Sardoniûs.

Involuntarius rîsus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

INCUBUS. (211)

Suffocatio in infomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipientis.

SINGULTUS. (212)

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora recurrens.

PALPITATIO. (213)

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriæve, temporaria agitatio.

VOMITUS. (214)

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

RUCTUS. (215)

Violenta flatus ventriculi inclusi per os explosio.

RUMINATIO. (216)

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

OESOPHAGISMUS, (217) f. Spasmus Oesophagi.

Ciborum deglutorum in œsophago subsistentium remora dolorifica.

HYPOCHONDRIASIS. (218)

Anxietas præcordialis, cum spasmis ventriculi ac intestinorum, variisque congestionibus conjuncta, chronica.

HYSTERIA. (219)

Eadem in mulieribus.

PHLOGOSIS, (220) f. Æstus volaticus.

Subitus fugaxque æstus cum rubore faciei.

DIGITUM. (221)

Primæ phalangis digitorum invita et constans incurvatio.

CLASSIS VI. ADYNAMIÆ.

LASSITUDO. (222)

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae ad motum.

ASTHENIA. (223)

Languor aut debilitas corporis.

TORPOR. (224)

Sensus motusque imminutus in parte carnea.

ADYNAMIA. (225)

Impotentia, qua se ægri nullo modo movere aut in lecto erigere possunt.

PARALYSIS. (226)

Sensus motusve aut utriusque defectus in singulari parte externa.

PARAPLEGIA. (227)

Omnium partium sub collo, aut saltem medii corporis artuumque inferiorum paralyfis.

HEMIPLEGIA. (228)

Paralyfis alterutrius lateris.

APOPLEXIA. (229)

Subita functionem animalium cessatio, cum stertore et magno pulsu.

CATALEPSIS. (230) f. Catoche.

Subita functionem animalium cessatio, in qua correptus vigilantis formam figuramque retinet, articuli que eum sistunt, qui ipsis datur.

CARUS. (231)

Veternus sopor, liberam respirationem sine stertore conservans, ex quo ægri vix excitantur.

COMA,

COMA, (232) f. Cataphora.

Sopor in quo ægri vellicati evigilant, et mox in ipsum re-
buntur.

SOMNOLENTIA. (233)

Inclinatio in fomnum iusto major.

HYPOPHASIS. (234)

Albi oculorum inter dormiendum subapparitio.

PTOSIS. (235)

Impotentia attollendi palpebram superiorem.

AMBLYOPIA. (236)

Vifus imbecillitas, integro oculo.

MYDRIASIS. (237)

Pupillæ dilatatio, quæ vifioni nocet.

AMAUROSIS. (238)

Cæcitas sine fenfibili oculorum labe, præter mydriafin.

CATARACTA. (239)

Cæcitas cum obfcurata lente, retro pupillam confpicua.

SYNIZESIS. (240)

Cæcitas cum pupillæ coalitione.

GLAUCOMA. (241)

Cæcitas turbatis humoribus et oculo flaccido.

ACHLYS. (242)

Corneæ obfcuritas, vifum imminuens aut tollens.

NYCTALOPIA. (243)

Vifus noctu faltem contingens.

HEMERALOPIA. (244)

Vifus noctu abolitus.

HEMALOPIA. (245)

Vifus dimidiatus.

DYSICOIA. (246)

Imbecillitas auditus.

SURDITAS. (247)

Auditus abolitus.

ANOS.

ANOSMIA. (248)

Odoratus abolitus.

APOGEUSIS. (249)

Gustus abolitus.

ASAPHIA. (250)

Vocis obscuritas.

CLANGOR. (251)

Vox acuta cum fridore.

RAUCITAS. (252)

Vox aspera et obscura, quæ vix nisi a prope adstantibus exaudiri potest.

APHONIA. (253)

Vocis privatio.

LEPTOPHONIA. (254)

Vitium vocis nimium gracilis.

OXYPHONIA. (255)

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

RHENOPHONIA. (256)

Vox nasalis, quæ ex naribus haud simul editur.

MUTITAS. (257)

Loquelæ privatio.

TRAULOTIS, Blæfitas. (258)

Vitiosa literarum f et r pronuntiatio.

PSELLOTIS, Balbuties. (259)

Cum inter pronunciandum aut litera aut syllaba aufertur et eliditur.

ISCHNOPHONIA. (260)

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabæ cito copulari non potest.

BLATERISMUS. (261)

Vitium pronuntiationis, quo sermo præcipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

SUSPIRIUM. (262)

Inspiratio lenta, profunda, gemibunda.

OSCITATIO. (263)

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

PANDICULATIO. (264)

Oscitatio cum artuum extensione.

APNOEA. (265)

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

MACROPNOEA. (266)

Respiratio per longa intervalla contingens.

DYSPNOEA. (267)

Respirandi difficultas continua, levior.

ASTHMA. (268)

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

ORTHOPNOEA. (269)

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi erecto cervice peragenda.

PNIGMA, Catarrhus suffocativus. (270)

Difficillima respiratio, cum subitanea sensuum motusque interceptione, stertore, pulsuque intermittente.

RENCHUS, f. Stertor. (271)

Sonus ex naribus editus.

RHOCHMOS, f. Ronchus. (272)

Sonus stertorosus intra fauces.

LIPOTHYMIA. (273)

Subita sensus motusque interceptio, cum sudore frigido, tintu aurium, pulsu ac respiratione debili.

SYNCOPE. (274)

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respiratione perceptibili, abolitoque omni sensu, et extincto calore.

ASPHYXIA. (275)

Abolitio pulsus.

APEPSIA. (276)

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

DYSPEPSIA. (277)

Tarda difficilisque concoctio.

DIAPHTHORA. (278)

Ciborum corruptio in ventriculo.

ANOREXIA. (279)

Inappetentia sine fastidio ciborum.

ANATROPE. (280)

Inappetentia nauseabunda.

ADIPSIA. (281)

Sitis defectus.

ACYISIS. (282)

Sterilitas muliebris ; conceptionis defectus.

AGENESIA. (283)

Rei venereæ impotentia in viro ; libidinis defectus.

ANODYNIA. (284)

Doloris defectus.

CLASSIS VII. HYPERÆSTHESES.

ANTIPATHIA. (285)

Certarum rerum visu, olfactu, aut gustu percipiendarum, talis averfatio, ut ex earundem perceptione gravia symptomata inducantur.

AGRYPNIA. (286)

Somni defectus.

PHANTASMA. (287)

Perceptio corporum ante oculos observantium, quæ non adfunt.

CALIGO. (288)

Qua subito visui omnia nigra se repræsentant.

HÆMALOPIA. (289)

Qua omnia rubra apparent.

MARMARYGE. (290)

Fulgor ante oculos corruscans.

DYSOPIA. (291)

Vifus duplicatus.

SUSURRUS. (292)

Soni non existentis perceptio.

VERTIGO. (293)

Imaginatio, qua omnia homini cum semetipfo circumagi videntur.

APOGEUSIA. (294)

Sapor in ore depravatus.

POLYDIPSIA. (295)

Continuum potus desiderium.

BULIMUS. (296)

Vehemens fames, cum lipothymia.

ADDEPHAGIA. (297)

Voracitas.

CYNORRHEXIA. (298)

Fames canina; addephagia cum vomitu subsequente.

ALLOTRIOPHAGIA. (299)

Rerum non esculentarum devoratio arbitraria.

MALACIA. (300)

Eorundem anxia appetentia.

PICA. (301)

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendæ vehemens desiderium.

BOMBUS. (302)

Murmur ex flatibus, quod auribus percipitur.

CELSA. (303)

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum oberrantium subter cute.

CLASSIS VIII. CACHEXIÆ.

CACHEXIA. (304)

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CHLOROSIS. (305)

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

ICTERUS. (306)

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immixta linteamina colore croceo.

MELANCHLORUS. (307)

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

ATROPHIA. (308)

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hectica.

TABES. (309)

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, at sine dyspnœa et tussi.

PHTHISIS. (310)

Extenuatio corporis cum febre lenta vel hectica, dyspnœa, et tussi. *

HYDROTHORAX. (311)

Cachexia cum dyspnœa et effusione aquæ intra pectus, strepitum concussione intus facientis.

RACHITIS. (312)

Atrophia infantum cum epiphyfium protuberantia.

ANA-

* In Atrophia sola pinguedo absumitur, nec æque restituitur; in Tabes et Phthisi caro simul minuitur.

ANASARCA. (313)

Totius corporis intumescencia, aquosa, mollis, digiti impressi vestigium aliquamdiu retinens, cum pallore cutis.

ASCITES. (314)

Tumor abdominis, scroti, et crurum aquosus, cum atrophia superiorum partium.

Abdomen impulsu sonum collectæ permotæque intus aquæ præbet.

HYDROCYSTIS. (315)

Hydrops faccatus pleuræ, peritonæi, aut visceris abdominalis.

TYMPANITES. (316)

Tumor abdominis renitens, pulsatione sonitum edens, cum obstipatione et atrophia.

HYSTEROPHYSE. (317)

Tumor hypogastrii ab utero flatu distento.

SCORBUTUS. (318)

Cachexia cum lassitudine, maculis artuum lividis, stomacace, ulceribus.

SIPHYLIS. (319)

Cachexia contagiosa ex contagio venereo, cum tumoribus ossium et ulceribus fancium partiumque obscœnarum, prægressis plerumque bubonibus aut gonorrhœa.

LEPRA, Græcorum, f. Pfora. (320)

Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

ELEPHANTIASIS, f. Lepra Arabum. (321)

Mutatio cutis in tumores lividos, dueros, faniem foetidam crustosam emanantes.

ELEPHANTIA, Arabum. (322)

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

PLICA, f. Rhopalosis. (323)

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contrahuntur, ut explicari nullo modo possint.

PHTHIRIASIS. (324)

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

PHYSCONIA. (325)

Intumescencia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutata.

PARACYISIS. (326)

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

GANGRÆNA. (327)

Inflammatae partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

SPHACELUS. (328)

Perfecta mortificatio, qua pars sensum motum et innatum calorem tota amisit, fitque prorsus nigra, mollis, putris, et cadaverosa.

CLASSIS IX. PARANOIÆ.

ATHYMIA. (329)

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

DELIRIUM, Paraphrosyne. (330)

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda.

Carpologia ejus est species.

MANIA. (331)

Infania longa, ridicula aut furibunda.

Furorem uterinum et Satyriasin pro speciebus habeo.

MELANCHOLIA. (332)

Infania longa cum mœstitia ac timore.

Nostalgia ejus species est.

ECSTASIS. (333)

Infania, quæ brevi tempore durat.

ECPLEXIS. (334)

Excessus mentis qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

ENTHUSIASMUS. (335)

Est veluti cum quidam in sacris faciendis mente capiuntur, si qua viderint audiverintve.

STUPIDITAS, Morosis, Fatuitas. (336)

Mentis imminuta et infirmata functio, seu quædam ignavia, citra delirium et soporem.

AMENTIA, Anoiæ. (337)

Imaginationis vel mentis occasus atque privatio, qua jam ab ipso ortu affecti vix mentis inopia loqui discunt.

OBLIVIO. (338)

Memoriæ privatio.

SOMNIUM. (339)

Visum, quod in somno occurrit, tanquam verum fit existimatum.

Pavor ejus est species.

HYPNOBATASIS. (340)

Somnium in quo homo affurgit, ambulat, et diversa vigilantium opera exercet.

CLASSIS X. VITIA.

* *Inflammationes.*

OPHTHALMIA. (341)
Inflammatio albi oculorum.

BLEPHAROTIS. (342)
Inflammatio palpebrarum.

ERYSIPELAS. (343)
Inflammatio lata cutis, quæ splendet et leviter ac æqualiter tumet.

HIEROPYR. (344)
Erysipelas cum eminentibus ardentibus pustulis.
Zoster dicitur, si abdominis cutem occupat.

PARONYCHIA. (345)
Inflammatio dolorifica in summitate digitorum.

ONYCHIA. (346)
Inflammatio digiti lateralis ab ungue profundius in cutem demerso.

ENCAUSIS. (347)
Inflammatio cutis ab ustione.

PHIMOSIS. (348)
Inflammatio, aut œdematodes tumor præputii, quo glans nudari non potest.

PARAPHIMOSIS. (349)
Inflammatio præputii, retro glandem adducti, ut eam tegere non possit.

PERNIO. (350)
Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore; in exulcerationem tendens.

* * *Tumores.*

* * *Tumores.***PHLEGMONE.** (351)

Tumor dolens renitens inflammatorius cum rubore, ovi falem gallinacei magnitudine.

FURUNCULUS. (352)

Tuberculum acutum apostematodes, ovum columbinum magnitudine non excedens.

ANTHRAX. (353)

Quasi malignus furunculus, qui partem mox adurit, pustulas circum se ardentissimas ciet, tandem crusta nigra vel cinerea obducitur, et corruptæ carnis lobum excutit, qua excidente ulcus cavum fordidumque manet.

ABSCCESSUS. (354)

Collectæ in inflammato loco materiæ in pus aut in alienam substantiam conversio.

ONYX. (355)

Abcessus inter corneæ laminas.

HIPPOPYON. (356)

Abcessus intra oculum.

PHYGETHLON. (357)

Phlegmone in glandulis emergens.

EMPYEMA. (358)

Abcessus in thorace, latus aut partem ejus in tumorem attollens, cum febre hectica, prægressa pleuritide vel peripneumonia.

PHYMA. (359)

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior, minusque rubens ac dolens.

ECTHYMATA. (360)

Tubercula ex cute subito erumpentia, modo colorem cutis non excedentia, modo rubra fugacissima.

URTICARIA. (361)

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

PARULIS. (362)

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

EPULIS. (363)

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

ANCHYLOPS. (364)

Tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.

PARAGLOSSA. (365)

Lingua tumida.

CHILON. (366)

Labium tumidum et inflammatum.

SCROFULA. (367)

Tumor glandularum colli et mesenterii indolens obduratus.

BUBON. (368)

Tumor glandulæ inguinalis.

BRONCHOCELE. (369)

Tumor glandulæ thyreoideæ.

PAROTIS. (370)

Tumor glandulæ ejusdem nominis.

GONGRONA. (371)

Collum tumidum.

SPARGANOSIS. (372)

Tumor mammarum in lactantibus a lactis copia.

COILIMA. (373)

Intumescencia abdominis subita, flatulenta.

SCIRRHUS. (374)

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

CANCER. (375)

Tumor durus, dolore lancinante gravis, inæqualis, livescens aut nigricans.

SARCOMA. (376)

Carnis incrementum tuberculi tumorifve specie.

POLYPUS. (377)

Sarcoma intra nares, prælongum, pluribus appendicibus adhærens.

CONDYLOMA. (378)

Tuberculum durum, pene indolens in ani margine.

Ejus species Ficus et Thymus a figura ita dictæ.

GANGLION. (379)

Tumor durus, concolor, indolens tendini infidens.

RANULA, Batrachus. (380)

Tumor ad frenulum linguae folliculosus, materiam spissam aut tofaceam complexus.

TERMINTHUS. (381)

Tuberculum rotundum, nigrum, præsertim in tibiis enascens, humorum glutinosum et subrubrum exulceratione emittens.

OEDEMA. (382)

Tumor frigidus, laxis, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, pressio digito cedens.

ENCEPHALOCLE. (383)

Cerebrum per hiatum calvæ extrorsum eminens.

HYDROCEPHALUM. (384)

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

HYDROPTHALMIA. (385)

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo ut is palpebris operiri non possit.

SPINA, bifida. (386)

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinæ loco, posterioribus vertebrarum dehiscens processibus emergens.

HYDROMPHALUS. (387)

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

HYDROCELE. (388)

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

HYDROPS, Scroti. (389)

Tumor tunicæ scroti cellulosæ aquosus.

STEATITES. (390)

Abdominis intumescencia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

PNEUMATOSIS. (391)

Totius corporis intumescencia a flatu.

EMPHYSEMA. (392)

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulofam cutis habitum ingreffo formatus.

HYSTEROPTOSIS. (393)

Uteri vel vaginæ procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CYSTOPTOSIS. (394)

Membranæ vesicæ urinaræ interioris protuberantia extra urethram.

ARCHOPTOMA. (395)

Intestini recti procidentia.

BUBONOCELE. (396)

Tumor in inguinē ex annulo musculi obliqui ab ingreffo intestino omentove, vel utroque conjunctim.

OSCHEOCELE. (397)

Idem in scroto tumor.

OMPHALOCELE. (398)

Idem ex umbilico.

MEROCELE. (399)

Tumor ab intestino infra ligamentum Poupartii elapso.

ENTEROCELE, Ovularis. (400)

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in superiori et interna femoris parte prope perinæum.

ISCHIATOCELE. (401)

Tumor ab intestino per hiatum intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

ELYTROCELE. (402)

Hernia in vagina uteri eminens.

HYPOGASTROCELE. (403)

Hernia intestini ventralis.

CYSTOCELE. (404)

Prominentia vesicæ per musculi obliqui annulum, sub qua urina nonnisi pressa exterius tumore redditur.

CYRTOMA. (405)

Tumor particularis abdominis a flatibus.

HYDRENTEROCELE. (406)

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

VARIX. (407)

Tumor venæ mollis, lividus, aut niger.

ANEURISMA. (408)

Tumor arteriæ mollis et pulsans.

CIRSOCELE. (409)

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inæqualis, renitens.

GASTROCELE. (410)

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

HEPATOCELE. (411)

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

SPLENOCELE. (412)

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

HYSTEROCELE. (413)

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

HYGROCIRSOCELE. (414)

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

SARCOCELE. (415)

Testis sarcoma aut scirrhus.

PHYSOCELE. (416)

Tumor a flatu herniam mentiens.

EXOSTOSIS. (417)

Tumor in osse circumscriptus.

HYPEROSTOSIS. (418)

Tumor totius ossis.

PÆDARTHROCACE. (419)

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

ENCYSTIS. (420)

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus, et materiam spissam complexus.

Atheroma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris ejus species.

STAPHYLOMA. (421)

Protuberantia corneæ obscuratæ.

STAPHYLOSIS. (422)

Procidencia uveæ ex cornea disrupta.

FUNGUS. (423)

Tumor ad articulum mollis, œdematodes.

TOFUS. (424)

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

FLEMEN. (425)

Tumor pedis circa talos.

*** *Extuberantiæ.* †

VERRUCA. (426)

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel penfile.

Unde species Acrochordon, Acrothymium, Myrmæcium.

PORRUS. (427)

Verruca in obfcœnis mollis, madida, tactu dolens.

CLAVUS. (428)

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantif-
que pedum.

CALLUS, f. Tylloma. (429)

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum
plantis. 2. Tunica pallida, dura, quæ sine sensu est, in
ulcere.

ENCANTHIS. (430)

Intumescencia carunculæ lacrymalis.

PLADAROTIS. (431)

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

PINNULA. (432)

Excrefencia corneæ tunicæ inhærescens.

PTERYGIUM. (433)

Excrefencia, membranulæ forma, rubra supra album oculi.

HOR-

† Extuberantiæ supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

HORDEOLUM, Cithæ. (434)

Tuberculum calidum in abscessum fere definens, quod e palpebræ margine atque e cilio prorumpit.

GRANDO. (435)

Tuberculum durum, palpebræ fere superiori innascens.

VARUS, Ionthos. (436)

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

GUTTA, Rosacea. (437)

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

EPHELIS. (438)

Asperitas quædam et durities mali coloris in facie.

ESOCHE. (439)

Tuberculum intus in ano latens.

EXOCHE. (440)

Idem foris eminens.

*** *Pustulæ et Papulæ.*

EPINYCTIS. (441)

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris aut fabæ magnitudine, circa quam vehemens inflammatio et dolor.

PHLYCTÆNA. (442)

Pustula subflavo humore distenta, lucida, illi similis, quæ ab ambustione erumpit, non manifesto dolens.

In capite Pfydracium vocatur.

HERPES, Serpigo. (443)

Papula ardens, cutem serpentibus minimis pustulis erodens.

Purpura scorbutica, quam vocant, verissima Serpigo est.

SCABIES. (444)

Durities cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam ficciores, faniem rodentem, exulcerantem, crustas formantem, et contagiosam complexæ.

AQUULA. (445)

Pustula palpebrarum, vel pinguis quædam materia, cuti eorundem substrata.

HYDROA, Boa, Sudamina. (446)

Pustulæ milii magnitudine, aquosæ fine rubore et fine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

VARIOLA. (447)

Pustula purulenta ex macula rubra in syncho emergens, contagiosa.

VARICELLA. (448)

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephamera erumpens, non contagiosa.

PURPURA. (449)

Pustula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

ENCAUMA, Phlyzacion. (450)

Pustula ab ustione contracta.

* * * * * *Maculæ.*

ECCHYMOMA. (451)

Macula a sanguine per cutem quasi effusa livida vel nigra.

Illa Pelioma, hæc Melasma speciatim dicitur.

PETECHIÆ. (452)

Maculæ pulicum morfui similes, magnitudine et colore, interdum tamen etiam lividæ in febre acuta.

MORBILLI. (453)

Maculæ acutæ, rubellæ, latefcentes, et plerumque confluentes, inque squamas desfluentes, in febre acuta.

SCARLATÆ. (454)

Maculæ latiores ac rubicundiores quam morbilli, subflavis nodulis ornatæ, in febre acuta.

LENTIGO. (455)

Macula lentis magnitudine fusca, multiplex, in facie potissimum et in manibus emergens.

URTICARIA. (456)

Maculæ subtumidæ, rubentes, prurientes, fugaces.

STIGMA. (457)

Macula coloris coccinei.

VIBEX.

VIBEX. (458)

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

VITILIGO. (459)

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (Alphos)
aut nigra (Melas.)

LEUCE. (460)

Alphos in qua albi et lanugini fimiles pili.

CYASMA. (461)

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

LICHEN, Impetigo. (462)

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

SELINE. (463)

Macula alba in ungue.

NEBULA. (464)

Macula alba in cornea.

***** *Dissolutiones.*

I. *Apospasmata.*

VULNUS. (465)

Solutio partis solidæ, mollis, a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

RUPTURA. (466)

Solutio partis solidæ, mollis, internæ, ab interna causa, cum hæmorrhagia.

RHAGAS. (467)

Solutio cutis linearis arida.

FRACTURA. (468)

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

FISSURA. (469)

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

PLICATIO. (470)

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

THLASIS. (471)

Calvaria depressa citra fracturam.

LUXATIO. (472)

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

SUBLUXATIO. (473)

Cum os ab osse paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

DIACHALASIS. (474)

Suturæ dimotio.

ATTRITIO, Eæthlimma. (475)

Dissolutio cuticulæ et cutis a compressione.

PORRIGO, Ptiryasis. (476)

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

APOSYRMA. (477)

Cutis abrasio, dilaceratio.

ANAPLEUSIS. (478)

Ossis corrupti squamula.

SPASMA. (479)

Species solutionis continui tendinum, ligamentorum, citra rupturam, membri mobilitatem dolorificam inducens.

CONTUSIO. (480)

Cutis musculorumque conquassatio dolorifica, plerumque cum ecchymomate, at citra vulnus aut substantiæ manifestam deperditionem.

DIABROSIS. (481)

Erosio cutis a re acri et mordaci interna vel externa.

AGOMPHIASIS. (482)

Dentium vacillatio.

ESCHARA. (483)

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in crustam emortuam mutata.

PIPTONYCHIA. (484)

Unguis destructio et casus.

2. Exulcerationes.

CACOETHES. (485)

Ulcus fere magnum oris tumentibus atque callois.

THERIOMA. (486)

Ulcus in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CARCINOMA. (487)

Canceri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

PHAGEDÆNA. (488)

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

NOMA. (489)

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

SYCOSIS. (490)

Ulcus, in quo multa caro excrescit,

FISTULA. (491)

Ulcus altum, angustum, callosum.

SINUS. (492)

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

CARIES. (493)

Ulcus in osse cum substantiæ et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

ACHORES. (494)

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CRUSTA, lactea. (495)

Achores in facie,

FAVUS, Cerion. (496)

Ulcus multis foraminibus, sed majoribus ac in achore, pervium, ex quibus melli similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis, et plantis pedum, oritur.

TINEA. (497)

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam, aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

ARGEMON. (498)

Exulceratio in cornea.

ÆGILOPS. (499)

Anchilops in ulcus converfum.

OZÆNA. (500)

Ulcus narium putridum, e quo graveolens mucus exstillat.

APHTHÆ. (501)

Ulcera oris aut pudendorum, superficialia, mucosa.

INTERTRIGO. (502)

Excoriatio cutis madens ac rubens, a fudoris vel urinæ acrimonia.

RHACOSIS. (503)

Excoriatio scroti laxati.

***** *Concretiones.*

ANCYLOBLEPHARON. (504)

Palpebrarum inter se conglutinatio.

ZYNIZESIS. (505)

Pupillæ concretio.

DACRYOMA. (506)

Punctorum lacrymalium coalitus.

ANCYLOGLOSSUM. (507)

Linguae concretio cum partibus subjectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

ANCYLOSIS. (508)

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

CICATRIX. (509)

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus.
Leucoma in cornea dicitur.

DACTYLION. (510)

Digitorum concretio.

CLASSIS XI. DEFORMITATES.

PHOXOS. (511)

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

GIBBER. (512)

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae, ossiumve thoracis.

Ejus species Cyphosis, Lordosis, Scoliosis, et Seifis.

CAPUT obstipum. (513)

Incurvatio colli.

STRABISMUS. (514)

Oculorum distortio et inæqualis motus.

MYOPIASIS. (515)

Qua propinqua cernimus, remota vel parum vel nihil omnino.

LAGOPHTHALMUS. (516)

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

TRICHIASIS. (517)

Obversio ciliorum ad oculum.

ECTROPIUM. (518)

Vitium palpebrae inferioris, quo parum sursum attollitur, sed hiat, aut extrorsum eversa est.

ENTROPIUM. (519)

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

RHOEAS. (520)

Defectus carunculae lacrymalis, epiphoram faciens.

RHYSEMATA. (521)

Rugae et fordes, quae in senili facie cernuntur.

LAGOCHEILOS, Labium leporinum. (522)
Divisum semel vel bis labium.

MALACOSTEON. (523)
Offium mollities.

HIRSUTIES. (524)
Præternaturalis pilorum in parte generatio.

CANITIES. (525)
Capillorum color albus ante legitimam ætatem.

DISTRIX. (526)
Exilitas pilorum, modum excedens.

XIRASIA. (527)
Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

PHALACROTIS. (528)
Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

ALOPECIA. (529)
Pilorum defluvium, aream relinquens.
Ophiasis ejus species, item Calvities et Pelada.

MADAROSIS. (530)
Ciliorum defluvium.

PTILOSIS. (531)
Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

RODATIO. (532)
Ciliorum decurtatio.

PHALANGOSIS. (533)
Ciliorum duplex vel triplex acies.

COLOBOMA. (534)
Defectus particulae in parte aliqua corporis.

CERCOSIS. (535)
Clitoris prælonga.

CHOLOSIS. (536)
Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

GRYPOSIS. (537)
Unguium aduncatio.

NÆVUS. (538)

Tuberculum, maculave congenita.

MONSTROSITAS. (539)

Deformitas multiplex congenita.

POLYSARCIA. (540)

Corpulentia excedens.

ISCHNOTIS. (541)

Excessiva corporis gracilitas.

RHICNOSIS. (542)

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

VARUS. (543)

Cui crura introrsum versa.

VALGUS. (544)

Cui crura extrorsum distorta.

LEIOPODES, Plancus, Plautus. (545)

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

APELLA. (546)

Cui præputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

HYPOSPADIÆOS. (547)

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

URORHOEAS. (548)

Cui urina ex urethra in perinæo exesa effluit.

ATRETA. (549)

Cujus anus aut naturalia occlusa.

SANIODES. (550)

Cui thorax tabulæ ritu est angustus.

CRIPSORCHIS. (551)

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

HERMAPHRODITUS. (552)

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita ut utriusque sexus adesse videantur.

DIONYSISCUS. (553)

Cui prope tempora duæ eminentiæ ossæ, quasi cornua, nascuntur.

ARTETISCUS. (554)

Qui membri alicujus defectum patitur.

NEFRENDIS. (555)

Qui dentibus caret.

SPANOPOGON. (556)

Qui raram habet barbam, et cui e mento pili excidunt.

HYPERARTETISCUS. (557)

Cui membrum aliquod superfluum.

GALIANCON. (558)

Cui brachium altero brevis.

GALBULUS. (559)

Cui flavedo corporis congenita.

MOLA. (560)

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio proisus transeunda sunt vitia quædam occulta, quæ non nisi in cadaverum sectione se offerunt; velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiæ cartilaginum, membranarum, muscutorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vasorum, positura viscerum perversa, bullæ aëreæ in venis et pulmonum superficie, aneurismata aortæ, angustiae præternaturales vasorum et ductuum, ipsorumque concretiones.

PARS QUARTA.

S Y S T E M A

MORBORUM

S Y M P T O M A T I C U M,

AUCTORE

CLAR. JO. BAPT. MICH. SAGAR,

MEDIC. DOCT. ETC. ETC.

VIENNÆ—M DCC LXXVI.

CLAVIS CLASSIUM ET ORDINUM.

CLASSIS I. VITIA.

- ORDO I. Maculæ.
- II. Efflorescentiæ.
- III. Phymata.
- IV. Excrefcentiæ.
- V. Cystides.
- VI. Ectopiæ.
- VII. Deformitates.

CLASSIS II. PLAGÆ.

- ORDO I. Solutiones recentes plerumque cruentæ.
- II. Solutiones artificiales recentes cruentæ.
- III. Solutiones incruentæ.
- IV. Solutiones anomalæ.

CLASSIS

CLASSIS III. CACHEXIÆ.

- ORDO I. Macies.
II. Intumescentiæ.
III. Hydropes partiales.
IV. Tubera.
V. Impetigines.
VI. Icteritiæ.
VII. Cachexiæ anomalæ.

CLASSIS IV. DOLORES.

- ORDO I. Dolores vagi.
II. Dolores capitis.
III. Dolores pectoris.
IV. Dolores abdominis.
V. Dolores externarum.

CLASSIS V. FLUXUS.

- ORDO I. Sanguifluxus.
II. Alvifluxus fanguinolenti.
III. Alvifluxus non fanguinolenti.
IV. Serifluxus.
V. Aërifluxus.

CLASSIS VI. SUPPRESSIONES.

- ORDO I. Suppressiones egerendorum.
 II. Suppressiones ingerendorum.
 III. Suppressiones imi ventris.

CLASSIS VII. SPASMI.

- ORDO I. Spasmi tonici partiales.
 II. Spasmi tonici generales.
 III. Spasmi clonici partiales.
 IV. Spasmi clonici generales.

CLASSIS VIII. ANHELATIONES.

- ORDO I. Anhelationes spasmodicæ.
 II. Anhelationes oppressivæ.

CLASSIS IX. DEBILITATES.

- ORDO I. Dysæsthesiæ.
 II. Anepithymiæ.
 III. Dyscinesiæ.
 IV. Leipopsychiæ.
 V. Comata.

CLASSIS X. EXANTHEMATA.

- ORDO I. Exanthemata contagiosa.
II. Exanthemata non contagiosa.

CLASSIS XI. PHLEGMASIÆ.

- ORDO I. Phlegmasiæ musculosæ.
II. Phlegmasiæ membranaceæ.
III. Phlegmasiæ parenchymatosa.

CLASSIS XII. FEBRES.

- ORDO I. Febres continuæ.
II. Febres remittentes.
III. Febres intermittentes.

CLASSIS XIII. VESANIÆ.

- ORDO I. Hallucinationes.
II. Morositates.
III. Deliria.
IV. Vesaniæ anomalæ.

CLASSIS I. VITIA.

Symptomata externa levidensia, palpabilia, absque notabili cachexia, pyrexia.

ORDO I. MACULÆ.

Mutationes coloris nativi.

LEUCOMA. (1)

Macula corneæ pelluciditatem vitians, opacans.

VITILIGO. (2)

Macula corymbosa cum cutis depreffione, locum fixum non fervans in quo nascatur.

EPHELIS. (3)

Maculæ umbrinæ glabræ, corymbosæ, raro partes tectas afficientes, acquisitæ.

NÆVUS. (4)

Macula congenita eminens, vel non, supra libellam cutis.

ECCHYMOMA. (5)

Est macula nigricans, vel atro-rubra, cærulea, livescens, in gilvum successive definens colorem, nata a sanguine in adiposam sub cute effuso.

ORDO II. EFFLORESCENTIÆ.

Aspredines, cum cuticulæ elevatione ultra libellam cutis, humorales, exiguæ, gregales, absque pyrexia.

PUSTULA. (6)

Phyma aut vesicula colorata suppurans, diametri linearis, fastigiata, pure dehiscens, quandoque in crustam abiens; est seu furunculus linearis diametri.

PAPULA. (7)

Phyma parvulum seu efflorescentia desquamanda, nec suppurans.

PHLYCTHÆNA. (8)

Vesicula parva fluido seroso plena, quæ deinde sponte rumpitur et fundit serum.

BACCHIA. (9)

Maculæ rubræ, vel efflorescentiæ nasi et partium adjacentium eidem, guttatæ, plus minus prominentes, asperæ, furfurascens, diuturnæ; hoc genus ambigit inter maculas et efflorescentias.

VARUS. (10)

Tumor pisi magnitudine, plerumque sat durus, non suppurans, aut desquamandus, pertinax in glandulis sebaceis. L.

HERPES. (11)

Papularum prurientium corymbus in squamas furfuraceas fatiscentium.

EPINYCTIS. (12)

Phlycthænarum atro-rubrarum congeries, maxime in tibiis, noctu potissimum acriter prurientium.

HEMEROPATHOS. (13)

Papulæ rutilæ crura obsidentes, extra lectum illico apparentes, importune prurientes, in lecto evanescentes, diuturnæ.

PSYDRACIA. (14)

Efflorescentia erysipelatosa absque febre notabili.

HYDROA. (15)

Exanthemata granis milii magnitudine et forma similia subito exorta, phlycthænoidea, fugacia, absque asthenia, pyrexia, et prægressa oppensione præcordiorum, miliaria multis habita.

ORDO III. PHYMATA.

Tumores humores folitarii.

ERYTHEMA. (16)

Phyma rubrum calens, diffufum, fine febre.

OEDEMA. (17)

Phyma album, frigidum, indolens, molle, foveam ex pref-
fione fervans plerumque.

EMPHYSEMA. (18)

Phyma cuti concolor elasticum, ex pref-
fione aut percuffione crepitans.

SCHIRRHUS. (19)

Phyma durum, indolens, gravans, frigidum, in partibus
glandulofis enatum, dum externum cuti quoque concolor
obfervatur.

INFLAMMATIO. (20)

Eft tumor fphæroideus rubore, calore, tenfione, dolore pul-
fatili inflignis, folitarius, plerumque fat extenfus, in fup-
purationem fponte vergens.

Eryfipelas non fuppurat, et Phlegmone habet femper py-
rexiam conjunctam manifef-
tam; inflammatio fæpius in
phlegmone tranfit, vel phlegmone eft gradus major in-
flammationis.

BUBO. (21)

Phyma fcirrhofo-phlegmonoideum in glandulis inguinali-
bus.

PAROTIS. (22)

Tumor fcirrhofo-phlegmonoideus parotidis glandulæ, in
fuppurationem lentiffime vergens.

FURUNCULUS. (23)

Tumor inflammatorius cutaneus, feu fubcutaneus, promi-
nens, profunde ruber, fphæroideus, cujus centrum occu-
pat vortex fibrofus digere nefcius; ordinario juglandis
habet magnitudinem.

ANTHRAX. (24)

Phyma apice gangrænofum, et in radio inflammatum.

CANCER. (25)

Phyma scirrhum lancinans, vel phyma lancinans venis varicosis profunde rubris, nigris, lividis oblitum, cinctum, facile fanguinantibus.

PARONYCHIA. (26)

Inflammatorius tumor extremi digiti, cum dolore sæpius perterebrante, calore, tensione, et subinde cum rubore.

PHIMOSIS. (27)

Tumor fere semper inflammatorius præputii glandem incarcerans, aut excludens ad coronam hancce vinciendo.

ORDO IV. EXCRESCENTIÆ.

Tumores a solidis adauctis per succum nutritium copiosorem advectum, &c. in hos conversum.

SARCOMA. (28)

Excrecentia carnis consistentiam fere habens, plerumque rubra.

CONDYLOMA. (29)

Est excrecentia eminens, vel non eminens, firmior carnibus et cute, mollior contra ossibus, non elastica.

VERRUCA. (30)

Excrecentia cutanea prominens, vix sensibilis, indolens, prærupta seu aspera superficie.

PTERYGIUM. (31)

Est excrecentia carnea, vel membranceo-vasculosa ad oculi canthum in globo oculi exorta, alam expansam utcunque referens, versusve corneam sese extendens, crescens.

HORDEOLUM. (32)

Tumor durus, aut excrecentia, plus minus mollis, plerumque cuti concolor, ferme sensu carens, in limbo palpebrarum enata, magnitudine sæpius granum hordei vel pisi æquans.

TRACHELOPHYMA. (33)

Est tumor varius, non purulentus, neve inflammatorius, anticae partis colli.

EXOSTOSIS. (34)

Tumor ossis partialis, vel aliquando totius ossis, ut subinde in minoribus fit, ad ossa accedens.

ORDO V. CYSTIDES.

Tumores capsulati fluido referti.

ANEURYSMA. (35)

Cystis arteriosa cruore referta, ex pulsu et situ nascenda.

VARIX. (36)

Dilatatio venæ rubra, nigrescens, ad pressionem recedens, iterumque subito rediens hac cessante, plerumque pruriens, mordicans.

MARISCA. (37)

Tumor in margine ani, ex sanguine in textum vasorum minimorum varicosorum effuso efformatus, ruber, dolens, variæ formæ et magnitudinis. Vide Hæmorrhoidem. L.

HYDATIS. (38)

Cystis lymphæductuum dilatatorum, lympham vel serum continens.

STAPHYLOMA. (39)

Cystis cornæ, ex dilatatione ejusdem ectopia uveæ in cameram oculi anteriorem prolapsæ.

Hoc genus magis ad Ectopias spectat. Vide Caliginem. L.

LUPIA. (40)

Est cystis materiem pultis, vel mellis consistentiam referentem continens, haud purulentam, indolens, cui concolor, loco mobilis.

HYDARTHROS. (41)

Hydrops vel in capsula articulari, vel in cellulis vicinis, haud in tunica propria; tumor est fluctuans sine coloris mutatione, pulsatione.

APOSTEMA. (42)

Cystis purulenta, vel ichoroso-purulenta; nascitur ex fluctuatione, prægressa inflammatione, albedine, remissione doloris et pulsationis.

EXOMPHALUS. (43)

Cystis umbilicalis, fluido quopiam repleta, absque ectopia.

OSCHEOPHYMA. (44)

Cystis feroti variis fluidis turgens.

ORDO VI. ECTOPIÆ.

Partium solidarum e sua sede dimotio, sensibus obvia,
continentibus has relaxatis.

EXOPHTHALMIA. (45)

Ectopia oculi.

BLEPHAROPTOSIS. (46)

Est palpebræ utriusque, vel alterutrius, morbosa elongatio,
retractio, intro vel extra versio, cum symptomatis cuius
ectopiæ propriis.

HYPOSTAPHYLE. (47)

Est procidentia seu elongatio uvulæ relaxatæ, inflammatæ,
ulceratæ, incrassatæ, attenuatæ, vel bicornis.

PARAGLOSSA. (48)

Est linguæ magnitudo minuta, vel aucta; vel plane soluta,
aut elongato frenulo, in fauces ejusdem revolutio.

PROPTOMA. (49)

Est procidentia appendicum externarum insolita et morbosa,
diversa a prædictis.

EXANIA. (50).

Sphincteris ani, vel et intestini recti inversi procidentia ex-
tuberans, rubra, reducibilis semper extra strangulatio-
nem.

EXOCYSTIS. (51)

Vesicæ inversa membrana interior, soluta a reliquis per
urethram foras pendet, et en exocystis!

HYSTEROPTOSIS. (52)

Est uteri procidentia tumorem sistens in vagina, vel quan-
doque extra genitalia pendentem, undique liberum, men-
ses stillantem, saltem initio reponibilem, cum doloribus
hypogastrii,

HYSTEROPTOSIS. (52)

hypogastrii, inguinum, urinæ difficultate, animi deliquiis;
hæc omnia tactus obstetricius definit.

COLPOPTOSIS. (53)

Tumor in sinu muliebri, vel extra pendens, annularis, mollis, perforatus (prolabitur subinde una tantum ruga vaginæ) per quod foramen digitus immissus altius orificium uteri, utrumque in sua quasi sede absque colpocele deprehendit, reponibilis; torquet insuper ægram dysuria, tenefmus.

GASTROCELE. (54)

Est tumor in scorbiculo cordis vulgo dicto, vel ad minus supra umbilicum insolitus, herniosus, ventriculum, aut alia viscera illapsa, continens, cuti concolor, reponibilis, in decubitu dorsali sponte recedens, indolens, ex relaxatione integumentorum undecunque orta natus, vomitum caussans.

OMPHALOCELE. (55)

Tumor herniosus ad umbilicum, reponibilis, cuti concolor, indolens plerumque, ex relaxatione integumentorum et peritonæi natus, varia viscera continens.

LAPAROCELE. (56)

Tumor herniosus, ventralis seu abdominalis, in quocunque loco abdominis aliis herniis non dicato.

MEROCELE. (57)

Tumor herniosus, in suprema et anteriore parte femoris, ad exitum vasorum cruralium in fœminis præcipue observabilis, proprietates herniarum habens.

Vidi Merocelen etiam in viro.

BUBONOCELE. (58)

Tumor herniosus emergens per anulum vasorum spermaticorum, sensim enatus, cuti concolor et indolens, absente strangulatione.

OPODEOCELE. (59)

Est tumor herniosus in summo femine adlatus, genitalium egrediens per sinuositatem ossis ischii superiorem, vasis transmittendis dicatam; in fœminis prope alterum vulvæ labium visitur hæc ectopia; reponibilis, cuti concolor, mollis;

OPODEOCELE. (59)

mollis; dum parvus est tumor, vix observatur, subin est elasticus.

T. I. Auctorum Chirurgicorum Paris. p. 709. consule L.

ISCHIOCELE. (60)

Est hernia emergens per incisuram ossis sacri, seu hiatus inter os sacrum et tuber ossis ischii, decubitu prono reponibilis.

Rarum genus, et sat adhuc obscurum.

COLPOCELE (61)

Est tumor herniosus in vagina emergens, reponibilis, in decubitu supino natibus elevatis sponte recedens plerumque, indolens, absque signis aliorum tumorum qui hic enasci solent.

PERINÆOCELE. (62)

Tumor herniosus in perinæo ad unam vel alteram, aut plane utramque, ut vidi in parvula puella, partem, raphes, mollis, reponibilis, cuti concolor; subin est effectus dystociæ.

Species hujus generis vesicalis, intestinalis, omentalis, patent una cum therapeia ex prioribus.

PERITONÆOREXIS. (63)

Sunt herniæ omnes jam descriptæ ob rupturam peritonæi natæ; rixis vero peritonæi signa sunt, crepitis in violentia aliqua majore peritonæum lacerante, herniæ alicujus subita et magna protuberantia, eruptio; dolor in loco rixis major aut minor.

Species sunt hujus generis tot, quot genera jam numeravi herniarum. Hernia est extensio præternaturalis peritonæi et integumentorum cavum formans, recipiens viscera adjacentia; præter prædictas hernias dantur herniarum varietates: Sic dantur herniæ partiales intestinales, ubi media pars fistulæ intestinalis cavum herniosum ingreditur, altera parte libera in abdomine manente; dantur herniæ accretæ, in quo casu pars illapsa cavi herniosi peritonæo accrescit; cavum herniosum quandoque præter viscera illapsa liquorem in abdomine collectum continet; sæpius quoque partes cavum herniosum ingressæ incarcerantur a spastice contracto annulo, unde ileus nascitur, quem vidi suo loco.

Peritonæorexix pertinet quidem ad rupturam; sed, propter affinitatem ejusdem cum herniis, hic eandem subjunxi.

ENCEPHALOCELE. (64)

Est cerebri, aut cerebelli, vel utriusque simul, per hiatus ossium cranii necdum sat cohærentium, ectopia herniosa, relaxata pariter lamina utraque duræ matris et piæ externa tenuissima pellucida; symptomata subin non magna, subin contra gravissima causans.

HYSTEROLOXIA. (65)

Est uteri gravid, vel non gravid, in abdomine situs seu directio aberrans a directione naturali axeos suæ, noscenda ex orificii uterini directione mutata, palpo externo abdominis, cum aliis symptomatis inconsumetis; ut ischuria, dysuria, enuresi, obstipatione, &c.

PARORCHIDIUM. (66)

Est testiculi unius, vel utriusque, a situ naturali aberratio.

EXARTHREMA. (67)

Est separatio contigui in ossium articulis per diarthrosin combinatorum, noscenda ex impotentia ad motum, mutatione nativæ conformationis, dolore, protuberantia insolita, cavitate, musculorum tensione, conversione artus, acuratione membri, vel prolongatione.

DIASTASIS. (68)

Ossium recessus junctorum per raphen, harmoniam, synchondrosin, aut syndesmosin, cognoscibilis cavitate insolita uno in loco, in altero vero tumore, mutatione posituræ, et reliquis symptomatis oculo et tactui patentibus.

LOXARTHROS. (69)

Est ossium articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, seu obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

Vide Subluxationem et Distorsionem.

GIBBOSITAS. (70)

Est ossium pectus, vel pelvim componentium, indecora prominentia a tumore, luxatione, diastasi, torsione, pressione, aut alio principio nata.

LORDOSIS. (71)

Ossium longiorum fistulosorum circa medium inflexio, incurvatio, ectopia a linea recta.

ORDO VII. DEFORMITATES.

Sunt vitia quæ vix sanitatem lædunt.

LAGOSTOMA. (72)

Labium oris fissum.

APELLA. (73)

Est præputii, vel alterius appendicis mollis, brevitās, parvitas.

POLYMERISMA. (74)

Partium numerum ordinarium excessus.

EPIDOSIS. (75)

Appendicum mollium incrementum inconfuetum sanum.

Species sunt penes prælongi, auriculæ pendentes, præputia longissima, clitorismus, caro pubis fœminarum Africanarum, nares, labia tumida oris, &c.

ANCHYLOMERISMA. (76)

Est partium concretio.

HIRSUTIES. (77)

Pili copiosiores, longiores, vel in locis ubi non solent crescere obviæ, dant ideam hujus generis.

CLASSIS II. PLAGÆ.

Continui solutiones, morbi proprie chirurgici
per sæpe fat graves.

ORDO I. SOLUTIONES.

Recentes, quasi semper cruentæ.

VULNUS. (78)

Est continui solutio molli in parte hians, labiata, cruenta,
ab instrumento mechanico scindente facta.

Corneæ vulnus cruorem non fundit.

PUNCTURA. (79)

Continui solutio intus extensa tantum, eaque instrumento
pungente facta casualiter.

SCLOPETOPLAGA. (80)

Est vulnus a glandibus e bombardis, aut sclopetis explosis
illatum, vaginatum, decursum glandis designans, oblon-
gum, vexatum.

MORSUS. (81)

Est plaga recens, quam animalia dentibus inferunt mor-
dendo.

EXCORIATIO. (82)

Est epidermidis a cute, vel cutis a carnibus separatio, de-
tractio.

CONTUSIO. (83)

Est partis cujuscunque mollis, vel solidæ, in minimis vascu-
lis, fibris attritio, fractio, solutio.

RUPTURA. (84)

Membranarum, tendinum, aut ligamentorum dialysis per tensionem facta, vires horum excedentem.

Consule chirurgos, et de utero rupto Cl. Henric. Crantz, ingenii excitatissimi virum; huc pertinet peritonæorexis.

ORDO II. SOLUTIONES,

Recentes, cruentæ, et artificiales.

OPERATIO. (85)

Est studiosa solutio continui ad aliquid eximendum, ut lithotomia.

Operatio reipsa est vulnus studiosa et dextra manu factum chirurgi, morbum relinquens hujus classis.

AMPUTATIO. (86)

Vulnus detruncatione partis totalis factum.

SUTURA. (87)

Est studiosis puncturis mediante acu factis, filisque per puncturas trajectis, solutorum mollium contractio, adductio.

Sutura ficca fit emplastris, quæ huc non spectat, quum non sit plaga.

PARACENTESIS. (88)

Est artificialis punctura in aliquod cavum corporis, plerumque acu triquetra cannulata facta.

ORDO III. SOLUTIONES,

Incruentæ, nec ad priores referendæ, pus, faniem, cariam, &c. sistentes.

ULCUS. (89)

Est vulnus suppuratum partis mollis, vel solutio continui mollis antiqua, pus, ichorem, aut faniem quamcumque alens, fundens.

EXULCERATIO. (90)

Est excoriatio suppurans, seu ulcus superficiale.

Reliqua, quæ ad hoc genus spectare videntur, ex ulcere patent.

FISTULA. (91)

Est ulcus cortice calloso vaginatum, ore angustatum, oblongum.

SINUS. (92)

Est cavitas ulcerosa ampla, sæpe multiplex, ore angusto non calloso, vel plane nullo donata.

ESCHARA. (93)

Crusta mortua ficca partis mollis sæpius causticis facta est eschara, sensus et vitæ expers.

CARIES. (94)

Ossis erosio cava, aspera, perioestio denudata, plerumque nigra; unde os evadit fragile, friabile, vel exfoliabile.

Species numerat hoc genus sequentes; est nimirum caries ficca, humida, exfoliabilis, syphilitica, scorbutica, scrophulosa, variolosa.

ARTHROCACE. (95)

Ulcus medullæ ab interioribus sponte natum, cum ossis carie, exostosi, et persæpe dolore.

Species numerat hoc genus fere totidem quot Caries; vulgo vocatur spina ventosa: Consule super hac Petit de morbis ossium.

ORDO IV. SOLUTIONES,

Anomalæ, quæ prioribus includi renuunt.

RHAGAS. (96)

Est solutio continui ficca in partium mollium marginibus, ut labiis oris.

Species includit Rhagas veneream, malignam, pestiferam, frambæsiacam, ulcerosam, benignam, lixiviale, glaciale, &c.

AMBUSTIO. (97)

Est plaga a flamma ignis, corporibusque ex igne candentibus, liquidis ferventibus, aut radiis solis in focus coactis,

AMBUSTIO. (97)

actis, nostro corpori illata, succedentibus phænigmo, phlycthænis, vel eschara.

FRACTURA. (98)

Est divisio ossium in fragmenta separabilia.

FISSURA. (99)

Divisio ossium rimam referens, hæcceve non penitus separans.

CLASSIS III. CACHEXIÆ.

Coloris, figuræ, molis, in corporis habitu, sine notabili febre, depravatio.

ORDO I. MACIES.

Diminutio voluminis corporis ex consumptione pinguedinis, vel sanguinis defectu.

TABES. (100)

Est macilentia universalis, cum pyrexia lenta et habituali, citra tussim purisve anacatharsin.

PHTHISIS. (101)

Corporis emaciatio, cum amphimerina lenta, tussi, dyspnœa, et ut plurimum puris sputo.

Ab initio rarius in phthisi adest puris sputum, in Statu contra et sine semper. Quid est proprie pus?

ATROPHIA. (102)

Est macies sine tussi, anacatharsi, et febre notabili.

Raro equidem est atrophia sine omni febricula. Consule definitionem febris.

HÆMATAPORIA. (103)

Macies seu cachexia ex inopia sanguinis.

Descriptio: Virium debilitas, pertinax aurium sibilus, anorexia, facies lurida epidelio tecta, pallidissima, alvi fluxus, diabetes, sudores profusi, lipothymia, tibiae tumida, subinhydrothorax his succedens, vigilia, suspiria, animi abjectio, mœror, mortis timor, urina pallida, venæ abditæ, pulsus vacuus, sanguinis profluvia prægressa, sunt signa hæmataporie; aliquando aër evolutus locum sanguinis in vasis occupat.

ARIDURA. (104)

Macies, exsiccatio unius tantum artus, vel partis corporis, sine febre.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas ex volumine, mole, auctis.

PLETHORA. (105)

Intumescencia universalis, proportionata, et æquabilis, ex abundantia sanguinis.

Descriptio: Amyctidis et ventris cultus, pulsus plenus aut suppressus, venarum amplitudo conspicua: Æstus et gravitas totius corporis, respirandi difficultas, lassitudo spontanea, stupor artuum, somni turbati, partes epidelio tectæ ruberrimæ, temperamentum sublaxum, sanguineum.

POLYSARCIA. (106)

Intumescencia universalis, mollis, pallidula, ab adipe nimium aucto.

PNEUMATOSIS. (107)

Intumescencia universalis ab aëre, ad contactum crepitans, elastica, levis.

ANASARCA. (108)

In tumescencia universalis œdematosa, non elastica, vestigium digiti impressi servans, pallida, frigida, haud crepitans.

PHLEGMATIA. (109)

Intumescencia œdematosa artuum inferiorum mollis, cuti concolor, indolens, foveam digiti impressi fervans, non elastica.

PHYSCONIA. (110)

Est intumescencia abdominis a partibus solidis præternaturalis, sine graviditate, fluctuatione, et elasi, ad tactum dura, resistens, parenchymatica.

GRAVIDITAS. (111)

Intumescencia abdominis ex imo hypogastrio incipiens, in axique ejusdem ascendens, opus generationis subsequens, partu terminanda.

Pathemata gravidarum, menostasia, mutationes oris tincae, motus infantis sensibilis, sunt totidem characteres hujus generis.

ORDO III. HYDROPEs PARTIALES.

Tumores a fluidis in cavitatibus congestis, ut abdomine, &c.

HYDROCEPHALUS. (112)

Hydrops capitis a fero.

PHYSOCEPHALUS. (113)

Est tumor totius capitis emphysematosus elasticus, sub digito premente crepitans.

HYDRORACHITIS. (114)

Tumor cysticus ex hiatu vertebrarum lumbarium, vulgo spina bifida, in recens natis protuberans cum anæsthesia.

Est verus hydrops thecæ spinalis. A.

ASCITES. (115)

Gravis, sphæroidea, et fluctuosa abdominis intumescencia, non elastica, cum polydipsia, urina pauca, lixiviali, lateritia.

HYDROMETRA. (116)

Tumor hypogastrii sine graviditate, ab utero fluidis distento, rotundus, fluctuans, leges gravitatis sequens; dolor inguinum,

HYDROMETRA. (116)

inguinum, spirandi difficultas, menostasia, rigores, mammarum mollities, phlegmatia, et tactus orificii uterini, diagnofin firmant.

PHYSOMETRA. (117)

Est constans tumor hypogastrii a flatu uterum distendente, rotundus, elasticus, lævis, in fede uteri.

TYMPANITES. (118)

Est intumescencia totius abdominis, lævis et elastica, a pulsatione sonum edens, cum ructibus, borborygmis, constitutione, et doloribus abdominis.

Chronicus est hic morbus.

METEORISMUS. (119)

Est intumescencia flatulenta epigastrii, hypochondriorum, vel totius abdominis, fugax et plerumque indolens.

ORDO IV. TUBERA.

Tumores partium solidarum externi, non hydropici, cachexia.

RACHITIS. (120)

Est deformitas nata ex articulorum tumore duro, carniū marcore et flacciditate, capitis mole, sterni protuberantia; ingenium præcox in infantibus, ossiumve flexilitas et lordosis.

SCROPHULA. (121)

Tumores subscirrholi glandularum colli, mesenterii, cum labiis nasoque crassioribus.

Scrophula ordinario mollior est scirro.

CARCINOMA. (122)

Ulcera cancrofa, fordida, labiis duris everfis, scirrholis, ex quibus ichor manat acris et rodens; adfunt insuper dolores lancinantes, excrefcentiæ fungosæ, venæ adjacentes varicosæ, non inepte pedes canceri referentes, et febris hectica.

LEONTIASIS. (123)

Cognoscitur ex mutatione formæ humanæ in ferinam aliquatenus; unde aspectus hominis ferinus.

MALIS. (124)

Morbus est, qui cognoscitur tumoribus, ulceribus, quæ infecta vermiformia vel horum larvæ excitarunt, in quibus nidulantur, et ex apertis prodeunt.

FRAMBÆSIA. (125)

Morbus contagiosus, aliquando et congenitus apud Americanos, cujus præcipua symptomata sunt excrementiæ fungosæ mori fructus referentes, quibus sese adjungunt ulcera dysepulota, exostoses, caries, anchyloses, et macies.

ORDO V. IMPETIGINES.

Morbi contagiosi, chronici, qui cutis excrementias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, inducunt, plures foveantur a viru inoculabili.

SYPHILIS. (126)

Ulcuscula, porri, ficus, bubones, tophi, nodi, post vel cum gonorrhœa plerumque; dein pustulæ crustosæ, dolores nocturni, ostocopi, exostoses, caries, macies, et color luridus, morbum adesse loquuntur.

SCORBUTUS. (127)

Cognoscitur ex maculis lividis, flavis, cœruleis tibiarum, stomacace, facie lurida, urina pellicula tecta.

ELEPHANTIASIS. (128)

Facies deformis, tubera callosa, ozæna, raucedo, cutis elephantina crassa et unctuosæ, rictus satyrorum, anæsthesia in artubus, constituunt characterem hujus generis.

LEPRA. (129)

Cognoscitur ex pustulis verrucosis, duris, crassis, herpetosis, vel squamis ficcis in corymbos dispositis, prurientibus, escharoticis, rhagadibus.

Dum plures sunt siccæ pustulæ, Sicca: ubi vero, e contra, plures humidæ et exulceratæ, Humida dicitur lepra.

SCABIES.

SCABIES. (130)

Cognoscitur ex pustulis, vel phlycthænis, lentis vel fecalis grani magnitudine, lympham aut faniem continentibus, quæ scalpendo ruptæ crustas prurientes formant.

Contagiosus hic morbus et inoculabilis flexuras artuum maxime occupat.

TINEA. (131)

Incipit a pustulis vel phlycthænis capitis aut faciei diversicoloribus, quæ ruptæ in crustas humidas vel ficas abeunt corymbosæ.

Videtur nimirum esse scabies capitis, et nihil aliud.

ORDO VI. ICTERITIÆ.

Cognoscuntur ex totius cutis colore inassueto, pallido, flavo, nigro, rubro, lurido, sine pyrexia notabili.

AURIGO. (132)

Flavedo cutis ad aureum, vel aurantium tendens colorem, præcipue vero scleroticæ membranæ.

MELASICTERUS. (133)

Color cutis et scleroticæ niger, atro-lividus, fuliginosus, constituunt characterem hujus generis, cum mœstitia et perturbatione mentis.

PHOENIGMUS. (134)

Morbis hicce apyretus rubedine cutis diffusa maculata, vel punctata, notatur.

CHLOROSIS. (135)

Pallor faciei totiusve corporis, cum asthenia, et sæpius pica, sine aurigine scleroticæ; color est albus, cinereus, fuscus, cereus, luridus, aut virescens, cum sclerotica semper albissima perseverante.

ORDO VII. CACHEXIÆ ANOMALÆ.

Noscuntur ex signis classeos et affinitate cum prioribus generibus.

PHTHIRIASIS. (136)

Exortus insectorum, pediculorum, aut his affinium, cum porrigine, exulceratione, pruritu, cachexia.

TRICHOMA. (137)

Morbus contagiosus Hebræorum, cujus præcipuum symptoma est capillorum conspurcatio, complicatio, conglutinatio, et in cirros ac funiculos concretio inextricabilis, sæpius cum phthiriasi.

Hæreditarius est morbus hicce.

ALOPECIA. (138)

Defluvium pilorum et desquamatio cuticulæ constituunt characterem hujus morbi, cunctis animantibus communis.

ELCOSIS. (139)

Copiosa ampla ulcera, fœtida, cariosa, chronica, cum pyrexia lenta, produnt hoc genus.

GANGRÆNA. (140)

Anæsthesia, immobilitas, frigus, phlycthænæ lympham continententes, flacciditas, lividitas, et partis mors in cute et membrana cellulosa, vel in omnibus ad ossa usque, textus facilis, laceratio et dissolutio putrida, cum fœtore cadaveroso, definiunt hoc genus.

NECROSIS. (141)

Est partis mors lenta sine prævio tumore, mollitie, et dissolutione fœtida, cum dolore ardente ordinario et stupore, quæ sequitur exsiccatio partis, induratio, nigredo, et mumia.

Differt a gangræna in eo, quod lentius procedat, cum dolore rodente et stupore, et in mumiam abeat; gangræna contra mollescat, phlycthænas elevet, putrescat, fœteat, atque cito decurrat.

CLASSIS IV. DOLORES.

Ingrata et molesta sensatio, aut imaginatio, qualis ex nervearum partium laceratione, rosione, uisione, pressione, distractione, oritur, reliqua symptomata superans hanc definit classem. Sensationes molestæ ad febres non referendæ.

ORDO I. DOLORES Vagi.

Sæpius universales, aut cutanei ad phlegmasias non referendi.

ARTHRITIS. (142)

Articulorum dolor spontaneus, periodicus a synovia corrupta.

OSTOCOPUS. (143)

Est dolor constans et notabilis ossium, a periostio interno potissimum affecto, ex pressione non exacerbans, fixus.

RHEUMATISMUS. (144)

Dolor diuturnus in parte carnosa, tendinosa artuum, vagabundus, sæpius sine coryza, rheumate, catarrho, erysipellate, et sine febre notabili; (acutus rheumatismus facit genus inter phlegmasias Myositin a me dictum;) sanguis missus rheumatismo laborantium est gelatinosa crusta textus, et urina sæpe ad sulphureum colorem accedit.

CATAR-

CATARRHUS. (145)

Colli collove vicinarum partium dolor a frigore suscepto, cum tussi, coryza, levi partium intumescētia, et pyrexia vespertina exigua, seu amphimerina catarrhali.

ANXIETAS. (146)

Molestia ad loci mutationem assiduam cogens ægrum, quem habet.

LASSITUDO. (147)

Est ingrata sensatio, juncta cum debilitate, quæ ad quietem cogit virium reparandarum gratia.

STUPOR. (148)

Est molesta sensatio cum obscuritate tactus.

PRURITUS. (149)

Molesta sensatio ad scalpendum cogens.

ALGOR. (150)

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur, jam cum phricasmo, rigore, vel concussione corporis, jam sine his symptomatibus.

ARDOR. (151)

Molestia qualis a summo aëris calore producitur.

ORDO II. DOLORES CAPITIS,

Faciei, vel Capillitii.

CEPHALALGIA. (152)

Est capitis gravitas vel sensatio molesta, quæ refert caput interius distensum, turgidum, et quasi gravatum, malum haud chronicum.

CEPHALÆA. (153)

Est dolor capitis chronicus, et, juxta Stahlianos, tensivus. Videtur sola diurnitate a cephalalgia differre receptissimum hoc genus.

HEMICRANIA. (154)

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est dolor in alterutro capitis latere, potissimum ad tempora, frontem, ac oculos, isque vehemens sæpe et periodicus quandoque.

OPHTHALMIA. (155)

Cognoscitur ex oculi dolore, rubore, intolerantia lucis, et lacrymatione, vel ficcitate.

OTALGIA. (156)

Dolor in aure.

ODONTALGIA. (157)

Dolor dentium maxillarumque, cum vigiliis et sæpius ptyalismo, maxillæ aut genarum tumore.

ORDO III. DOLORES PECTORIS

Anhelationis expertes.

PYROSIS. (158)

Ardor œsophagi ad ventriculum usque extensus, sine febre.
Vulgo Soda dicitur.

CARDIOGMUS. (159)

Est gravis pertinaxque molestia in præcordiis, cum sensu ponderis auctæve molis et pulsatione, quæ ad minimum motum augentur.

Aneurysmati cordis, auricularum, finuum, et arteriarum tribuitur Cardiogmus, seu dolor cordis.

ORDO IV. DOLORES ABDOMINIS

Interni.

CARDIALGIA. (160)

Molestia ad epigastrium et ventriculum relata, syncopen minitans.

GASTRODYNIA. (161)

Notabilis et durans in regione ventriculi dolor, sine syncope et pyrexia.

COLICA. (162)

Est dolor potissimum intestini crassi regiones occupans in abdomine, hujusque officia turbans, sine febre notabili, cum pulsu plerumque suppresso, rariore, et obstipatione.

HEPA-

HEPATALGIA. (163)

Molestia sensatio gravativa, tensiva, aut quævis alia in regione hepatis, sine pyrexia acuta.

SPLENALGIA. (164)

Est dolor pertinax gravativus, tensivus, in regione lienis, cum aliquali dyspnœa, pulsu in inspiratione intermittente, tumore et duritie, sine pyrexia.

NEPHRALGIA. (165)

Dolor fixus in regione renum et ureterum, sine pyrexia acuta.

HYSTERALGIA. (166)

Dolor in regione uteri, sine parturitionis nisu et phlegmasia notabili.

ORDO V. DOLORES EXTERNARUM

Partium locales.

MASTODYNIA. (167)

Dolor mammarum.

RACHIALGIA. (168)

Atroces dolores abdominis, ad lumbos et dorsum serpentes, pressione non crescentes, cum umbilici subin retractione, alvi constipatione, convulsione, manuum torpore, paresi, paralyfi, ac contracturis artuum, definiunt hunc morbum.

LUMBAGO. (169)

Est dolor lumborum corporis erectionem impediens, sine nausea, ureterum dolore, femoris stupore, urinæ vitiiis; dolor est in musculis spinæ dorsi aut ligamentis.

ISCHIAS. (170)

Dolor constans coxendicis, pelvis, et capitis femoris, nec non musculorum ejusdem; hinc difficultas gradiendi, standi, claudicatio, frigus partis; conatus ad deponendam alvum dolorem augent ischiadicum.

PROCTALGIA. (171)

Est dolor podicis.

PUDENDAGRA. (172)

Dolor partium genitalium tum in viris tum in fœminis.

DIGITUM. (173)

Est dolor periodicus articuli cujusdem digiti, cum emaciatione et ossis friabilitate, sine omni phlegmasia.

Vide III. De Sauvages. tom. i. p. 150.

CLASSIS V. FLUXUS.

Exitus infolitus cujusvis fluidi vel solidi e corpore.

ORDO I. SANGUIFLUXUS.

Sanguinis, vel saltem sanguinolentæ materiæ ejectio seu effluxus, quacunque via, præter alvinam.

HÆMORRHAGIA. (174)

Est fluxus sanguinis e naribus.

HÆMOPTYSIS. (175)

Est sanguinis expectoratio seu anacatharsis, cum tussi sine notabili pyrexia.

STOMACACE. (176)

Stomacace laborantibus sanguis dissolutus promanat e gingivis laxis, fordidis, et fœtidis, sponte, vel ad levem harum attactum.

HÆMATEMESIS. (177)

Est sanguinis rejectio ex œsophago, cum vomitorio conatu, anxietate magna, et animi deliquiis; observantur et fæces alvi sanguine tinctæ, nigricantes.

HÆMATURIA. (178)

Est effluxus seu minctio cruoris, urinæ cruentæ ex vesica, vel feminis sanguinolenti ex urethra, in viris et mulieribus.

METRORRHAGIA. (179)

Sanguinis ex utero aut vagina fluxus morbosus, nimius.

ABORTUS. (180)

Est fœtus immaturi, id est, ante nonum mensem graviditatis saltem aliquot septimanis exclusio, subin cum metrorrhagia.

Symptomata sunt, lassitudo, anorexia, frigus, mammarum flacciditas, lumbago, hysteralgia, lipothymia, &c.

ORDO II. ALVIFLUXUS**Sanguinolenti.****HEPATIRRHOEA. (181)**

Est alvi fluxus per inferiora sanguinolentus, nec ater, nec torminosus.

HÆMORRHOIS. (182)

Est sanguifluxus ex tuberculis, mariscis rubris, duris, dolorificis, finem intestini recti obsidentibus, vel in recto latentibus.

Sentiunt posteriora tubercula ægri in recto sæpius obstipati, et digitus immissus intestino hæc offendit; sanguis in depositione alvi præcedit, vel ad minus comitatur, excrementa.

DYSENTERIA. (183)

Est frequens torminosa mucofo-cruenta alvi dejectio.

MELÆNA. (184)

Est fluxus materie nigricantis, atro-rubræ, ano vel cato frequens.

ORDO III. ALVIFLUXUS

Non sanguinolenti.

NAUSEA. (185)

Est inanis vomendi conatus, et tamen maximis licet nifibus nihil nisi flatus aut mucus exiguus exantlatur; adest anorexia, gastrodynia, motus ossis hyoidis ad superiora, ptyalismus; capitis ad anteriora inclinatio, tremor labii inferioris, &c.

VOMITUS. (186)

Est palpabilium materierum non cruentarum per os œsophagumque rejectio frequens ex ventriculo.

Causa est antiperistaltica ventriculi contractio, concurrente diaphragmatis et muscutorum abdominalium pressione, cum simultanea expiratione; pulsus est contractus, rigidus, et frequens.

ILEUS. (187)

Gastrodynia, obstipatio, anxietas, et vomitus demum fœculentæ materiæ, determinant hunc morbum.

Atrocia circa umbilicum tormina, ructus, nausea, singultus, intestinorum volutatio, virium prostratio, pertinax alvi obstipatio, et vomitus demum fœculentus, sunt symptomata principalia hujus morbi.

CHOLERA. (188)

Est syndrome ex vomitu, diarrhœa, gastrodynia, prostratione virium, et subin surarum crampo.

DIARRHOEA. (189)

Est recrementorum et excrementorum ut plurimum fluxilium frequens per anum dejectio notabilis et constans, adeoque morbosa.

COELIACA. (190)

Est albescentium, aut chyliacearum materierum per alvum frequens dejectio, plerumque profusa, cum torminibus et prostratione virium.

LIEN-

LIENTERIA. (191)

Alimenta parum aut nihil mutata per alvum dejiciunt, et quidem plerumque paulo post ingestionem, lienterici.

TENESMUS. (192)

Muci frequens et pauca dejectio per anum, cum intensa dejiciendi cupiditate, conatuque eidem proportionali.

Stimulum et dolorem sentiunt ægri in intestino recto.

PROCTORRHOEA. (193)

Est fluxus mucosi subalbi, flavescentis, quandoque striis sanguineis tincti, humoris ex vasis hæmorrhoidalibus externis, vel in recto latitantibus, qui humor ordinario spissior est, dum ex internis vasis stillat, scybalaque præcedit.

Vide Lieutaud, tom. i. p. 396. num. 4. Pruritus præterea et ardorem hoc fluore madentes et fœtentes in podice sentiunt, queruntur. Species non adeo magni momenti in praxi possunt esse proctorrhœa externa, interna, periodica, sanguinolenta, hujus generis, quod etiam proctolucorrhœa vocari potest, ob similitudinem cum leucorrhœa.

ORDO IV. SERIFLUXUS.

Fluidi nec sanguinolenti, nec per alvum, effluxus morbosus.

EPHIDROSIS. (194)

Est sudoris quantitate, qualitate, aut intempestivitate peccantis, excedentis effluxus.

EPIPHORA. (195)

Est oculis constans effluxus humoris ferofi, lacrymalis, sebacei, aut purulenti, morbosus.

CORYZA. (196)

Est humoris ferofi mucosive e naribus fluxus morbosus, sine, vel cum ozæna, concomitante plerumque gravedine capitis.

PTYALISMUS. (197)

Est salivæ mucivæ, sine anacatharsi ac vomitione, ex ore effluxus, emissio, aut sputatio uber et constans.

ANACATHARSIS. (198)

Est muci, lymphæ, aut puris facta cum tussi e pectore per os rejectio frequens, notabilis, et morbosæ.

DIABETES. (199)

Subita potus omnis per urinæ vias emissio, vel urinarum utcunque coctarum nimia profusio, cum siti, anorexia, et polydipsia.

ENURESIS. (200)

Involuntaria et inopportuna doloris et ardoris expers minctio, quæque sæpius insciis accidit.

PYURIA. (201)

Est purulentæ, albæ, flavæ, mucosæ, aut lutulentæ materiæ cum urinis minctio.

LEUCORRHOEA. (202)

Est serosæ, flavæ, puriformis, mucosæ, foetidæ, atræ, &c. materiæ ex utero aut vagina delapsus, effluxusve morbosus.

LOCHIORRHOEA. (203)

Est lochiorum alborum nimius fluxus puerperam debilitans.

GONORRHOEA. (204)

Est stillicidium fluidi feminalis, vel puriformis, ex urethra, sine minctione.

GALACTIRRHOEA. (205)

Est stillicidium lactis e mammis, vel locis insolitis.

OTORRHOEA. (206)

Est fluxus serosus, purulentus, foetidus, ex cavo auris, meatu auditorio, vel ambitu auriculæ.

ORDO V. AERIFLUXUS.

Sunt flatus halitusve insolitæ et vitiosæ emissiones per os vel anum, &c.

FLATULENTIA. (207)

Est morbus flatuum per os, vel anum, frequenti emissione et borborygmis designatus.

ÆDOPSOPHIA. (208)

Est flatuum ex vesica per urethram, vel ex utero per vaginam, emissio.

DYSODIA. (209)

Est foetidorum vaporum e corpore exhalatio odoratum offendens, exhalant tales vapores e naribus, ore, vulva, inguinibus, axillis, et pedibus.

CLASSIS VI. SUPPRESSIONES.

Meatuum impeditio; hinc solitarum in fanitate excretionum impedimentum et emanatio; Suppressorios morbos vocavit Ill. Linnæus.

ORDO I. SUPPRESSIONES humorum feroforum.

ADIAPNEUSTIA. (210)

Transpirationis naturalis, et liquoris cutis organa humectantis, suppressio.

STERILITAS. (211)

Est genituræ suppressio, conceptus impeditio.

ISCHURIA. (212)

Urinæ secretæ a renibus retentio seu suppressio, cum tumore hypogastrii, vel secretiones in renibus suppressio, cum stupore renum, singultu, anorexia, vomitu, ptyalismo urinofo, ephidrosi.

DYSURIA. (213)

Difficilis et dolorifica, guttata sæpius et ardens mictio.

Est ergo fluxus urinæ pro parte suppressus, et non in integrum, ut in Ischuria.

AGLACTATIO. (214)

Lactis defectus.

DYSLOCHIA. (215)

Est lochiorum suppressio.

ORDO II. SUPPRESSIONES Ingerendorum,

Constrictio meatuum ingerenda admittentium, sine phlegmasia.

DYSPHAGIA. (216)

Est deglutitionis suppressio, impeditio, absque notabili respirationis læsione et phlegmasia.

ANGINA. (217)

Est respiratio impedita, cum sensu obicis in gutture, absque phlegmasia, sive dein adsit dysphagia, sive non.

ORDO III. SUPPRESSIONES imi ventris.

DYSMENORRHOEA. (218)

Menstrua suppressa, dolorifica, cum lumbagine, cephalalgia, dyspnœa, palpitatione cordis, &c.

Fluxus menstruus periodicus a tribus ad 8 dies protelari solet: quantitas sanguinis a quinque ad 10 uncias limitatur; circa 13 annum ætatis incipit, et ad 45 plerumque producitur; sanguis refert sanguinem victimæ.

DYSTOCIA. (219)

Dolorifica, laboriosa ultra modum fœtus exclusio aut secundinarum, vel penitus impossibilis.

DYSHÆMORRHOIS. (220)

Est suppressio suetarum hæmorrhoidum.

Dum fluxus hæmorrhoidum suetarum periodicus sæpius supprimatur, ex quacunque occasione, ante annum circiter 60, 65, quo hic fons sponte ficcari solet; oriuntur lumbago, ischias, vertigo, cephalalgia, tensio cervicis, anxietas, dyspnœa, colica, &c. Hæmorrhoidum fluxus, qui ultra 65 annum ætatis protelatur, jam morbosus haberi debet et suppressi minuere; senectus enim hunc fluxum non fert. Hæmorrhœis rarissime cum constantia sanitatis observatur; hinc vix pro beneficio haberi potest, licet morbos graviores prævertere dicatur.

OBSTIPATIO. (221)

Fæcum alvi exoneratio impedita. Car. Linn.

Est nimirum segnis, difficilis, rara fæcum alvi excretio, vel plane nulla etiam medicamentis prolici possunt excrementa: Medici assiduo curant obstipationem, et tamen hanc nec in numero morborum tolerant; ecquidem raro est morbus per se, sæpissime vero symptoma hoc alios morbos comitatur et auget.

CLASSIS VII. SPASMI.

Contractio constans, vel interpolata, musculorum motum localem efficientium, eaque invita.

ORDO I. SPASMI Tonici partiales.

Rigiditas organi, vel artus determinati.

STRABISMUS. (222)

Oculi alterutrius spasmus tonicus, axium opticorum divergentiam, vel convergentiam nimiam inferens, seu est spasmus tonicus oculi, unde hujus axis cum alterius axi ad unum objectum non convergit.

TRISMUS. (223)

Est spastica contractio tonica, aliquando visa fuit solum clo-nica maxillæ inferioris, vulgo Trotura Oris dicitur.

Rusticus venerat ad me, pedes trismo tonico laborans, pro consilio contra hunc morbum; datur igitur solitarius hicce morbus; vide Tetanum.

OBSTI-

OBSTIPITAS. (224)

Est colli spasmus, vulgo dicitur torticollis, tonicus, vel clonicus capitis mobilitatem et directionem mutans.

CONTRACTURA. (225)

Est artus unius vel plurium constans, diuturna rigiditas, inflexilitas.

CRAMPUS. (226)

Est subitanea, fugax, et dolorifica musculi rigiditas, cum dolore subin atroci.

PRIAPISMUS. (227)

Est penis ingrata et sine appetitu libidinis rigiditas, seu erectio.

ORDO II. SPASMI tonici generales.

TETANUS. (228)

Spasmus generalis tonicus subito ortus, cum dyspnœa; rigent musculi omnes, et corpus inflexile servant, cum dyspnœa et rubore faciei; vel rigent musculi soli posteriores corporis, aut anteriores, et corpus flectunt horribiliter, et plerumque flexum servant diutius.

CATOCHUS. (229)

Spasmus generalis tonicus sensim factus, sine dyspnœa, agitatione pectoris, faciei rubore, chronicus.

ORDO III. SPASMI clonici partiales.

Agitatio invita et coacta cujusdem organi aut artus, cujus motivum ab ægro non percipitur.

NYSTAGMUS. (230)

Spasmus clonicus oculi, vel palpebræ.

CARPHOLOGIA. (231)

Est spasmus clonicus manuum, quo ægri floccos e tegumentis evellunt, paleas colligunt, muscas venantur.

Symptoma hoc a suffusione natum plerumque est lethale.

SUBSULTUS. (232)

Est motus palpitans aut tremulus tendinum, pone carpos potissimum observabilis.

PANDICULATIO. (233)

Est spasmus artus successive extendens plures, vel omnes in oscitatione.

APOMYTTOSIS. (234)

Est succussio cutis et capitis, cum trunci totius agitatione tremula et violenta; adest simul exspiratio sonora, quasi stertorosa.

CONVULSIO. (235)

Est agitatio invita artus, vel musculi brevis cum superstitie exercitio animi.

TREMOR. (236)

Artuum aut capitis alterna, per itus et reditus frequentes, motitatio per brevissima spatiola, cum movendi voluntate concurrens, qua cessante, cessat quoque tremor.

PALPITATIO. (237)

Est pulsatio in regione cordis insolita, cum pulsu intermittente, caprizante, tremulo, subduro, inæquali, inordinato, debili, quandoque et dyspnœa ad quemlibet motum notabili.

Habeo ægram, cujus pulsus sub actuali palpitatione remittit, vel intermittit, in 5 annum jam hoc ex morbo languentem; subin tremorem in præcordiis patitur, cum pulsu caprizante tremulo; notum est, quod regularis pulsatio cordis non dicatur palpitatio.

CLAUDICATIO. (238)

Est vitiosus gradiendi modus, quo truncus singulis passibus huc vel illuc nimium inclinatur, unde crus indecore movetur, trahitur.

ORDO IV. SPASMI clonici generales.

PHRICASMUS. (239)

Est succussio invita totius cutis, imo sæpius totius corporis, frigorigera.

ECLAMPSIA. (240)

Est morbus convulsivus clonicus acutus, quandoque remittens, cum sensuum feriatiōe in paroxysmo; pollices intro non premunt, spuma ex ore non eructat, spasmi sunt tremuli artuum omnium; vulgo vocatur hic morbus Apoplexia puerilis.

EPILEPSIA. (241)

Est morbus spasmodicus clonicus, intermittens, seu periodicus, chronicus, cum variorum membrorum invita agitatiōe, dyspnœa, spumæ oris eruptione, pugnorum constrictiōe, et sensuum feriatiōe externorum et internorum, sine asphyxia.

Symptomata: Subitanus casus, obliuio omnium, clamor, mugitus, stridor dentium, truculentia oculorum, spuma oris, pugnorum constrictio, totius corporis agitatio.

HYSTERIA. (242)

Est artuum organorumque externorum internorumque spasmus clonicus tonicusve, paroxysmis fugacibus, leviter variantibus, cum pusillanimitate, sensibilitate animæ summa, mortis formidine intensa, teneritudine partium convulsarum remanente, attactum fugiente, et urina hyalina.

Signa pathognomica hujus morbi statuit Ill. Astruc agitatiōem matricis, pnycem, constrictiōem pectoris et glomum fluctuantem in abdomine.

SCELOTYRBE. (243)

Est motus semivoluntarius unius lateris, vel totius corporis in gressu, situ erecto, aut comestiōe, gesticulationem, aut ridiculam histrionis festinationem, referens.

Hunc morbum vocavit Sydenhamus Choream Sancti Viti.

BERIBERIA. (244)

Est motus gradientium genua spastice retrahens, cum tremore artuum, fornicationis sensu, vocis rauedine, stupore dolorifico artuum, qui morbus Indis est familiaris.

In ovibus olim lupum videntibus beriberiam spasmus videnti, stantes hæ vel gradientes tristes momentaneæ retrahunt genua, ad situm naturalem illico reditura.

CLASSIS VIII. ANHELATIONES.

Est agitatio invita, defatigans musculorum pectoris, cum respiratione difficili, laboriosa, sonora, frequenti, sine febre notabili, et sine phlegmasia.

ORDO I. ANHELATIONES spasmodicæ.

Sunt symptomata fugacia spasmodica, sæpius repetentia, quæ consistunt in ex- vel inspirationibus sonoris.

EPHIALTES. (245)

Morbus hic recurrens afficit dormientes cum anhelatione et infomnio corporis cujusdam pectus opprimentis; unde respiratio horum querula, gemebunda, et anxia.

STERNUTATIO. (246)

Est violenta, sonora, et subitanea exspiratio, in nares posticas immisso aëre, ad nares everrendas sub convulsiva capitis et trunci corporis concussione, ad anteriora flexione.

Species sunt Sternutationis, Catarrhalis, Rubeolosa, Verminosa, Spontanea, Febricosa, Epidemica, Critica, Medicamentosa, &c.

OSCEDO. (247)

Est aëris copiosi profunde inspirati diutina, lenta, et invita naturalis exspiratio, cum magno oris hiatu; sæpe concurrat et pandiculatio.

SINGULTUS. (248)

Est concussio diaphragmatis invita, cum inspiratione subito interrupta, sonora.

TUSSIS.

TUSSIS. (249)

Est concussio sonora, violenta, invita pectoris, cum expiratione ad pulmonem quodam obice liberandum.

ORDO II. ANHELATIONES suppressivæ.

Hæ fiunt cum metu suffocationis, suntque pleræque constantes.

STERTOR. (250)

Est respiratio sonum gravem et tremulum in gutture edens, sæpius sibilo stipata.

DYSPNOEA. (251)

Est difficultas respirandi assidua et chronica, sine signis empyematis, hydrothoracis.

ASTHMA. (252)

Est chronica, periodica respirandi difficultas.

ORTHOPNOEA. (253)

Est morbus continuus acutus, subitanea anhelatione sublimi, et fere suffocatoria, stipatus.

PLEURODYNE. (254)

Anhelatio, cum pectoris dolore, sine phlegmasia, cum exigua vel nulla febre.

RHEUMA. (255)

Cognoscitur ex difficultate respirandi, cum sensu gravitatis in pectore, quam comitatur coryza, sternutatio, raucedo, cephalalgia, tussis, sine pyrexia notabili, et sine sanguine inflammato; endemius hic morbus.

HYDROTHORAX. (256)

Est genus anhelationis chronicum continuum, stipatum phlegmasia pedum, pallore faciei, œdemate manuum, subita in somno suffocatione, alterutrius manus stupore, sine signis empyematis.

Hæc symptomata jam adsunt omnia, jam tantum aliqua; anhelatio crescit pro inclinatione corporis.

EMPHYEMA. (257)

Est difficultas respirandi a pectoris reclamatione crescens, quam præcessit phlegmasia pectoralis non resoluta, sed suppurata; comitatur amphimerina tabida notabilis, macies, decubitus horizontalis et in latus sanum difficilis, gravitas supra diaphragma, sudores profusi, rubor genarum, et multa symptomata hydrothoracis.

Species sunt, Peripneumonicum, Vomical, Pleurale, Mediastinale, Diaphragmaticum, Intercostale; quas species sufficiat hic nominasse, quum earundem historia necdum satis protracta sit.

CLASSIS IX. DEBILITATES.

Est impotentia clare et distincte sentiendi, appetendi, consueta vi, artus organave movendi, nec non imaginandi, vigilandi, sensibus internis et externis utendi.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare et distincte sentiendi.

AMBLYOPIA. (258)

Est visus debilitas respectiva ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis; vel est debilitas visus absoluta, vel respectiva, sine opacitate corneæ, aut vitio internarum partium oculi.

CALIGO. (259)

Est imminutio partialis, vel totalis deletio visus, propter repagulum opacum citra seu ante pupillam oculo inhærens, aut palpebris.

CATARACTA. (260)

Est visus debilitas, vel abolitio, ob maculam opacam, post pupillam positam, seu opacitatem lentis crySTALLINÆ.

AMAUROSIS. (261)

Est visus suppressio, abolitio, vel defectus, cum pupillæ ferme plenaria immobilitate, sine sensibili oculorum vitio aut opacitate externis.

ANOSMIA. (262)

Est imminuta, vel suppressa facultas percipiendi odores.

AGHEUSTIA. (263)

Est suppressio facultatis, qua diversos sapes percipimus, cum vel sine anorexia.

DYSECOEA. (264)

Est audiendi difficultas, seu gravis auditus et obscura perceptio sonorum.

PARACUSIS. (265)

Est debilitas seu confusio auditus, qua affecti clare percipiunt voces, sed non distincte diversos sonos et articulatas voces audiunt, vel alios sonos clare et distincte audiunt, alios tantum clare sine distinctione.

COPHOSIS. (266)

Est obscura, vel nulla sonorum perceptio, seu impotentia percipiendi sonos totalis, vel partialis.

ANÆSTHESIA. (267)

Est sensus omnis privatio, superstitibus motu muscolari et rerum necessariarum appetitu aliquantum minutis, sine omni sopore.

ORDO II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum fenfitivorum debilitas, feu imminutio notabilis.

ANOREXIA. (268)

Eft notabilis debilitas, imminutio, feu ceflatio famis in jejunis animantibus.

ADIPSIA. (269)

Eft fitis debilitas, feu imminutio, aut abolitio.

ANAPHRODISIA. (270)

Eft debilitas, vel abolitio appetitus venerei, feu impotentia. Vide Sterilitatem.

ORDO III. DYSCINESIÆ.

Impotentia exercendi motus folitos voluntati fubjectos.

MUTITAS. (271)

Eft impotentia proferendi voces articulatas.

APHONIA. (272)

Eft plenaria vocis fuppreffio, citra ftuporem, fyncopen, et comata; muti inarticulatam vocem habent, aphoni contra nullam.

PSELLISMUS. (273)

Eft difficultas feu impotentia quafdam fyllabas literasve recte pronunciandi.

Faciunt hoc puellæ quædam naviter, ut magis placeant procis.

CACOPHONIA. (274)

Eft vocis vitium et infuavitas atque afperitas.

PARALYSIS. (275)

Eft unius tantum artus, vel articuli frigida plerumque laxa immobilitas, abfque dolore cum vel fine anæfthefia.

Parefis eft fenfûm invadens debilitas movendi artus, feu eft

PARALYSIS. (275)

est imperfecta paralyfis; movent enim hi artus, sed difficulter; colicam pictonum aliasque rachialgiæ species comitatur, vel sequitur paresis, lente accedit paretica debilitas, et non est tanta, quanta observatur paralyticorum; actu observo paresin in brachiis egregii chirurgi Christophori Nohrer, ex colica pictonum laborantis.

HEMIPLEGIA. (276)

Cognoscitur ex summa debilitate, vel integra motus muscularis suppressione unius lateris corporis, cum laxitate, frigidityte, indolentia artuum et mentis integritate, sine vel cum anæsthesia.

PARAPLEXIA. (277)

Est paralyfis artuum inferiorum, vel omnium artuum, cum enuresi, anaphrodisia, quandoque et anæsthesia ac marasmo.

ORDO IV. LEIPOPSYCHIÆ.

Virium vitalium, pulsus, et respirationis debilitas seu imminutio; pulsus est perpendiculum vitæ.

ASTHENIA. (278)

Est debilitas omnium artuum, superstitie actionum vitalium minutarum tenore, superstitibusque sensibus, sine dolore.

LIPOTHYMIA. (279)

Est subitanea et brevis virium muscularium et sensuum dejectio, seu eclipsatio, superstitie pulsu et cognoscendi aliqua facultate adstantes, cum aurium tinnitu, calore, vertiginosaque capitis turba.

SYNCOPE. (280)

Est subitanea virium omnium animalium, et vitalium sensuumve, imminutio tanta, ut æger per tempus sui conscius non sit, cum lenta lenive respiratione, pulsu obscuro, sudore frigido, et aliquali interiorum calore.

ASPHYXIA. (281)

Est subitanea eclipsis omnium actionum naturalium, animalium, et vitalium, cum mortis imagine.

Vide Cl. Lanficiam circa mortes subitaneas.

ORDO

ORDO V. COMATA seu morbi soporosi.

Omnium sensuum feriaciones, maximæ debilitates.

CATALEPSIS. (282)

Est sensuum omnium motuumque muscularium suppressio, pulsu et respiratione pacatis, placidis, lentis, minutis, vel obscuris, cum mira ad quosvis situs suscipiendos et retinendos artuum flexilitate, aptitudine; retinent figuram, in qua ipsosprehendit morbus, et omnem recipiunt servantque, quam illis dederis; morbus est recurrens, et fors tantum mulierum.

ECSTASIS. (283)

Est status soporosis a gravi pathemate, vel mentis attentione profunda ortus, ægrum in eodem situ, quo prehensus est, retinens, sine aptitudine cataleptica.

TYPHOMANIA. (284)

Est sopor apparens, cum pervigilio delirioso reali, mutitatione; vel est sopor levis e quo ægri facile excitantur, cum delirio comitante.

LETHARGUS. (285)

Est status soporosis facile excitabilis, cum summo imaginationis et memoriæ torpore, oblivione, et febre.

CATAPHORA. (286)

Est somnolentia facile excitabilis, sine febre, oblivione, stertore, delirio.

CARUS. (287)

Est somnus altissimus, vix aut ne vix excitabilis, sine stertore, cum respiratione tacita pacatissima; morbus sæpius est acutus; semi-apertis oculis plerumque dormiunt omnino immobiles.

APOPLEXIA. (288)

Est somnus profundissimus, vix aut ne vix excitabilis, cum stertorosa respiratione, faciei tumore, omnium artuum laxitate, et pulsu plerumque duro, forti.

CLASSIS X. EXANTHEMATA.

Febris cum asthenia, efflorescentia cutis maculata varia, pustulosa, papulosa, phlyctenoidea, &c. vel cavi oris, sæpius maligna.

ORDO I. EXANTHEMATA contagiosa.

PESTIS. (289)

Eruptio purpuræ, bubonum, anthracum, pemphigi, cum pyrexia typhode, maligna, dat characterem Pestis.

Vide celebrem Loimographum Diemerbroeckium.

VARIOLA. (290)

Prælidium variolæ patefit cephalalgia, lumbagine, nausea, vomituritione, eclampsia, et febre continua inflammatoria; erumpunt dein pustulæ phlegmonoideæ suppurantes, escharoticae, deciduæ, cicatrisantes.

Variola sæpissime epidemicus morbus habet 4 stadia, nempe contagium, eruptionem, seu inflammationem pustularum, suppurationem, tandem exsiccationem.

PEMPHIGUS. (291)

Est phlegmasia sæpius acuta, exanthematica, stipata bullis seu vesiculis avellanam circiter magnitudine æquantibus, sero flavo turgidis, per cutim sparsis.

An Hippocratis tom. i. p. 684. ichores constituerint Pemphigum? Tomo citato, p. 798. Hippocrates scripsit: ' πυρετοι οι δε πεμφιγωδεις. ' Et Claudius Galenes, sexto epidemiorum tom. i. class. 3. p. 311. Basilea 1561, inter reliquas interpretationes hujus febris, etiam hanc admisit, quæ est character hujus generis; nihil ergo novi Pemphigus.

PURPURA. (292)

Sunt maculæ pulicum morfibus similes, faciei parcentes, pressione non evanescentes, carentes stigmatibus aculei a pulice infixi, coloris purpurei, lateritii, nigri, lividi, sine tumore, aspredine, cum febre amphimerina, vel tritaëophya, putrida, asthenia, lingua plerumque rubra, lateritia, molli.

RUBEOLA. (293)

Post præludium catarrhosum, coryzam, epiphoram, tussim, cephalalgiam, somnolentiam, et palpebrarum tumorem, erumpunt papulæ corymbosæ rubræ, pulicum morsus æmulantes, asperæ, uniformes, evanescenti-furfuraceæ die 4to, cum exiguo levamine symptomatum contagii in facie, collo, thorace, trunco reliquo, et artubus; quandoque sexto die in facie jam asperantur, siccantur, et in tenuissimum furfurem fatiscit epidermis; et hoc est initium tertii stadii, quod ordinario 8. vel 9. die, una cum morbo, finitur; febris comitatur Rubeolam continua; Rubeolam porro inoculat atmosphæra morbillosa bronchiis, sacco lacrymali, et sinibus sex in nares patentibus; medici contra seminatores rubeolæ gossypium furfure morbilloso repletum sublimi vulnuscule, cujusque brachii imponunt, emplastro omnia tegunt, et 6to. die post appositum hunc apparatus incipiunt ægrotare.

SCARLATINA. (294)

Est efflorescentia maculosa, ruberrima, pruriens, papulosa, irregularis, diffusa, desquamabilis, sine præludio catarrhali efflorescens, cum febre plerumque judicatoria. Stadia tria scarlatinæ observamus, præludium noscimus inde, quod febris plerumque judicatoria, cum horrore et frigore, prehendat infantes, sub finem ætatis, sine præludio catarrhali et sine vomitu; quarto vel citius die, facies intumescit modice, pectus, &c. erumpunt exanthemata paulo ante descripta, et hoc est stadium secundum; post 3 vel 4 dies incipit stadium tertium, in quo evanescent exanthemata, et epidermis sub forma subtilis pollinis desquamatur.

ORDO II. EXANTHEMATATA non contagiosa.

MILIARIS. (295)

Eruptio phlycthænarum milii femine raro majorum, cum sudore vapido; febris continua, vel remittens, putrida; præluit oppressio præcordiorum, gastrodynia gravans, pulsus suppressus, urina minus tincta, lingua plerumque alba, mollis, asthenia; persistant in cute 4, 5, 6, 7, 9, 11, &c diebus, et cum pruritu, sudore, solvuntur, in farinam subtilem disparent.

Hippocrates, tom. i. p. 697. describit Miliarem et quidem criticam, seu servantem mulieres omnes, quarum cutim obsederat hæc efflorescentia. Silenus insuper indubie 8vo. die morbi miliari rubra maculatus fuit, tom. i. p. 674.

ERYSIPELAS. (296)

Est eruptio erythematis cum febre continua, vel amphimerina potius dicenda, tumiduli, superficialis, dilatabilis, desquamabilis; sistit nimirum maculas latas, amplas, sub-tumidulas, non suppurabiles; sanguis missus crusta inflammatoria non est tectus, sed pelle alba, tenui, et fat tenaci; dolor erythematis est calens, rodens.

Tria stadia observantur Erysipelatis: Primum absolvit grædo, horror, inappetentia, lassitudo, cum febricula amphimerina; die 2. 3. vel 4. incipit secundum stadium, eruptio, nempe, erythematis, quod ordinario in 4. usque diem augetur; in tertio stadio collabitur successive tumor, calor, et dolor erythematis, et epidermis desquamatur, quod opus plerumque 4 diebus Natura absolvit.

ESSERA. (297)

Constituunt hoc genus maculæ rubellæ impruriginosæ, non fastigiatae ultra libellam cutis, magnitudinis grani tritici, zææ, subito erumpentes ferme sine febre, et post 4, 5, 7, 9, 11, 14, dies sponte et sine desquamatione epidermidis disparentes; quandoque sunt paucæ, subin contra numerosæ; ægri sunt plerumque orthostadii; præcedit eruptionem nox inquieta, leves anxietates; cutis, existente essera, non est aspera ad attactum, nec rubedo est diffusa; maculæ aliæ sunt majores, aliæ minores, sub epidermide latentes.

Hujus

ESSERA. (297)

Hujus morbi meminit D. Allen, p. 407. ubi tamen non hunc, sed alium descripsit; Cl. D. Lieutaud, tom. i. p. 614. unam speciem descripsit hujus generis.

APHTHA. (298)

Cognoscitur Aphtha papulis seu phlycthænis linguæ, faucium, oris superficiem occupantibus, subrotundis, plerumque semilinearibus, colore albis in disco, cum radio sæpius rubro, vel rubris, brunneis, flavis, lividis, nigris, et febre tritæophya, vel obscura hæctica, aut penitus nulla; adest simul somnolentia, dolor urens oris, et difficultas in masticatione, suctione, ac deglutitione.

Aphtha 4 stadia habet distincte, si non omnibus speciebus, in febrili observabilia; Stadium primum sese prodit lassitudine spontanea, levi dyspnœa, gastrodynia, anxietate exigua, somnis turbatis, et calore oris: Stadium secundum propullulatio papularum nobis adesse loquitur: In stadio tertio elewantur papulæ seu maculæ in phlycthænas miliares, quæ probabiliter sunt idem cum miliariibus cutis: Stadium quartum absolvit desquamatio epidermii, cum dolore sensibilissimo linguæ et faucium superficiali.

CLASSIS XI. PHLEGMASIÆ.

Febris quasi semper continua, cum pulsu duro, dolore topico, alicujus partis inflammatione, sanguine crusta inflammatoria tecto, urina plus colorata, lingua subficca, ficca, calente, &c. Hippocrates, tom. i. p. 810, 811. reliquit: Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus: Quapropter per hanc humores cognoscimus.

ORDO I. PHLEGMASIÆ musculosæ.

PHLEGMONE. (299)

Cognoscimus Phlegmonem ex febre acuta continua inflammatoria, pulsu duro, sanguine crusta inflammatoria tecto, et partis externæ inflammatione; pars externa phlegmone affecta calet, rubet, dolet, tumet, est simul tensa resplendens sphæroidea; cutis ipsa et partes sub ipsa contentæ inflammatae sunt; Phlegmone in suppurationem tendit, neutiquam vero erysipelas.

CYNANCHE. (300)

Est phlegmasia acuta pharyngis, laryngis, dyspnœam et dysphagiam inducens, cum pyrexia acuta, faucium rubore, calore, dolore, tumore, quæ adesse docet inspectio in fauces, depressa lingua.

MYOSITIS. (301)

Febris acuta inflammatoria, dolores in diversis musculis artuum, eorundemque involucris, diu noctuque discruciantes, motum vetantes ferme omnem, ad noctem exacerbantes; sanguis missus est tectus crusta inflammatoria subgelatinosa, vel pelle tenui tenaci; hic morbus vulgo audit rheumatismus acutus.

CARDITIS. (302)

Adest dolor constans sub sternone in regione cordis urens, flammam vitæ extinguens, cum palpitatione, frequentibus animi deliquiis, pulsu jam magno, duro, per momenta, jam parvo, frequente, inæquali, inordinato, intermittente; febre acuta typhode et anxietatibus; cor manu tenentes ægri fugitivis oculis et mille jactationibus agitati, sibi comburi, illudque mori quæruntur, clamant.

ORDO II. PHLEGMASIÆ membranaceæ.**PHRENITIS. (303)**

Est phlegmasia acuta, cum pyrexia et delirio perpetuo, a cephalalgia atroci plerumque incipiens; delirium quandoque est audax, urina plerumque citrina, cum nebula sublimi.

DIAPHRAGMITIS. (304)

Est phlegmasia cum dolore obscuro ad costas spurias, oppressione pectoris, sputis sæpe cruentis, orthopnœa, anxietate; singulum præcordia stringens quæruntur ægri; angulos oris semivoluntarie sæpe retrahentes delirant; quandoque lethargo, vel cataphora laborant; pulsus est inæqualis, inordinatus, intermittens, durus; hypochondria intro tracta, respiratio sine motu diaphragmatis; facies jam pallet, jam rubet; calor est urens ad præcordia internus.

Scripsi sicut observavi in meis ægris. Vide Hippocratem, tom. ii. p. 101. ix.

PLEURITIS. (305)

Est phlegmasia cum pyrexia acuta, dyspnœa, dolore pectoris plerumque punctorio, et tusi molesta dolorem augente, sine gravitate in medio pectore.

Sedes

PLEURITIS. (305)

Sedes morbi in 300 pleuriticis denatis a P. Servio Romano in pleura pulmonali inventa est; invenit, nimirum, pleuram pulmonis superficiem investientem, cum superficialibus et extremis vasis pulmonis, inflammatam.

GASTRITIS. (306)

Est phlegmasia stipata dolore epigastrii, ardore, tensione, siti, nausea, vomitione, singultu, et pyrexia acutissima.

ENTERITIS. (307)

Est phlegmasia acuta, cujus symptomata sunt tensio tumida et valde dolorifica, tactum non tolerans, partium abdominis intestinis respondentium, cum pyrexia meteorismo, quandoque et ileo, vel dysenteria.

EPIPLOITIS. (308)

Bis observavi hanc phlegmasiam, semel in viro rustico 30 annorum, et semel in quadragenaria muliere, cum frequente charactere: Febris erat mitis amphimerina, virium non adeo magna prostratio (rusticus venerat ipse 4ta die morbi pro consilio ad me) lingua alba tumidula, sanguis missus coriaceus, obstipatio non pertinax, dolor obtusus infra peritonæum ad contactum paululum acutus, tumor omenti, respiratio suspiriosa, pulsus durus naturali celeritate et frequentia non multum major, sitis mediocris, urinæ flavæ, appetitus aliquis, aliquis et somnus.

CYSTITIS. (309)

Est phlegmasia, cujus præcipua symptomata sunt intumescencia ovalis in pelvi, cum tensione, dolore tactum non tolerante, dysuria, vel ischuria et pyrexia amphimerina; adfunt insuper vigilæ, sitis, subin delirium, extremorum frigus, tenesmus, vel obstipatio; pulsus observavi tensum, subdurum, naturali frequentia et celeritate non multum majorem; in sanguine misso crustam tenuem albam, subgelatinosam, clysmatum difficilem injectionem: Scribo sicut observavi.

ORDO III. PHLEGMASIÆ parenchymatosæ.

CEPHALITIS. (310)

Est phlegmasia, in qua mentis stupor, somnolentia, sopor cataphoricus, carphologia adsunt, cum pyrexia acuta typhode; pulsus successeve mollescit, cum frequentia sine celeritate; ægri sunt admodum debiles; lingua plerumque mollis, sudor quasi perpetuus; caput sæpe manibus impetunt, fricant etiam deliri.

Ter observavi jam hunc morbum, et post mortem in cujusslibet ægri cadavere suppurationem cerebri inventi; respirabant hi ægroti cum sonitu sine stertore.

PÉRIPNEUMONIA. (311)

Pyrexia acuta, dyspnœa gravis, sensus oppressiois gravativæ sub sternum, calor et anxietas in pectore, tussis cruenta, facies rubra, lingua rubra tumidula; pulsus incremento magnus, sub inspiratione remittens, vel penitus intermittens, ad finem morbi mollis.

HEPATITIS. (312)

Est phlegmasia acuta, cujus symptomata sunt tensio dolorifica hypochondrii dextri sub costis spuriiis, cum sensu ardoris ac gravitatis, dyspnœa, tussis sicca, faciei colore flavescente, siti, anorexia, sæpius et singultu, vomitione et tumore hepatis; pulsus est subdurus, tensus; urinæ icteritiæ, biliosæ; serum sanguinis missi et crusta subflava; febris quasi semper remittens.

SPLENITIS. (313)

Cognoscitur hæc phlegmasia febre remittente, sæpius tetartophya, tumore, duritie in regione lienis, dolore tactum fugiente pulsatili, calore, dyspnœa, pulsu in inspiratione intermittente in carpo sinistro magis, et absentia symptomatum nephriticorum; frigent hi ægri artubus; calor internus non est adeo magnus; sanguis missus est crusta inflammatoria tectus; cibi adest fastidium, decubitus in latus sinistrum difficilis, sitis et anxietas.

Semel observavi hunc morbum sicut illum hic descripsi.

NEPHRITIS. (314)

Est phlegmasia pyrexia acuta, dolore renum inflammatorio, urinæ ardore, mictione frequenti stipata; dolor sequitur ureteres,

NEPHRITIS. (314)

ureteres, testis retrahitur, rotatur, crus stupet, plerumque adest vomitio, sine augmento doloris æger potest corpus ad anteriora flexum erigere.

METRITIS. (315)

Hanc phlegmasiam adesse noscimus tumore, ardore, dolore, gravitate in regione uteri, et pyrexia acuta; digitum in vaginam immissi os uteri tactum non fert, idem valde calet; adest dolor ad inguina, femora; diaphragma, qui ad claviculas extenditur, cum dyspnœa, nausea, vomitione, singultu, obstipatione, ischuria, vel dysuria, horrore perpetuo, frigore extremorum, delirio, jactatione, spasmis, dolore oculorum; pulsus varius, animi deliquia, sopor, tetanus, catalepsis observantur, cum febre plerumque remittente.

CLASSIS XII. FEBRES.

Pulsus frequens, celer, fortis; respiratio celeritate, magnitudine, frequentia aucta, viribus artuum minutis; vel virium vitalium augmentum, aut saltem in statu sanitatis perseveratio, viribus artuum notabiliter minutis.

ORDO I. FEBRES continuæ.

Pyrexia semel crescit, et semel decrescit, in decursu ægritudinis.

JUDICATORIA. (316)

Ingruit tota febris subito cum frigore, calore, capitis dolore, &c. pulsu aliquo critico, aut evacuationibus criticis, vires artuum parum sunt minutæ, vires contra vitales multum auctæ, criticæ; absolvitur 4 diebus.

HUMORARIA. (317)

Cognoscitur hæc febris pulsu irritationis, incremento successivo usque 4. 5. 7. vel 9. diem, duratione morbi usque 7. 9. 11. vel 14. diem, notabili debilitate artuum, vehementibus symptomatibus, et humorum augmento, aut vitio, unde noscitur.

FRIGERARIA. (318)

Est febris continuæ genus, quæ decurrit ad 17. 21. vel 30. diem, incrementum habet longius præcedente; ingruit cum pulsu irritationis; pulsu et respiratione auctis, viribus artuum multum minutis; notabili frigore sæpe et rigore,

FRIGERARIA. (318)

rigore, unde Frigeraria; lingua est sordida, excreta omnia foetida, a statu naturali multum distantia; hæc est Febris proprie Putrida.

TYPHUS. (319)

Est febris continuæ genus, quæ plerumque ultra tres septimanas durat, cum calore jam magno, jam nullo, urina et pulsu sanorum similibus, artuum summa debilitate; pulsus quandoque rarior est quam pulsus sanus, color cutis pallidus, squalidus, exanthemata varia huic morbo superveniunt epigenomena.

HECTICA. (320)

Est febris continua, quæ chronicorum morborum more sensim extendi suevit per plures septimanas, ino menses, sine notabili virium prostratione, cum exigua pulsus frequentia; urina sæpius est turbida, pelliculam innatantem pinguem gerit; pulsus est subdurus, post pastum frequentior, calor ad attactum est mordens; sudores nocturni; febris hæc, nullam habens exacerbationem notabilem, differt ab omni amphimerina, phthisi, et tabe, quia suppurationem pro causa non habet; ægri sunt plerumque orthostadii.

ORDO II. FEBRES remittentes.

Sunt febres continuæ cum exacerbationibus quotidianis, tertianis, quartanis, &c.

AMPHIMERINA. (321)

Est febris continuæ, cum exacerbationibus quotidianis sibi similibus.

TRITÆOPHYA. (322)

Est febris continua, cum exacerbationibus tertianis.

TETARTOPHYA. (323)

Est febris continua, cum exacerbationibus quartanis, seu quartanæ typum servantibus.

ORDO III. FEBRES intermittentes.

Pyrexia in decursu ægritudinis pluries penitus deferit ægrum, et redit cum intervallis medijs lucidis, servata periodo.

QUOTIDIANA. (324)

Febris intermittens, cujus paroxysmi similes redeunt nycthemeris singulis.

TERTIANA. (325)

Est febris intermittens, cujus paroxysmi alternis diebus sibi similes repetunt, seu circuitum servant; urinæ lateritiæ sunt optimum signum febrium intermittantium.

QUARTANA. (326)

Est febris intermittens, cujus paroxysmi sibi similes quarta quavis die abeunt, et revertuntur; inter quoslibet duos paroxysmos intercedunt duæ dies apyretæ.

ERRATICA. (327)

Hæc febris distinguitur ab aliis generibus per accessus similes pluribus diebus ab invicem distantes quam duobus, nec proinde ad priora genera referri potest.

CLASSIS XIII. VESANIÆ.

Morbus mentis, seu error in imaginatione, appetitu, judicio, vel memoria.

ORDO I. HALLUCINATIONES.

Imaginationes deceptivæ ex errore organi, vel mentis natæ.

VERTIGO. (328)

Est hallucinatio, qua objecta, licet quiescentia, e loco moveri, nutare, vel in gyrum versari, nobis videntur, ipseque æger quandoque sibi nutare videtur; dicta phænomena etiam clausis oculis plerique patiuntur.

SUFFUSIO. (329)

Est genus morbi imaginarii, cujus præcipuum symptoma est hallucinatio visus circa objecta videntis corpora, quorum prototypus extra oculos non existit; suffusio repræsentat corpora quæ non sunt, et vertigo motum corporum, quo actu non aguntur.

DIPLOPIA. (330)

Est hallucinatio, qua affecti idem objectum geminatum, aut multiplicatum, videntur sibi videre.

SYRIGMUS. (331)

Est error imaginationis sonos, qui extra aurem non sunt, sibi repræsentantis, a commotione vibratoria organorum acousticorum per principia in aure latentia natos.

HYPOCHONDRIASIS. (332)

Est delirium circa propriam valetudinem, natum ex philantia, salvo ratiocinio de reliquis, delirant et desperant de sua valetudine recuperanda ob ructus, borborygmus, palpitationes, tremorem præcordiorum, fugaces vertigines, flatulentiam, &c. Hinc hi persuasi fatum lethale sibi imminere, omnia symptomata et minimas mutationes in corpore suo scrupulose observant, narrant, et describunt medicis, suisque querulis, alios mox et alios defatigant, ingenio cæterum et appetitu pollentes.

SOMNAM-

SOMNAMBULISMUS. (333)

Est dormientium hallucinatio, somniantes, nempe, ob imaginationem vividissimam, sopitis somno sensibus, motus musculares exercent, surgunt e lecto, variis periculis sese exponunt, tecta scandunt, iter suscipiunt.

ORDO II. MOROSITATES.

Cupiditates, vel averfationes depravatæ.

PICA. (334)

Est alimentorum inassuetorum, vel rerum indigestibilium, appetitus, cum assuetorum averfatione.

BULIMIA. (335)

Est appetitus majoris alimentorum digestibilium et solitorum copiam, quam quæ a viribus ventriculi digeri potest.

POLYDIPSIA. (336)

Est potulentorum appetitus immodicus.

ANTIPATHIA. (337)

Est averfatio quorundam objectorum tanta, quod homo ex eorum visu, odoratu, auditu, &c. gravia symptomata patiatur.

NOSTALGIA. (338)

Est desiderium vivendi parentes, cognatos, solumque natale adeundi adeo ardens, ut hac sola anhelatione occupati penitus langueant; horumque animæ commercium cum corpore ferme sublatum sit; unde languent omnes sensus, et appetitus alii; hæctica febris hos miseros consumit, et ad lethum ducit, si adeundi patriam cognatos copia denegetur.

Olim in Croatia Crisii laboravi hoc malo cum apofitia, et obfipatione, intumueram ex anasarca pervigil et debilis; redux ad patriam sine omni pharmaco convalui; desideramus varia ardentissime.

PANOPHOBIA. (339)

Est summus pavor inter dormiendum sine causa evidenti ortus; clamant hi, gemunt, tremunt, sudant; hoc genus non multum differt ab ephialte.

SATYRIASIS. (340)

Est morbus proprius viris, cujus præcipuum symptoma est effrænis impudensque veneris cupiditas, cum libidinosa penis tentigine; priapismus caret cupiditate libidinosa.

NYPHOMANIA. (341)

Hujus generis character est effræne, audax, et impudens in fæminis veneris desiderium.

TARANTISMUS. (342)

Hic morbus scribitur in Apulia esse endemius, cujus præcipuum symptoma est inexplicabilis saltandi, choreas agendi cupiditas.

A Tarantulæ morfu excitari hunc morbum judicat Baglivius, quod Ill. Seroa et experimenta Romana inficiantur.

HYDROPHOBIA. (343)

Est morbus, cujus præcipuum symptoma est incredibilis potulentorum omnium averfatio, impossibilis deglutitio; vitant insuper lucem et aëris motum.

RABIES. (344)

Est morbus in lupis et canibus observatus, cujus præcipuum symptoma est effrænis cupiditas mordendi obvios omnes, licet innocuos, sine hydrophobia; constat enim repetita apud Gallo-Provinciales experientia canes luposque rabidos bibisse, manducasse, et flumen transisse; hic nihilominus morbus sæpius est symptoma hydrophobiæ.

Vide dissertationem Ill. de Sauvages de Rabie. Rabies porro datur Caninamaniaca, et Dæmonomaniaca: Vide Hydrophobiam.

ORDO III. DELIRIA.

Delirium est ortus idearum non respondens objectis in sensus incidentibus, sed internæ cerebri dispositioni a qua nascuntur ideæ delirantium.

PARAPHROSYNE. (345)

Est delirium fugax a veneno, vel alio morbo dependens, cujus comes et symptoma est.

AMENTIA. (346)

Est infania chronica, universalis, mitis, seu ineptitudo ad recte ratiocinandum et judicandum, cum sensu et perceptione objectorum, aut sine attentione.

MELANCHOLIA. (347)

Est infania chronica partialis, mœsta, meditatunda; delirant melancholici sine furore, et sine febre, de uno potissimum objecto constanter, delirant circa semetipfos, aut suum statum, de reliquis objectis adhuc sat bene ratiocinantes.

Mihi videtur caussa hujus morbi latere in abdomine, ganglia semilunaria afficere, et plexus nervorum abdominales.

DÆMONOMANIA. (348)

Est delirium sine febre reipsa tale, vel tantum simulatum, quo magi, sagæ, præstigiatores se tanquam a dæmone obsessos ostendant, varia phænomena leges naturales excedentia præstare, exhibere volunt.

MANIA. (349)

Est delirium apyretum circa quævis objecta, cum furore, audacia, ac rubore; maniaci habent plerique lucida intervalla; subin est mania periodica; unde Lunatici; sanguis maniacorum viscidus, seroque carens, fibræ musculares rigida.

ORDO IV. VESANIÆ anomalæ.

Morbi prioribus affines.

AMNESIA. (350)

Est memoriæ imminutio aut plenaria abolitio.

AGRYPNIA. (351)

Pervigilium immodicum vel continuum, ex quo vires imminuuntur; anxietas, inquietudo, anorexia, cephalalgia, aliaque molesta symptomata, oriuntur.

PARS QUINTA.

TABULÆ NOSOLOGICÆ

AB EXIMIO MEDICO
DAVIDE MACBRIDE
COMPOSITÆ,

EX EJUS OPERE CUI TITULUS,
A METHODICAL INTRODUCTION TO THE THEORY AND PRACTICE
OF PHYSIC.

LONDON—M DCC LXXII.

TABULÆ NOSOLOGICÆ.

ERUDITUS auctor morbos in quatuor classes, in universales, scilicet, locales, sexuales, et infantiles, distribuere voluit; distributionem tamen non nisi per primam classē prosecutus est.

Morbos in hac classe comprehendendos in novem tabulas five ordines disposuit, quos hic recensere volumus.

ORDO I. FEBRES.

FEBRIS continua. (1)

Species 1. Continua simplex.

Varietates sunt *a* Continua simplex plethorica: *b* C. simplex a frigore. *c* C. simplex a calore. *d* C. simplex a dolore. *e* C. simplex catarrhalis.

Species 2. Continua inflammatoria.

Var. *a* Continua inflammatoria cephalalgica. *b* C. inflammatoria soporosa. *c* C. inflammatoria pleuritica. *d* C. inflammatoria rheumatica. *e* C. inflammatoria dysenterica.

Species 3. Continua nervosa.

Var. *a* Continua nervosa communis seu febricula. *b* C. hydrocephalica.

Species 4. Continua putrida.

Var. *a* Continua putrida carceraria. *b* C. putrida maligna Hungarica. *c* C. putrida maligna Ægyptiorum. *d* C. putrida icteriodes Carolinensis. *e* C. putrida icteriodes Canadensis.

Species

FEBRIS continua. (1)

Species 5. Continua mista.

Var. *a* Continua mista depuratoria. *b* C. mista sudatoria.
c C. mista comatosa. *d* C. mista variolosa. *e* C. mista
 hyemalis. *f* C. mista verminosa.

FEBRIS intermittens. (2)

Species 1. Quotidiana.

Var. *a* Quotidiana simplex. *b* Q. duplicata. *c* Q. hyste-
 rica. *d* Q. cephalalgica.

Species 2. Tertiania.

Var. *a* Tertiania legitima. *b* T. spuria. *c* T. pleuritica.
d T. asthmatica. *e* T. carotica. *f* T. cardialgica.
g T. duplex. *h* T. duplicata. *i* T. urticata. *k* T. he-
 miplegica. *l* T. rheumatica.

Species 3. Quartana.

Var. *a* Quartana legitima. *b* Q. splenetica. *c* Q. hepa-
 tica. *d* Q. metastatica.

Species 4. Erratica.

Var. Quintana, sextana, &c.

FEBRIS remittens. (3)

Species 1. Remittens inflammatoria.

Var. *a* Remittens inflammatoria catarrhalis. *b* R. inflam-
 matoria peripneumonica. *c* R. inflammatoria ardens.

Species 2. Remittens putrida.

Var. *a* Remittens putrida biliosa. *b* R. putrida anginosa
 maligna. *c* R. putrida paludosa.

FEBRIS exanthematica. (4)

Species 1. Variola.

Var. 1. Variola simplex. *a* V. simplex discreta. *b* V. sim-
 plex confluens. *c* V. simplex chrySTALLINA. *d* V. sim-
 plex verrucosa.—2. Variola complicata. *a* V. compli-
 cata inflammatoria. *b* V. complicata chrySTALLINA.
c V. complicata nigra seu sanguinea. *d* V. complicata
 dysenterica.

Species 2. Morbilli.

Var. *a* Morbilli regulares. *b* M. anomali. *c* M. variolosi.

Species 3. Scarlatina.

Var. *a* Scarlatina benigna. *b* S. maligna.

Species 4. Erysipelas.

Species

FEBRIS exanthematica. (4)

Species 5. Miliaria.

Var. *a* Miliaria simplex. *b* M. catarrhalis. *c* M. inflammatoria. *d* M. ferofa. *e* M. putrida seu petechialis.

Species 6. Aphtha.

Species 7. Pemphigus.

Species 8. Pestis.

HECTICA. (5)

Species 1. Phthisis.

Var. *a* Phthisis ficca. *b* P. mucosa. *c* P. hæmoptoica. *d* P. scrofulosa. *e* P. scorbutica. *f* P. asthmatica. *g* P. syphilitica. *h* P. arthritica. *i* P. hypochondriaca. *k* P. chlorotica.

Species 2. Tabes.

Var. *a* Tabes hepatica. *b* T. mesenterica. *c* T. dorsalis. *d* T. scrofulosa. *e* T. scorbutica. *f* T. asthmatica. *g* T. syphilitica. *h* T. arthritica. *i* T. hypochondriaca. *k* T. chlorotica.

ORDO II. INFLAMMATIONES.

INFLAMMATIO externa. (6)

Species 1. Phlegmone.

Species 2. Erysipelas.

Species 3. Furunculus.

Species 4. Anthrax.

Species 5. Ophthalmia.

Species 6. Cynanche.

Var. *a* Cynanche tonsillaris. *b* C. trachealis. *c* C. suffocatio stridula, Croup. *d* C. maxillaris.

INFLAMMATIO interna. (7)

Species 1. Phrenitis.

Species 2. Otitis.

Species 3. Carditis.

Species 4. Pleuritis.

Var. *a* Pleuritis simplex. *b* P. complicata.

Species 5. Peripneumonia.

Var. *a* Peripneumonia simplex. *b* P. complicata.

Species

INFLAMMATIO interna. (7)

Species 6. Paraphrenitis.

Species 7. Hepatitis.

Species 8. Splenitis.

Species 9. Epiploitis.

Species 10. Gastritis.

Var. *a* Gastritis exanthematica. *b* G. a veneno. *c* G. traumatica.

Species 11. Enteritis.

Var. *a* Enteritis dysenterica. *b* E. herniosa. *c* E. a veneno.

Species 12. Mesenteritis.

Species 13. Nephritis.

Species 14. Cystitis.

ORDO III. FLUXUS.

ALVIFLUXUS. (8)

Species 1. Cholera.

Var. *a* Cholera spontanea. *b* C. verminosa. *c* C. arthritica.

Species 2. Dysenteria.

Var. *a* Dysenteria putrida. *b* D. inflammatoria.

Species 3. Diarrhœa.

Var. *a* Diarrhœa stercorosa. *b* D. biliosa. *c* D. ferosa.
d D. verminosa.

Species 4. Lienteria.

Species 5. Cæliaca.

Species 6. Hepatirrhœa.

Species 7. Melæna.

HÆMORRHAGIA. (9)

Species 1. Epistaxis.

Var. *a* Epistaxis critica. *b* E. activa. *c* E. passiva.

Species 2. Hæmoptysis.

Var. *a* Hæmoptysis accidentalis. *b* H. habitualis. *c* H. periodica. *d* H. traumatica.

Species 3. Hæmatemesis.

Species 4. Hæmaturia.

Species 5. Hæmorrhœis.

FLUXUS humoralis. (10)

Species 1. Ephidrosis.

Species 2. Diabetes.

Var. *a* Diabetes verus. *b* D. hystericus. *c* D. arthriticus. *d* D. febricofus.

ORDO IV. DOLORES.

ARTHRITIS. (11)

Species 1. Arthritis regularis.

Species 2. Arthritis irregularis.

Species 3. Arthritis complicata.

Var. *a* Arthritis rheumatica. *b* A. chlorotica. *c* A. melancholica. *d* A. scorbutica. *e* A. syphilitica. *f* A. asthmatica. *g* A. cardialgica. *h* A. exanthematica. *i* A. rachitica.

RHEUMATISMUS. (12)

Species 1. Rheumatismus acutus.

Species 2. Rheumatismus chronicus.

Var. *a* Rheumatismus dysentericus. *b* R. arthriticus. *c* R. scorbuticus. *d* R. syphiliticus. *e* R. hystericus.

Species 3. Lumbago.

Species 4. Sciatica.

OSTOCOPUS. (13)

Species 1. Ostocopus spina ventosa.

Species 2. Ostocopus cancrifus.

Species 3. Ostocopus syphiliticus.

Species 4. Ostocopus ad osteofarctum.

Species 5. Ostocopus scorbuticus.

DOLOR capitis. (14)

Species 1. Cephalalgia.

Species 2. Cephalæa.

Species 3. Hemicrania.

ODONTALGIA. (15)

Species 1. Odontalgia catarrhalis.

Species 2. Odontalgia cariiosa.

Species 3. Odontalgia scorbutica.

Species 4. Odontalgia arthritica.

Species 5. Odontalgia hystERICA.

OTALGIA.

OTALGIA. (16)

- Species 1. Ootalgia inflammatoria.
- Species 2. Ootalgia purulenta.
- Species 3. Ootalgia verminosa.
- Species 4. Ootalgia ab intrusis.
- Species 5. Ootalgia catarrhalis.

PLEURODYNE. (17)

- Species 1. Pleurodyne plethorica.
- Species 2. Pleurodyne flatulenta.
- Species 3. Pleurodyne a spasmate.
- Species 4. Pleurodyne parapleuritica.
- Species 5. Pleurodyne verminosa.

DOLOR ventriculi. (18)

- Species 1. Pyrosis.
Var. *a* Pyrosis a saburra. *b* P. biliosa. *c* P. ulcerosa.
- Species 2. Cardialgia.
Var. *a* Cardialgia faburralis. *b* C. a veneno. *c* C. sputatoria. *d* C. bradypepta. *e* C. arthritica. *f* C. verminosa.
- Species 3. Gastrodynia.
Var. *a* Gastrodynia ab ingluvie. *b* G. flatulenta. *c* G. biliosa. *d* G. a veneno. *e* G. a xyphoide. *f* G. ab extraneis.

COLICA. (19)

- Species 1. Colica flatulenta.
- Species 2. Colica inflammatoria.
- Species 3. Colica biliosa.
- Species 4. Colica iliaca.
- Species 5. Colica nervosa.

LITHIASIS. (20)

- Species 1. Lithiasis nephritica.
- Species 2. Lithiasis cystica.

ISCHURIA. (21)

- Species 1. Ischuria renalis.
Var. *a* Ischuria renalis ab inflammatione. *b* I. renalis spasmotica. *c* I. renalis mucosa. *d* I. renalis calculosa seu arenosa.

ISCHURIA. (21)

Species 2. Ischuria vesicalis.

Var. *a* Ischuria vesicalis calculosa. *b* I. vesicalis inflammatoria. *c* I. vesicalis spasmodica. *d* I. vesicalis paralytica. *e* I. vesicalis polyurica. *f* I. vesicalis purulenta.

Species 3. Ischuria urethralis.

Var. *a* Ischuria urethralis carunculosa. *b* I. urethralis urethro-lithica. *c* I. urethralis hydrocelodes.

PROCTALGIA. (22)

Species 1. Proctalgia inflammatoria.

Species 2. Proctalgia fistulosa seu purulenta.

Species 3. Proctalgia hæmorrhoidalis.

Species 4. Proctalgia cancrofa.

Species 5. Proctalgia intertriginosa.

ORDO V. SPASMI.

TETANUS. (23)

Species 1. Tetanus episthotonos.

Species 2. Tetanus opisthotonos.

CATOCHUS. (24)

TRISMUS. (25)

Species 1. Trismus spontaneus vel primarius.

Species 2. Trismus secundarius.

HYDROPHOBIA. (26)

Species 1. Hydrophobia spontanea.

Species 2. Hydrophobia secundaria.

CONVULSIO. (27)

Species 1. Convulsio ab inanitione.

Species 2. Convulsio traumatica.

Species 3. Convulsio verminosa.

Species 4. Convulsio plethorica.

EPILEPSIA. (28)

EGLAMPSIA. (29)

HIERANOSUS. (30)

ORDO VI. ADYNAMIÆ.

COMA. (31)

Species 1. Apoplexia.

Var. *a* Apoplexia sanguinea. *b* *A. ferofa.* *A. traumatica.* *d* *A. temulenta.*

Species 2. Carus.

Species 3. Lethargus.

Species 4. Cataleptis.

PARALYSIS. (32)

Species 1. Hemiplegia.

Species 2. Paraplegia.

DELIQUIUM. (33)

Species 1. Leipothymia.

Species 2. Syncope.

Species 3. Asphyxia.

ORDO VII. ANHELATIONES.

DYSPTNOEA. (34)

Species 1. Dyfpnoea pituitofa.

Species 2. Dyfpnoea a tuberculis.

Species 3. Dyfpnoea calculofa.

Species 4. Dyfpnoea phyfconialis.

Species 5. Dyfpnoea fcorbutica.

ORTHOPNOEA. (35)

Species 1. Orthopnoea idiopathica.

Var. *a* Catarrhus fuffocativus. *b* Peripneumonia notha.

Species 2. Orthopnoea fympathica.

Var. *a* Orthopnoea hysterica. *b* O. ftomachica.

ASTHMA. (36)

Species 1. Afthma humidum.

Species 2. Afthma ficcum.

HYDROTHORAX. (37)

EMPYEMA. (38)

ORDO VIII. MENTALES.

Morborum qui sub hoc titulo recenseri possint nullam tabulam hic opposuit clariss. Auctor; et, ob hanc causam, ut videtur, quod dubitat an genera maniae et melancholiae, sub hoc titulo vulgo recensita, revera aliter differant quam idem natura morbus qui sub diversa facie diversis temporibus compareat.

ORDO IX. CACHEXIÆ.

POLYSARCIA. (39)

HYDROPS. (40)

- Species 1. Anasarca.
- Species 2. Hydrocephalus.
- Species 3. Hydrops pectoris.
- Species 4. Ascites.

ICTERUS. (41)

- Species 1. Icterus spasmodicus.
- Species 2. Icterus a pressura.
- Species 3. Icterus calculosus.

EMPHYSEMA. (42)

- Species 1. Emphysema primarium.
- Species 2. Emphysema secundarium a vulneribus thoracis.

TYMPANITES. (43)

PHYSCONIA. (44)

ATROPHIA. (45)

OSTEOSARCOSIS. (46)

SARCOSTOSIS. (47)

MORTIFICATIO. (48)

- Species 1. Sphacelus.
- Species 2. Necrosis.

SCORBUTUS. (49)

SCROFULA. (50)

CANCER. (51)

LUES venerea. (52)

PARS SEXTA.

GENERA MORBORUM
PRÆCIPUA
DEFINITA,

ADDITIS SPECIEBUS
CUM HARUM EX SAUVAGESIO SYNONYMIS,

A
GULIELMO CULLEN.

EDINBURGI—M DCCC II.

PROLEGOMENA:

RES est inter medicos fatis nota, morbos quosdam natura five causa proxima diversos, externa tamen facie, five symptomatis, adeo similes esse, ut alii ab aliis difficillime internoscantur. Cum autem morbi natura diversi remedia diversa, quandoque etiam contraria, postulent, summi est momenti ut medicinam facientes morbum quemque, a quovis alio, certo dignoscant.

Dum medici vero, in ipso artis usu versati, de morbis distinguendis sæpe incerti sint, merito queruntur, in scriptis de re medica, non semper inveniri quæ hanc ambiguitatem solvere valeant. Sæpe quidem observatum est, descriptiones, five historias, quas vocant, morborum, in scriptis medicorum reperiundas, plerumque mancās et imperfectas esse; et nemo est, ut opinor, qui non facile agnoscat, historias morborum pleniores, magis exactas, et characteribus melius distinctas, quam quas adhuc habuimus, desideratas esse.

Putarunt quidem multi, medicos veteres Græcos et Romanos, in observandis et notandis morborum phænomenis, diligentes et solertes fuisse, atque in horum scriptis historias morborum complures quæ nobis utiles esse possint exstare. Mihi vero videtur vel ineptam et superstitiosam antiquitatis venerationem, vel quandam eruditionis ostentationem, scriptis medicorum veterum in hac re æstimationem nimiam conciliasse. Minime quidem dissimulandum, in scriptis illis quædam quæ morborum characteres vere delineant subinde reperiri. Quæ autem ejusmodi ibi occurrunt, quantumcunque a recentioribus æstimata, parum profecto nos docuissent, et attentionem nostram penitus fortassis effugissent, nisi res eadem nobis ex propria observatione prius innotuissent. Revera, neoterici libros veterum raro, ad primam rerum notitiam comparandam, evolvunt, sed plerumque, ut propria tantum inventa et observationes horum auctoritate suffulciant, perscrutantur. Mihi quidem persuasum est, vel historias morborum plerasque, quæ in scriptis veterum jam inveniuntur, ad morbos regionis a nostra plurimum diversæ pertinere, ideoque nobis parum utiles esse; vel scripta eorum adeo mutilata et corrupta ad nos pervenisse, ut ad usus nostros parum conferre queant. Fatendum saltem, notitiam morborum ex scriptis veterum hauriendam multo minorem esse, quam qua opus est ad illam, de qua diximus, ambiguitatem eximendam.

Nec nisi fero admodum et lente ad hanc rem expediendam progressi sunt recentiores. Seculo enim decimo sexto, Galeni sequaces, in instauranda veterum doctrina, tanta cum laude versati, in horum scriptis explicandis et illustrandis fere solum occupati; parum omnino ad emendandam vel amplificandam morborum historiam contulerunt.

Nec ejusdem ævi medici chemici, Galenicorum adversarii acerrimi, in illa re plus fecerunt. Medicamentis enim inveniendis, et promiscue adhibendis, solum intenti, a morborum studio hominum animos prorsus avertabant.

Hinc quidem factum est, quod ab instauratis literis seculo decimo quinto, usque ad tempora Sydenhami, nullæ fere morborum historiæ plenæ vel accuratæ conscriptæ sint. Sydenhamus vero, sagacitate et judicio quibus maxime pollebat, majorem in notandis et describendis morborum phænomenis diligentiam adhibendam esse protinus sensit. et in hunc finem ad sedulam observationem se accinxit, qua plures tandem et meliores, quam antea quisquam, morborum descriptiones protulit.

Ad hujus exemplum, et ad normam methodi, per observationes et experimenta, philosophandi, tunc temporis invalescentis, evenit, ut ab eo tempore plures medici, in historiis morborum augendis et accuratius reddendis, operam collocaverint.

A tempore igitur Sydenhami in hac re multum laboris nec frustra impensum est; rem tamen minime adhuc absolutam esse censeo. Multa parum accurata, multa erronea, multa denique prorsus falsa, historiis morborum, quas jam habemus, inesse, novit quisque in his aliquantulum versatus; et novit etiam ex variis causis hæc vitia subrepisse. Scriptores enim, alii ad theorias sibi placentes stabiliendas, alii ad fidem remediis ab ipsis sive inventis sive multum laudatis conciliandam; vel veritatem, præconceptis occæcati, non percipiebant, vel etiam fictis et falsis corrumpebant. Plures, re omni quovis modo mirabili capti, quod ipsi facile crediderunt, alios credere cupientes, rem omnem præter modum amplificaverunt. Plures denique, ut observationibus, hodie adeo expetitis, famam sibi compararent, historias in museo fictas, pro veris tradiderunt. Hæc omnia, si specialius indigitarem, de imperfecta hæcenus morborum historia satis clare constaret; sed hæc omnia impræsentiarum prætermitto, et unum solummodo, in historiis morborum conscribendis, vitium, ad rem nostram maxime pertinens, indicatum volo.

Multi optimæ etiam fidei medici, in morbis observandis
diligenter.

diligenter versati, in historiis eorum conscribendis saepe nimium fecerunt. Non solum enim symptomata morbi cujuscvis semper praesentia et inseparabilia, sed plura etiam, et cuncta quidem quovis tempore morbum comitantia, recensuerunt. Ita symptomata rarius, nec necessario cum morbo conjuncta, et plura omnino adventitia et fortuita, notarunt; dum simul illa inusitata et fortuita ab usitatoribus et inseparabilibus distinguere penitus neglexerunt. Hinc, historiam morborum plenissimam reddere conantes, quae ad distinctionem cujusque ab alio quovis conferre possent, omiserunt, immo difficiliorem reddiderunt.

De hacce in historiis morborum redundantia saepe conquesti medicinam facientes, pathognomonica quae dicuntur desiderarunt; hoc est, ut notentur symptomata illa pauca, quae cuique morbo adeo propria sunt, ut ab illis solis quisque morbus ab alio quovis illico et certo dignoscatur. Hujusmodi autem pathognomonica in scriptis medicis nondum data, neque unicuique morbo assignata sunt; nec quantum video nisi per Nosologiam methodicam, rite institutam, assignari queunt.

Dudum quidem Sydenhamus et solers Baglivius, quo facilius et certius morbi distinguerentur, morbo omnes, per normam methodi botanicae, ad genera et species, appositis characteribus idoneis, referri voluerunt: Id est, ut institueretur Nosologia methodica. Hoc etiam consilium alii summae famae medici comprobarunt, et quisque, ni fallor, in artis usu occupatus, factum fuisse vehementer optaret. Nihil tamen hujusmodi protinus tentatum fuit; an quidem ex fructu inde capiendo parum perspecto, an vero ex difficultate operis praevisa, non constat; sed revera nihil omnino tentatum fuit, donec celeberrimus Franciscus Boissier de Sauvages, circa annum 1732, rem aggressus sit.

Quæ quidem, exeunte seculo decimo sexto, Felix Platerus in morbis secundum symptomata ordinandis conatus est quodammodo huc referri possunt; conatus autem isti inconditi adeo et imperfecti erant, ut quenquam eosdem profecuturum esse vix expectandum fuit; et revera ante Sauvagesium nemo, quantum novimus, ulla ex parte profecutus est. Haud dissimulandum quidem, Platerum Sauvagesio quaedam suggessisse; pauca tamen, nec fausta admodum, et quae nemini usui fuissent, nisi Sauvagesius, cum meliore spe, opus multo longius provexisset.

Ipse quidem Sauvagesius primum lente et titubanter progrediebatur; et, re iterum atque iterum tentata, non nisi post
multam

multam lectionem, et assiduam per triginta annos meditationem, Nosologiam methodicam suam, anno 1762 editam, protulit.

Interea, duo alia, in Nosologia methodica, tentamina facta sunt; alterum a celeberrimo viro, et in distributione rerum methodica plurimum exercitato. Carolo a Linne; alterum ab erudito Professore Gottingensi, Rudolpho Augusto Vogel. A neutro tamen, utpote vestigiis Sauvagesii presse nimis insistente, opus multum promotum fuisse videtur.

Cum de utilitate hujusmodi tentaminum, jamdudum mihi persuasum sit, simulac ad medicinæ praxin docendam in hac alma Academia admotus fui, mei officii esse putavi alumnos nostros ad Nosologiæ methodicæ studium allicere; et quo facilius hoc efficerem, libellos quotquot ad id conferre possent, hic edendos, et in discipulorum manus tradendos, curavi.

Ex opere Sauvagesii, aliis rebus non admodum utilibus referto, ea tantum quæ ad genera et species morborum distinguendas pertinerent excerpti, et cum his Linnæi et Vogelii libellos integros conjunctos edidi.

Auctores hi aliquid laudis sine dubio merentur; quanquam enim eorum opera, rem ex toto confecisse minime videantur, nec multum utilitatis tyronibus inexpertis afferre queant; in arte tamen versatis, et in dignoscendis morbis aliquatenus exercitatis, nonnihil commodi exinde oriri possit.

Difficile quidem erit, hanc rem protinus perfectam reddere, nec, ut opinor, nisi tentaminibus repetitis fieri potest. Non solum igitur mihi licitum, sed mei muneris esse, opus hoc Nosologicum, quantum possem, promovere arbitratus sum; eoque consilio methodum quodammodo novam tentavi, et una cum supra dictis edidi. Hanc, etsi nequaquam omnibus numeris absolutam, prioribus tamen in quibusdam magis accuratam inventam fore spero.

Qui ante nos huic studio operam dederunt, minus consulto, ut mihi videtur, rem aggressi sunt; morborum enim species parum perspectas habentes, ad suprema classium et ordinum genera constituenda illico se accinxerunt. A natura vero, species solum datae sunt; et generum constitutio est mentis humanæ excogitatio, quæ, donec species omnes bene notæ et perspectæ fuerint, fallax et incerta erit; et in generibus quidem constituendis, nisi ad species semper respiciamus, labor noster vanus et inutilis evadit.

Constitutio generum superiorum, in quovis rerum systemate, neutiquam adhuc absoluta est. Classes enim vel etiam ordines, omnino naturales, vel in systemate vegetabili, vel in animali,

animali, nondum ubique constitutæ sunt. De fossilibus methodus etiam difficilior, et de morbis fortassis omnium difficillima erit. Videamus igitur quomodo hanc rem quam optime tractare possimus.

Cum res distinguendæ, numero quam plurimæ sint, tum ad investigationem, tum ad reminiscentiam, utilissimum et necessarium esse videtur, ut ad genera quædam suprema referantur; cum vero species rerum non admodum numerosæ sint, et quarum sigillatim recensitatum reminisci, memoriæ in plerisque hominibus vires non excedat, eas summa sollicitudine, ad classes et ordines referre vix opus esse videtur.

Ita Illustris De Buffon quadrupedia, quorum species numero paucae sunt, ad classes et ordines referre haud necessarium esse censuit, et quæ in hunc finem alii tentarunt, frivola esse, et ad denominationem studiosos plurimum turbantem duxisse, putavit.

Illustri tamen et egregio viro prorsus assentire nequeo. Etiam si enim institutio classium et ordinum morborum, neque pro investigatione eorum satis perfecta reddi queat, neque pro numero valde necessaria sit; quodammodo tamen tentandam, et ad majorem accurationem diligenter perducendam esse, puto.

Enimvero, si ab illusione quæ ex characteribus classium et ordinum oriri queat, cavemus, et ni fallor, cavere plerumque licet, etiam classium et ordinum institutionem, in multis ad plenioram et magis exactam specierum distinctionem conferre posse contendo. Etsi enim ejusmodi institutionem, ubique certam et accuratam semper assequi haud liceat, ipsos tamen conatus ad illam assequendam magnopere ex re fore putarem, quippe qui ad disquisitiones utiles, tum in pathologia, tum in morborum historia, sæpe obvenientes, subinde ducant. Certe, cum de natura morborum disquirere velimus, distinguendi sunt, tum per symptomata cuique propria, tum per illa cum aliis quibusdam communia, quod nihil aliud est, quam morbos, uti alia quæcunque in rerum natura distingui debent, per genera et species distinguere, et hujusmodi distinctio generum, tum supremorum tum proximorum, notationem necessario exigit.

Quantaunque tamen ex instituendis morborum classibus et ordinibus utilitas provenire possit, certe fatendum est, Nosologos, huic rei præcipue intentos, successus optatos nondum obtinuisse; et ex hujus studii adeo imperfecti conspectu, ni fallor, accidit, quod totam rem Nosologicam alii despexerint, alii vero impossibilem judicaverint.

Qui

Qui impossibile putant, certe falluntur. Distinctionem morborum aliquando difficilem esse, fatentur omnes; possibilem autem in plerisque esse, fateri etiam oportet; nam, si quis hoc negaverit, idem fecerit, ac si nullam esse artem medicam dixisset. Si revera tamen medici morbos a se invicem dignoscere possint, certe quibus indiciis id faciant, etiam dicere queunt. Hæc autem indicia nulla alia esse possunt, quam quæ morbum quemque per genus et speciem definiant, quæ rursus per methodum Nosologicam, rite institutam, solummodo exponi queant.

Distinctionem itaque morborum, hætenus sæpe dubiam, per Nosologiam methodicam magis certam fieri posse, affirmare nullus dubito. Porro observandum, quoties hujusmodi distinctionem morborum exponere conati fuerimus, id commodi oriturum, quod hujus distinctionis vel defectus, vel errores, facillime percipientur, et cum percepti, vel ad observationes jam factas accuratius considerandas, vel ad observationes postea diligentius faciendas, ducent; quin et plurimum valebunt, tum ad Nosologiam methodicam, tum ad distinctionem morborum, tandem perfectiorem reddendam.

Quamvis morborum characteres hætenus propositi sæpe deficientes sunt; tentamina tamen omnia jam facta exhibere cupiens, in tertia Synopsis editione ex systemate symptomatico Cl. Michaelis Sagar, quæ ad genera morborum definienda pertineant, excipui, et in hac quarta editione, Ingeniosi Davidis Macbride, Tabulas Nosologicas addidi, et cæteris supra memoratis subjunxi. Hæc autem tentamina omnia simul edita sunt, ut juxta posita facilius conferri possint, et ut collata vel optimos et maxime idoneos characteres indicent, vel ad erroneos corrigendos, et ad distinctiones magis exactas obtinendas, lectores ducant.

Hujusmodi studium plurimis medicis necessarium fore facile credo; nam morborum titulis inhærentes, notiones parum accuratas et determinatas habent; et, quantum video, ad magis exactas, nisi nosologiæ methodicæ studio, duci vix possunt.

Ex iis quæ jam diximus, tum utilitatem tum necessitatem Nosologiæ Methodicæ manifestam fore spero; et simul patebit, quare antehac, et nunc etiam, eandem colere allaboravi. Proximum est, ut in hisce prolegomenis, quas in hoc studio regulas ipse observavi, et ab aliis observandas vellem, nunc exponam.

Prima et præcipua nostra cura fuit, ut morborum species in ipsis ægris præsentibus detegerentur et dignoscerentur. Cum vero species nisi simul genus indicaretur, vix recte definire

possint; et cum genera plurima a Nosologis indicata unius tantum speciei sint, inde factum est, quod nostri etiam labores, in generibus præsertim distinguendis, impensi videantur. Ad species tamen semper respeximus; et ad eas dignoscendas, characteres generum a nobis datos ubique utiles speramus.

In generibus morborum recensendis, pauciora, quam in aliis systematibus dicta sunt, recensui; quod si recte feci, id studiosis multitudine rerum contemplanda facile turbatis imprimis commodum esse puto. Etiam si enim numerum generum minuens aliquando erraverim, id tamen tuto tentatum fuisse censeo; cum enim discipuli nostri genera facile et satis certo distinguenda recte perspexerint, illos genera forte omissa facile postea agnituros esse, credo.

Genera morborum vero apud nos, quam apud alios Nosologos, necessario pauciora sunt; quia plura, pro diversis ab aliis habita et recensita, a nobis, utpote nulla, quantum nobis videtur, re diversa, sub uno titulo comprehensa sunt; et hujus rationes postea locis idoneis tradendæ venient. Interea notandum, plura genera, quæ primo intuitu omissa videantur, nequaquam ex oculis studiosorum sublata esse, cum generis illius, ad quod pertinere nobis videntur, uti synonyma recensantur, et locum suum in indice adhuc retineant.

Deinde, genera morborum a nobis, quam ab aliis enumerata et definita, pauciora sunt; quia nulla, nisi idiopathica et primaria notanda esse duximus; dum plura ab aliis memorata, sympathica tantum sunt, sive symptomata nusquam per se existentia; et nequiquam igitur pro morbis primariis agnoscenda. Ita Carphologia, Pandiculatio, Rigor, Sternutatio, Oscedo, Singultus, Stertor, Anxietas, Lassitudo, Stupor, Pruritus, Algor, et Ardor, a Sauvagesio, et alia ab aliis, pro generibus recensita, a nobis penitus omittuntur; et recte, ni fallor, nisi quot symptomata, totidem genera morborum, ponere velimus.

Denique, genera morborum apud nos pauciora sunt; quia, ex classibus Vitiorum et Deformatum, plura a nobis omittuntur; vel quod morbi adeo leves sint, ut medicorum attentionem et curam non mereantur; vel quod congeniti et immutabiles medicorum artem penitus eludant. Ita Lentigo, Leuce, Cyasma, Seline, et Cicatrix, ex classe Vitiorum; et Phoxos, Gibber, Rhyssmata, Canities, Colomba, Nævus, Monstrositas, Rhicnosis, Varus, Valgus, Leoipides, Saniodes, Crisporchis, Hermaphroditus, Dionysiscus, Galiancon, Galbulus, et alia ex classe Deformatum apud Vogelium recensita, recte a nobis,

omissa.

omissa putamus. Ejusmodi Vitia et Deformitates, fortassis in pathologia, sive historia generali, mutationum quas, quavis occasione, subit corpus humanum notari possent; Nosologiam autem methodicam iis adeo frivolis onerare, vel eandem tam multis novis et inutilibus appellationibus turbare, minime idoneum videtur. Judicet itaque lector, quam merito gloria-tur Cl. Sagar, se generum numerum auxisse.

Quod, modo memorata omiserim, venia forsitan mihi facile dabitur. Sunt autem alii morbi, memoratu quidem digni, quos omissos non adeo facile condonabit studiosus. Hujusmodi omis-siones agnosco, et quidem doleo; sed variæ rationes, ut quidam morbi hic omitterentur, effecerunt. Primo, fieri potest, ut quidam observationem nostram penitus effugerint; dein, sunt alii satis noti, quibus, in nostro systemate, locus idoneus nus-quam inventus est; denique, sunt alii quorum historia apud medicos adeo fit imperfecta, ut nec locus nec character idoneus iis assignari queat. Ne tamen ejusmodi genera penitus omit-terentur, ad calcem operis, omissorum, quotquot noverim, ca-talogum subjunxi, ut posteri perspicaciores, ea diligentius per-pendentes, characteres et locum iis assignent.

Eodem consilio, ne scilicet tyronibus contemplanda præter necessitatem multiplicarentur, non genera solum, sed species morborum etiam ad minorem numerum redegi. Hoc magis periculosum videri potest, cum nullam speciem, quæ revera existat, recte omittere liceat. Ne quidem ad recensionem spe-cierum ipse accederem, difficultas operis me dubium, et timi-dum antehac diu cohibuit; et id tantum tentare ausus sum, ut species, a Sauvagesio recensitas, serie paulo luculentiore et emendatiore traderem: Re autem amplius, et curatius per-pensa, species jam recensurus, numerum eorum, apud Sauva-gesium recensitarum, multum minuendum esse, arbitratus sum.

Solus quidem Sauvagesius, nam Sagarum nihil moror, in re-censione specierum quicquid præstitit; et licet egregius vir, plurimis observationibus undique collectis, multum de re me-dica meritis sit; haud tamen dissimulandum, illum in multis graviter errasse, dum species revera easdem, sub diversa ap-pellatione repetitas, pro diversis ponebat; et præsertim dum species sympathicas, tam sæpe idiopathicis immiscebat, qua ratione earum numerum totum præter modum auxit. Hos ut tollerem errores, quod potui feci, numerosis nempe apud Sauvagesium speciebus, recte, quantum ego judico, ad pauci-ores reductis.

Quod ut efficerem, primo species plures, ut diversas a Sau-vagesio

vagesio recensitas, pro una eademque habui, et sub uno titulo posui; atque hujus rei rationes locis suis idoneis posthac tradendæ sunt.

Deinde, cum species idiopathicas solum pro veris et genuinis enumerare velim, quotquot pro symptomaticis habere potui, totidem ex numero specierum apud Sauvagesium sustuli. Cum autem, in recensione specierum symptomaticarum aliquis usus sit, earum recensionem, seorsum tamen, denuo apposui.

Denique, alia et præcipua ratio, qua specierum, a Sauvagesio recensitarum, numerum minuendum esse censui, ea est, qua plures ab eo pro diversis positas, pro specierum varietatibus, tantum habui et enumeravi.

Hoc autem est, quod in Nosologia Methodica maxime difficile videtur, dicere nimirum, quid pro ipsa specie morbi, quid pro ejusdem speciei varietate, tantum habendum sit. Cum autem criteria illa, quæ in Zoologia et Phytologia, ad species a varietatibus certius distinguendas adhiberi possint, in Nosologia Methodica nequaquam invenienda sint; varietates morborum a speciebus distinguere ubique difficilior erit. Quamobrem varietates plures recensere, tutissimum et fere necessarium esse duxi. Ejusmodi vero distinctionem, in artis usu utilissimam fore ratus, illam adhiberi ubique annisus sum; quod si non in omnibus, cum æque certa cognitione, cum aliqua saltem verisimilitudine, diligenter quæ sequuntur pensitatis, sæpe fecisse videor.

Cum morbus aliquis, quo plures homines laborant, symptomata cujusdam speciei characteristica omnia et solo, in unoquoque ostendit; quantumvis hæc in alio minus, in alio magis vehementia sint, hoc speciem diversam exhibere non putamus; et, in universum, morbos gradu solum differentes, non nisi ejusdem speciei varietates præbere censemus.

Tunc igitur de varietate a specie distinguenda quæstioni tantum locus est, cum in diversorum hominum morbis, vel ex solitis cujusvis speciei symptomatis, quædam absint, vel iisdem quædam addita sint.

Cum ex symptomatis solitis quædam absint, quoties inter symptomata, quæ magis, et ea quæ minus, essentialia sunt distinguere liceat, ex horum absentia non nisi varietatem adesse concludimus.

Cum vero symptomatis characteristicis alia quædam addita sint, si addita pro symptomatis symptomatum, potius quam pro symptomatis causæ haberi queant, varietatem tantum constituunt.

Denuo, cum symptomata addita, in specie data, prorsus insolita

solita sint, et simul conditiones morbi præcipuas parum vel nihil mutari videantur, hæc quoque varietatem tantum præbere censenda.

Cum morbi genus quoddam, ex principiis diversis oriri queat, idem, ex diversitate principii, specie diversum evadere potest, nec semper tamen; nam, quotiescunque diversitas illa parva fuerit, et simul symptomata parum ab ea fuerint mutata, hoc etiam non nisi varietatem exhibere, putamus.

Morbi genus itidem, pro diversa ejus sede, diversæ speciei fieri potest; quotiescunque vero sedes diversa, neque partis structuræ, neque functionis ratione differat, hujusmodi sedis diversitas etiam pro varietate tantum habenda est.

Porro, cum de morbis invicem distinguendis hic agatur, observari vellem, res duas esse, quæ ad similitudinem et affinitatem morborum, in diversis hominibus indicandam, plurimum facere possint.

Altera est, quod principii quædam similitudo, morborum inde in diversis hominibus genitorum similitudinem arguit; ita, quando morbi diversorum hominum, ex uno eodemque principio oriuntur; quando, etiam principium illud, ad morbum gignendum, in unoquoque necessarium sit; denique, quando idem principium, ubique fere ejusdem qualitatis et vis esse videatur, tum demum morbos, ex ejusmodi principio genitos, ejusdem vel simillimæ naturæ esse, judicare licet.

Hoc de morbis contagiosis plerisque valere mihi videtur. Ex his enim sunt, qui in pluribus hominibus ab eadem specifica contagione oriuntur; nec, in eorum aliquo morbus, nisi ab illa contagione applicata, oriri unquam observatur; et simul illius contagionis vires et qualitates, ubique fere, eadem esse videntur. Quod ad proxime dictum spectat, id quibusdam dubium videri potest; sed, cum ejusdem contagionis effectus, per secula plura jam observati, semper et ubique admodum similes sint, eam qualitate et viribus eandem esse, merito concludimus; et, ob hoc præsertim, quod effectus isti, quatenus diversi videantur, plerumque hominis infecti conditioni cuidam, potius quam contagioni, qualitate vel viribus diversæ, tribui possunt.

Morbos, itaque, eadem contagione specifica ortos, simillimæ naturæ esse credendum; ejusmodi morbos etiam vix, nisi unicam ejusdem generis speciem, præbere; immo, earum diversitatem quandam aliquando observatam, non nisi ejusdem speciei varietatem indicare, suspicandum est.

Hæc omnia, non solum de exanthematis contagiosis, sed etiam de plerisque febribus epidemicis, dicta velim. Hanc autem

autem opinionem, de similitudine febrium epidemicarum præferens, a gravis auctoritatis viro Sydenhamo, hujusmodi febres specierum plurium esse statuyente, dissentire cogor. Recte quidem, an secus, multum dubito; et posteris litem dirimendam relinquo, hoc simul præmonito, plurimum medicinam facientibus inter futurum, de alterutrius sententiæ veritate sibi satisfacere, vel potius quas limites utrique sint ponendæ, statuere.

Altera res, quæ similitudinem morborum, in diversis hominibus, ostendere possit, est similitudo remediorum quibus sanantur. Similitudo quidem morborum in similitudine causæ eorum proximæ, qualiscunque sit, revera consistit; cum remedia vero morbis medeantur, tantum quatenus causas eorum proximas tollant, morbos, qui iisdem omnino remediis sanantur, ejusdem naturæ esse oportet.

Hujusmodi ratio cinatio, tum ad phlegmasiarum missione sanguinis, tum ad febrium intermittentium cortice Peruviano sanatarum, similem naturam indicandam, plurimum certe facere potest. Hanc autem doctrinam, utcunque in praxi medica, aliquando utilem, fallacem tamen, neque in praxi, neque in Nosologia methodica, nisi caute admodum, adhibendam esse cenfeo. Apud vulgus medentium quidem, remedia eadem quibusque fere ejusdem generis, speciebus, et harum varietatibus adhiberi, et hinc genera plura nullo modo specie differre, videntur. Sed peritiores norunt, morbos, aliquo modo diversos, rarius quam putatur, ab iisdem prorsus remediis sanari: Bene etiam norunt, ex promiscua remediorum adhibitione fieri, quod eadem remedia adeo sæpe frustranea, sanationes saltem minus perfectæ sint. Porro, norunt expertissimi, ad recte medendum, omnino opus esse, ut remedia, non solum generi sed speciei cuique, et sæpe etiam varietatibus quibusdam, apprimè sint accommodata.

Ad artem medicam breviorē, et exinde faciliorem, reddendam, species morborum quascunque, a varietatibus suis distinguendas esse, arbitratus sum. Hanc tamen distinctionem in pluribus quodammodo incertam esse fateor, et, in Nosologia methodica, tutissimum fore puto, varietates morborum plerisque notare et recensere. Hoc itaque præstare ubique annisum, aliis sapientioribus, qui posthac huic operi se immiscere velint, relinquens, discriminationem magis certam statuere.

Exposita jam qua ratione morborum, tum generum, tum specierum, numerum minuere laboravi; superest, ut quo modo eorum, quæ admisi, characteres constituendi sunt, nunc exponam.

Imprimis igitur, notas externas, sensibus nostris facile obvias, ubique selegi; neglectis, vel potius rejectis, de statu corporis interno conjecturis quibuscunque. Porro, ex notis quæ sensibus sunt obviæ, illas medici potius quam ægri sensibus percipiendas, semper prætuli; quum tamen has, utcunque fallaces, penitus negligere vel omittere non liceat.

Secundo, ea symptomata pro notis characteristicis præcipue seligenda putavi, quæ perpetuo cum morbo præsentia sunt, et hoc quidem semper annitendum esse puto. Cum vero plurimi morbi sub eorum decursu, aliam atque aliam omnino formam capiant, in his, ex serie rerum, et symptomatum sibi invicem succedentium, character sæpe necessario petendus est.

In hac re autem tractanda, duplex quæstio exoritur. Prima est, An ex morbi principio characteris partem desumere liceat?

Ad hanc responderi possit, quod, etiamsi de principiis morborum apud medicos iudicium sæpe fallax, et prorsus falsum sit, nec temere idcirco ad morbos distinguendos adhibendum; cum eadem tamen aliquando satis certe nota sint, et facile observanda, huiusmodi principia in Nosologia, pro notis characteristicis recte adhiberi posse censeo.

Altera quæstio hic exoriens est, quatenus ex serie symptomatum, sub decursu morbi occurrentium, characterem ejus petere liceat? Ad hanc etiam possit responderi, quod, cum plures morbi, uti exanthemata et febres intermittentes, nisi post decursum aliquot dierum, ex serie symptomatum sibi invicem succedentium, nullo modo dignosci queant; ut huiusmodi morbi distinguantur, ex serie illa character necessario sumendus est. Characteres autem, non nisi post longum morbi decursum, fortassis non nisi post morbum finitum, statuendi, nequaquam in Nosologia usurpari debent. Ita apud Ill. Linnaeum Febrium Continentium, quas vocat, characteres a diuturnitate totius morbi desumpti prorsus inepti sunt.

In constituendis morborum characteribus, regula tertia est, quod, cum quisque fere morbus, ex plurium symptomatum concursu solum dignoscatur, ex iis pro notis characteristicis quot sufficiant; nec plura tamen adhibenda sunt. Priores Nosologi mihi videntur, in characteribus quos dederint, plerumque nimis breves et deficientes fuisse; et forsan mihi vitio verti potest, quod aliquando sim in iisdem nimis longus et redundans. Nusquam quidem nolens fui redundans; ut vero essem copiosus ubique me conatum fateor, prudentissimum fore ratus etiam ad redundantiam appropinquare, quippe po-

steris

steris multo facilius erit, quod nimium est tollere, quam quod deficiat supplere.

In characteribus denique morborum constituendis, quæritur etiam, an ex defectu functionis cujuslibet, quæ in sano unoquoque exercetur, vel ex absentia symptomatum, in aliis generibus vel speciebus apparentium, notas quasdam desumere liceat? Sauvagesius quidem defectus functionum, utpote nihil positivum indicantes, pro morbis noluit admittere; plures igitur, qui a Linnæo sub ordine Constrictiorum, et a Vogelio sub classe Epischesium, recensentur, penitus omisit.

Sed, pace tanti viri, dixerim, quanquam defectus, si strictius loqui velimus, nihil positivum indicet; defectum tamen functionis, quam exercet quisque sanus, statum corporis humani exhiberi, quem ut distinguamus utilissimum est, atque etiam necessarium, et ejusmodi status pro morbo recte haberi potest. Porro, etiamsi in quibusdam defectus isti aliquando sine molestia vel morbi symptomate observentur; in plerisque tamen magnam molestiam, et symptomata plurima pariunt. In his igitur, defectum functionum, sæpe symptomatum causam manifestam, pro morbo haberi licet, et ex ejusmodi defectu, in plurimis morbis horum notas characteristicas petere licet, et oportet. Sauvagesius ipse in hac re parum sibi constare videtur, Debilitatum classem instituens, et Amnesiam, Agrypniam, Ischuriam, et alia etiam tanquam genera recensens.

Quod notas ex absentia symptomatum, in aliis congeneribus apparentium, spectat; eas nequaquam bonas, et, ubicunque fieri potest, evitandas censeo. In pluribus vero vitari, quantum video, non possunt; nec a quovis Nosologo adhuc fuerunt vitatæ.

Cum, secundum has regulas, characteres morborum constituendi sint, plurimum refert, eisdem sermone accurato et luculento exprimere; nec minus, morbum quemque apto nomine insignire.

Norunt eruditi, Ill. Linnæum methodum plantarum perfectiorem reddidisse, eo, quod botanices linguam, usurpatis ubique vocibus maxime idoneis et definitis, magis accuratam effecit; nec quidem dubito quin delineatio morbi, ad instar delineationis plantæ, a Linnæo exhibitæ, in Nosologia multum profutura sit. In Nosologia autem, ac in botanice, non æque necessarium esse videtur; tum quod tam multæ rerum circumstantiæ, in Nosologia, ac in botanice, notandæ non veniunt; tum quod symptomatologia, in quibuscunque fere Pathologiæ generalis systematibus exhibita, plurimum in hac re jam præstitit. Fatendum quidem, symptomatologias vulgo prolatas,
nec

nec adeo plenas esse, nec adeo exactas, ac optandum esset; et, si pleniores fierent, atque ubique voces magis idoneæ et accurate definitæ usurpatæ essent, ad Nosologiam perficiendam certe plurimum conferre posset. In hujusmodi vero tentamine cavendum est, ne distinctiones nimium subtiles et dubiæ adhibeantur, uti ab auctore Observationum Clinicarum, quæ Warfaviæ annis 1767 et 1768 prodierunt, factum fuisse opinor. Ipse quidem hujusmodi nihil tentavi, tum quod plus exegisset, quam per longum tempus mihi suppetivit otii, tum quod mihi minus necessarium videtur, qui voces apud medicos usitatissimas, et in sensu vulgo recepto, ubique fere usurpandas curaverim.

Quod ad denominationem morborum attinet, in Classium, Ordinum, et Generum nominatione, eas, quantum potui, regulas observavi, quæ in Linnæi Criticis Botanicis, et in ejusdem Philosophia Botanica, ab ill. auctore traduntur.

Quando notiones novæ sunt proferendæ, etiam nova nomina imponenda sunt, et ejusmodi aliquando, parcius licet, adhibuimus. Cum vero nomenclaturam medicam, diuturno usu confirmatam, sine gravi causa mutare non liceat; ne factum esset ubique curavimus; quod tamen Ill. Linnæum sæpe, nulla urgente necessitate, fecisse, et Vogelium appellationibus novis, frivolis, ineptisque, Nosologiam deturpasse, observavimus.

Ut clarius et certior habeatur morborum notitia, appellationibus selectis, synonyma, tum aliorum Nosologorum, tum auctorum maxime celebrium, ubique apposuimus. Hoc diligentius feci, ut inde norint studiosi, ex quibus præcipue scriptis, morborum scientia optime obtineri possit.

In recensendis specierum synonymis, appellationes, quibus Sagarus usus sit, omisi, tum quod ipse aliorum auctorum synonyma ubique omittens, nos de speciebus, quas indicare voluit, incertos sæpe reliquit; tum quod, in recensione specierum, illum profecto minus peritum fuisse, et regulas Nosologiæ methodicæ optimas quasque neglexisse, nobis videtur.

Synonyma veterum medicorum adhuc omisi, non quod eorum scripta prorsus negligenda esse putaverim, sed quod ego, neque satis certo, neque cum fructu, synonyma eorum indicare potuerim.

CLASSIS I. PYREXIÆ.

Post horrorem pulsus frequens, calor major, plures functiones læsæ, viribus præsertim artuum imminutis. *

SYNONYMA. Morbi febriles Auctorum.

ORDO I. FEBRES.

Prægressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia, sine morbo locali primario.

Febres Auctorum, Sauv. cl. ii. Vog. cl. i. Sag. cl. xii.
Morbi febriles critici Lin. cl. ii.

§ 1. *Intermittentes.*

Febres, miasmate paludum ortæ, paroxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente interposita, cum exacerbatione notabili, et plerumque cum horrore

* Quod hic, et pluribus quæ sequuntur locis, nobis forsitan vitio verti possit, quodammodo hic obiter excusare liceat. Ita, dici potest, pyrexias aliquando videri, quas nullus præcesserat horror, et pyrexias in quibus neque pulsus frequentior, neque calor major, quam in sanis esse solet; characterem ideo datum neque verum, neque ubique adhibendum. Istiusmodi pyrexias, rarissime licet, aliquando videri negare nolo; sed, in characteribus classium, ad species dignoscendas adhibendis, ut singulæ classis notæ in unaquaque specie conspiciantur, haud necessarium videtur, et sufficit, si earum pleræque in specie quavis adsint.

Character idoneus quisque, plurium notarum sive symptomatum concursum notare debet, et male quidem cum veteribus Vogelius calorem auctum solum, et recentiores Sylvius et Cel. Boerhaavius pulsum velocitatem solam, pro characterē pyrexiae, sive febris ut vocant, posuerunt. Certe, qui dicunt febrem adesse, etsi pulsus nihilo naturali frequentior sit, ex aliis quam velocitate pulsum signis febrem adesse judicant; quod etiam plurimum symptomatum notationem, in quovis characterē necessariam esse, ostendit.

Porro, hic obiter observari velim, pulsum velocitatem solam, pyrexiam vel febrem adesse nequaquam semper indicare; cum a causis externis plurimis pulsus sit naturali velocior, sine morbo, sine quavis functionum læsione. Hisce de pyrexiae characterē quæstionibus, in characterē a nobis hic dato, quantum potuimus, prospectum est. Sed, in aliis classium et ordinum characteribus adeo felicem esse vix licet; et in characteribus plerisque, si ad species plerasque character recte adhiberi possit, paucas exceptiones non moror. Utilem plerumque fuisse mihi sufficit, ubique perfectum fore non spero.

TABULA SYNOPTICA CLASSIUM* ORDINUM ET GENERUM.

Adv. pag. 218.

CLASS. I.—PYREXIE.

ORDO I. FEBRES.

§. 1. *Intermittentes.*

1. Tertiana.
2. Quartana.
3. Quotidiana.
- §. 2. *Continuae.*
4. Synocha.
5. Typhus.
6. Synochus.

ORDO II. PHEGMAE.

7. Phlogosis.
8. Ophthalmia.
9. Phrenitis.
10. Cynanche.
11. Pneumonia.
12. Carditis.
13. Peritonitis.
14. Gastritis.
15. Enteritis.
16. Hepatitis.
17. Splenitis.
18. Nephritis.
19. Cystitis.
20. Hyteritis.
21. Rheumatismus.
22. Odontalgia.
23. Podagra.
24. Arthropodis.

ORD. III. EXANTHEMAT.

25. Variola.
26. Varicella.
27. Rubecula.
28. Scarlatina.
29. Pellis.
30. Erysipelas.
31. Miliaria.
32. Urticaria.
33. Pemphigus.
34. Aphtha.

ORD. IV. HEMORRHAGIE.

35. Epistaxis.
36. Hemorrhoidis.
37. Hemorrhoidis.
38. Menorrhagia.
- ORD. V. PROFLUVIA.
39. Catarrhus.
40. Dysenteria.

CLASS. II.—NEUROSES.

ORDO I. COMATA.

41. Apoplexia.
42. Paralysis.

ORD. II. ADYNAMIE.

43. Syncope.
44. Dyspnea.
45. Hypochondriasis.
46. Chlorosis.

ORD. III. SPASMI.

47. Tetanus.
48. Trismus.
49. Convulsio.
50. Chorea.
51. Raphania.
52. Epilepsia.
53. Paritatio.
54. Asthma.
55. Dyspnea.
56. Pertussis.
57. Pyrosis.
58. Cholera.
59. Cholera.
60. Diarrhoea.
61. Diabetes.
62. Hyteria.
63. Hydrophobia.
- ORD. IV. VESANIAE.
64. Amentia.
65. Melancholia.
66. Mania.
67. Onitrodynia.

CLASS. III.—CACHEXIE.

ORDO I. MARCORES.

68. Tabes.
69. Atrophia.

ORD. II. LINTUMESCENTIE.

- §. 1. *Atiposa.*
70. Polyarthritis.
- §. 2. *Flangose.*
71. Pneumatosi.
72. Tympanites.
73. Phylometra.
- §. 3. *Aquosa.*
74. Anasarca.
75. Hydrocephalus.
76. Hydrochitis.
77. Hydrothorax.
78. Ascites.
79. Hydrometra.
80. Hydrocele.
- §. 4. *Solida.*
81. Phylometra.
82. Rachitis.
- ORD. III. IMPETIGINES.
83. Scrophula.
84. Syphilis.
85. Scorbutus.
86. Elephantiasis.
87. Leprosia.
88. Frambesia.
89. Trichoma.
90. Icterus.

CLASS. IV.—LOCALES.

ORDO I. DYSSTHESE.

91. Caligo.
92. Amaurosis.
93. Nyctopia.
94. Pseudoblephs.
95. Dylececa.
96. Paraculis.
97. Anosmia.
98. Agnethia.
99. Anæsthesia.
- ORD. II. DYSOREXIE.
- §. 1. *Appetitus Erronei.*
100. Bulimia.
101. Polydipsia.
102. Pica.
103. Sarcinias.
104. Nymphomania.
105. Nostalga.
- §. 2. *Appetitus deficientes.*
106. Anorexia.
107. Adipsia.
108. Anaphrodisia.
- ORD. III. DYSCHINESIE.
109. Anomia.
110. Mutitas.
111. Peripnomia.
112. Pellismus.
113. Strabismus.
114. Dysphagia.
115. Contractura.
- ORD. IV. APOCENOSSES.
116. Profusio.
117. Epithroffis.
118. Epiphora.
119. Pyalismus.
120. Enuresis.
121. Gonorrhoea.
- ORD. V. EPISCHESES.
122. Cistipatio.
123. Ichuria.
124. Dysuria.
125. Iyfermatismus.
126. Amenorrhoea.
- ORD. VI. TUMORES.
127. Aneurisma.
128. Varix.
129. Echymoma.
130. Scirrhus.
131. Cancer.
132. Babo.
133. Sarcoma.
134. Verruca.
135. Clavus.
136. I upia.
137. Ganglion.
138. Hydatis.
139. Hydrarthrus.
140. Exostosis.
- ORD. VII. ECTOPIE.
141. Hernia.
142. Prolaplus.
143. Luvatio.
- ORD. VIII. DIALYSES.
144. Vuhus.
145. Ulicus.
146. Herpes.
147. Tinea.
148. Pfora.
149. Fraclura.
150. Caries.

* CLASSIVM institutionem primo a Sauvagesio datam, Linnæus, Vogelius, et Sagarus, in omnibus fere, secuti sunt. Cum vero ex eorum classibus plures sint
ati Victorum, Aihelationum, Dolorum, et Fluxuum, neque naturales, nec quovis modo idonee ejusmodi institutionem sequi non possunt. Aliam itaque classem
giorem, et in universum, ut mihi videtur, aptiorem, hic protuli. Hæc fortasse etiam minus absoluta videri possit, quod inter morbos totius systematis in primis
tribus classibus recensitis, et illis partis singularis, live Locales, in classe quarta collocatos, distinctio non ubique facilis erit. Hoc quidem, ratus licet, ali-
quando fieri posse concedimus. Sed nihil prestantius nobis nunc suppetit; et, ob rationes in Prolegomenis, pag. 208. allatas, de perfecta classium institutione
non admodum solliciti sumus.

rore redeuntibus, constantes: Paroxysmo quovis die unico tantum.*

Intermittentes Auctorum. Sauv. cl. ii. ord. 3. Linn. cl.

ii. ord. 2. Vog. cl. i. ord. 1. Sag. cl. xii. ord. 3.

Remittentes Auct. S. cl. ii. o. 2. Sag. cl. xii. o. 2. †

Exacerbantes Lin. cl. ii. ord. 3.

Continuæ Vog. cl. i. ord. 2. †

Continuæ periodicæ Sennert. de febr. lib. ii. cap. 13.

Continuæ remittentes, Boerh. Aph. 727.

Compositæ ex acuta periodo, Junk. tab. 82.

Continuæ remittentes, proportionatæ, Torti. Therap.

Spec. lib. v. cap. 1.

Continentes Mortoni, Excer. ii.

TERTIANA. (1)

Paroxysmi fimiles intervallo quadraginta octo circiter horarum: Accessionibus meridianis.

Tertiana Auctorum, Sauv. g. 88. Lin. 16. Vog. 2. Sag. p. 704. Hoffm. tom. ii. p. 11. Stahl. de tertiana febris genium universum manifestante, Halæ 1706. Ejusd. Casual. magn. cas. 21. Casual. min. cas. 96. Cleghorn's diseases of Minorca, cap. 3. Senac, de recond. febr. natura. Edinb. Med. Ess. vol. iv, art. 24.

Tertiana est vel

1. *Interposita apyrexia*, quæ variat

A. Paroxysmi duratione.

a. Tertiana

* Qui perpenderit quæ de febribus Remittentibus, quæ videntur continuæ, a Continuis, strictius dictis distinguendis, mox dicenda sunt, facile videbit quamobrem, tum intermittentium tum continuarum characterem antea datum, hic mutare necessarium habui.

† Febrium Remittentium, quasi a febribus Intermittentibus exquisitis prorsus differentium, ordinem separatim instituerunt Nosologi Sauvagesius, Linnæus, et Sagarus; minus recte tamen, si mihi judicare fas sit. Remittentes enim, quæ dicuntur, ex eodem principio, miasmate nempe paludum, ac Intermittentes, oriuntur; iisdem in locis, et eodem anni tempore, utraque simul epidemice grassatur; utraque iisdem prorsus remediis sanatur; et sæpissime in eodem homine idem, qui videtur, morbus, nunc intermittentis nunc remittentis typum exhibet. Morbi idcirco, causis, sanatione, et typo simillimi, nec ad ordinem, nec ad sectionem diversam distrahendi, erant.

‡ Magis inconsulto adhuc Vogelius Remittentes omnes cum Continuis sociavit. Continuæ, quas vocamus, omnes quidem remissiones et exacerbationes ostendunt; sed a Remittentibus ad Intermittentes merito referendis, plurimum aliis multis differunt, ut mox dicetur.

TERTIANA. (1)

- a. Tertiana paroxysmis haud ultra horas duodecim extensis.

T. legitima, S. sp. 1. Sennert. de febr. lib. ii. c. 18.
Hoffm. tom. ii. p. 12.

T. vera, Clegh. Min. p. 140.

- b. T. paroxysmis ultra horas duodecim extensis.

T. notha five spuria, S. sp. 2. Sennert. de febr. lib. ii. c. 18. Clegh. Min. p. 140. Hoffm. tom. ii. p. 12.

B. Paroxysmorum recurfu.

- a. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis inæqualibus, alternis similibus.

T. duplex, S. sp. 13. Sennert. de febr. lib. ii. c. 21.
Vog. gen. 12. Clegh. Min. p. 141.
Duplicana, Linn. 18.

- b. Tertiana alternis diebus revertens, paroxysmis eodem die binis.

T. duplicata, S. sp. 14. Jones, de febr. interm. p. ii. cap. 6. River. Cent. iv. obs. 16.

- c. Tertiana quotidie revertens, paroxysmis altero die binis, altero unico tantum.

T. triplex, S. f. 15. Clegh. Min. p. 142. Semitertiana Hoffm. ii. p. 40.

Semitertiana primi ordinis Galeni, Spig. de semitertiana, lib. ii. cap. 4.

- d. Tertiana quotidie revertens, interposita remissione inter diem impari et parem magis, inter parem et impari minus, notabili.

Hemitritæus, Celsi lib. iii. cap. 3.

Semitertiana, Clegh. Minorc. p. 143. *

Semitertiana secundi ordinis, Galeni, Spig. l. ii. c. 5.

Amphimerina hemitritæus, S. sp. 8.

Amphimerina pseudo hemitritæus, S. sp. 9. *

C. Symptomatibus.

- a. Tertiana affectibus soporosis stipata.

T. carotica, S. sp. 10. Werlhof. de febribus, et auctores ab eo allegati, p. 6.

T. hemi-

* Fortassis hemitritæa quævis ad remittentes relegari possit; et, licet affines separare nolui, limites non satis certe ponendos esse fateor.

TERTIANA. (1)

T. hemiplegica, S. sp. 20. Werlhof. *ibid.*
Quotidiana soporosa, S. sp. 8. Car. Pis. *obf.* 175, 176.
Febris caput impetens, Sydenh. *Ep. ad R. Brady.*

b. *Tertiana spasmodica et motibus convulsivis stipata.*

T. asthmatica, S. sp. 6. Bonet. *Polyalth.* vol. i. p. 250.
T. hysterica, S. sp. 8. Wedelli A. N. C. Dec. i. A. ii. *obf.* 193.
Hysteria febricosa, S. gen. 135, sp. 8. A. N. C. Dec. i. A. ii. *obf.* 193.
T. epileptica, S. sp. 16. Calderæ *Trib. med.* p. 225.
 Lautter. *Hist. med. bienn.* cap. ii, cas. 2.
Quotid. epileptica, S. sp. 3. Edinb. *Essays*, vol. v, part ii, art. 49.
Ecclampsia febricosa, S. gen. 133, sp. 17.
Epilepsia febricosa, S. gen. 134, sp. 9.
Tertiana tetanodes Medici *Beobacht.* i. band. p. 24.
Tetanus febricosus, S. gen. 122, sp. 10. Stork, *Ann. Med.* ii, p. 163.

c. *Tertiana efflorescentia cutis stipata.*

Tertiana petechialis, S. sp. 3. M. Donati, lib. iii, cap. 14. Lautter. *Hist. med.* cap. ii, cas. 10.
Tertiana scorbutica, Wedel. A. N. C. dec. i, an. ii, *obf.* 193.
Tertiana urticata, S. sp. 22. Planchon. *Journ. de med.* 1765. Clegh. *Minorc.* p. 157.
Tertiana miliaris, S. sp. 21. Walthieri de *med. German.* apud Roncalli *Europ. med.* p. 151.

d. *Tertiana phlegmasia stipata.*

Tertiana pleuritica, S. sp. 4. Valesii in *epid.* lib. i, sect. 3. Lautt. *hist. med.* cap. ii, cas. 5, 9.
Pleuritis periodica, S. gen. 103, sp. 14.
Tertiana arthritica, S. sp. 5. Morton. *exerc.* i, cap. ix, *hist.* 22. Lautt. *loc. cit.* cas. 19.

D. *Aliis morbis complicata.*

Tertiana scorbutica, S. sp. 9. Etmuller, *prax.* lib. i, sect. xvi, cap. 2. Timæi lib. viii, cas. 15.
Tertiana syphilitica, S. sp. 17. Deidier de *morb. vener.* sect. iv.
Tertiana verminosa, S. sp. 18. Stiffer. in *act. Helmstad.* Lancis de *noxis palud.* lib. ii, cap. 5 et 6.
Illust. Pringle *Diseases of the army*, p. 98. Ramazzini

TERTIANA. (1)

mazzini Const. epidem. rural. ann. 1695, sect. xi.
 Van den Bosch. Const. epidem. verminos. ann.
 1760, &c.

E. Ratione principii. *

Tertiana accidentalis, S. sp. 12. Sydenham, cap. 5.
 Tertiana a scabie, S. sp. 11. Juncker, tab. 80.
 Hoffm. ii. p. 12.

2. Interposita remissione tantum. †

Tritæophya, S. gen. 85. Sag. p. 695.
 Tritæus, Linn. 21.
 Hemitritæa, Linn. 23.
 Tertianæ remittentes et continuæ Auctorum.
 Tertianæ subintrantes, proportionatæ, subcontinuæ,
 Torti Therap. special. lib. iii, cap. 1.
 Tertiana subcontinua, S. sp. 19.
 Quotidiana deceptiva, S. sp. 2.
 Amphimerina semiquintana, S. sp. 24.
 Tritæophya deceptiva, S. sp. 10.

Ex tertianis comitatis Torti loc. cit. præcipuæ
 sunt :

- i. Tertiana cholERICA sive dysenterica, Tort. ibid.
 Lautter, Hist. med. cas. 6, 16, 17, 20. Morton,
 app. ad exerc. ii.
- ii. Tertiana subcruenta sive atrabilaris Tort. ibid.
 Hæc a Cleghornio nunquam visa est.
- iii. Tertiana cardiaca Tort. ibid. Lautter, Hist.
 med. cas. 15, 18, 23.

Amphimerina cardiaca, S. sp. 5. †

Tritæophya

* Nullum quidem febrium intermittentium principium sufficiens præter miasma paludum agnoscimus; sed, cum miasma hoc non semper validum sit ad morbum arcessendum, nisi aliæ potestates excitantes simul agere concurrant; has potestates excitantes pro parte principii hic admittimus, licet neutiquam morbum excitassent, si miasma paludum non antea applicatum fuisset.

† Tertianæ Remittentes variant adeo, tum typi tum symptomatum ratione, et formæ earum diversæ adeo sæpe in eodem homine inter se commutantur, ut in iis denominandis nihil fere quod perpetuum sit afferri possit. Tertianas autem, quas comitatas dixit Torti, eas scilicet quæ symptomate quodam peculiari et gravi comitantur, recensui; dein, ut cætera ad hanc rem pertinentia intelligantur, auctores plures qui de tertianis remittentibus optime scripserunt, et exempla earum præcipua exhibuerunt, enumeravi.

‡ Amphimerinas inter et Tritæophyas, uti inter quotidianas et tertianas duplices, distinctio sæpe difficilis. Sed quotidianas tertianis multo rariores, et æconomiam animalem in febres typi tertiani maxime proclivem esse norunt experti; hinc plures amphimerinas ad tertianas remittentes retuli. Judicent autem autoptæ.

TERTIANA. (1)

- Tritæophya affodes, S. sp. 6.
 Febris continua affodes, Vog. 27.
 iv. Tertiana diaphoretica, Tort. ibid.
 Tritæophya typhodes, S. sp. 4.
 ——— elodes, sp. 5.†
 Febris continua elodes, Vog. 21.
 v. Tertiana syncopalis Tort. ibid. Lautter, c. 11,
 12, 13, 15, 16.
 Tritæophya syncopalis, S. sp. 1.
 Amphimerina syncopalis, sp. 4.
 ——— humorosa, sp. 6.
 Febris continua syncopalis, Vog. 29.
 vi. Tertiana algida, Tort. ibid. Lautter, cas. 13.
 Amphimerina epiala, sp. 3.
 ——— phricodes, sp. 7.
 Tritæophya leipyria, sp. 9.
 Tertiana leipyria, sp. 23. Valcarenghi Med. ra-
 tion. p. 18.
 Febris continua epiala et leipyria, Vog. 19 et 24.
 vii. Tertiana lethargica, Tort. ibid.
 Tritæophya carotica, sp. 7. Lautter, 1, 7, 14.
 Tertiana apoplectica Morton. exerc. i, cap. ix,
 hist. 25.
 ——— soporosa Werlhof. de febr. p. 6.
 Febris epidemica Urbeveta Lancis. de noxis
 pal. effluv. lib. ii, cap. 3.
 Tertianarum remittentium exempla præcipua, no-
 bis nota, sunt sequentia :
 Causos Hippocratis. De Morb. Vulg. lib. iii, § 3.
 Tritæophya causus, sp. 2.
 Febris ardens, Boerhaavii, Aph. 738 ?
 Remittens ardens five causis, Macbride, p. 360.
 Tertiana perniciofa, quæ simulata tertiani circuitus
 effigie lethalis, et mille accidentibus periculofiffi-
 mis implicata, exiftit. Lud. Mercatus de febrim-
 bus, lib. vi.
 ——— pestilens, P. Sal. Diverfus de febrim pestilent,
 cap. x.
 ——— maligna pestilens Riverii, lib. xvii, feft. ii,
 c. 1. et feft. iii, c. 3.

Morbus

† De typo febris fudatoriae Boyeri Meth. a fuivre dans les malad. epidem. quam huc retulit Sauvagefius, ex ipfius Boyeri defcriptione mihi non liquet, et ad typhum referri mallem.

TERTIANA. (I)

Morbus Hungaricus Lang. Lemb. lib. i, ep. 4. Sen-
nert. de febr. lib. iv, cap. 14. Jordan. de pestis
phæn. cap. 19.

Languor Pannonicus Cober. obs. castr. Hung. i,
obs. 6, &c.

Amphimerina Hungarica, sp. 10.

Vide postea, notas ad Typhum.

Hemitritæus pestilens, Schenck obs. lib. vi, ex Corn.
Gemma.

Febres pestilentes Ægyptiorum, Alpin. de med.
Ægypt. lib. i, cap. 14.

Febris tertiana epidemia, Bertholin. Hist. anat.
cent. ii, 56.

Febres epidemicæ Autumnæ ann. 1657 et 1658,
Willis de febr. cap. 16.

Febris syneches epidemica ab ann. 1658 ad 1664,
et postea ab ann. 1673 ad 1691. Morton. app.
ad exerc. ii.

Febres autumnales incipientes, Sydenh. de morb.
acut. ad ann. 1661—1664, et in epist. ad H. Pa-
man ad 1678, et seq.

Affectus epidemicus Leidensis, Fr. Sylvii prax. med.
app. tract. x, et oratio de affectus epidem. causis.

Morbus epidemicus Leidensis 1669, Fanois, diss. apud
Haller. disp. tom. v.

Tertianæ perniciosæ et pestilentes et febres castren-
ses epidemiæ Lancisi de nox. palud. effluv.

Febres intermittentes anomalæ et mali moris, Hoffm.
ii, p. 38.

Febris cholERICA minus acuta, Hoffm. ii, p. 112.

Febris epidemica Leidens. ann. 1719. Koker apud
Haller, disp. tom. v.

Amphimerina paludosa, S. sp. 19.

Febris paludum, illustr. Pringle Diseases of the
army, edit. 4ta, 8vo, p. 179.

Bononiensis constitutio hiemalis 1729, Beccati in
A. N. C. vol. iii, obs. 48.

Amphimerina biliosa, S. sp. 22.

Remittens biliosa, Macbride, p. 360.

Febris Castrensis, illustr. Pringle loc. cit. p. 174.

Febris putrida epidemica, Huxham de aëre ad ann.
1729.

Febris biliosa Lausanensis, cl. Tissot. de febr. bilios.

Tritæophya Wratislaviensis, sp. 3. Hahn. epide-
mia verna Wratislav. in app. ad A. N. C. vol. x.

Tritæophya Americana, sp. 12?

Febris

TERTIANA. (1)

Febris anomala Batav. Grainger de febr. anomala.

Morbus Naronianus, Pujati de morb. Naron.

Febris continua remittens, Hillary's dis. of Barbadoes, variis annis, Lond. med. obs. iv. 24, v. 2.

Febris ann. 1772, et seq. ad urbem novam Avinionensem, Soc. Royale de Medecine I. Histoire, p. 213.

Febris intermittens irregularis Tolosæ 1772, Soc. Royale i. mem. p. 14.

Febris intermittens et remittens a l'Isle Jourdain, anno 1777, Soc. Royale ii, hist. p. 145.

Febris remittens Indiæ Orientalis, Lind. med. Edin. diss. inaug. 1768. Lond. med. obs. vol. iv, a. 12.

Febris critica et febr. biliosa ætatis, Rouppe de morb. navig.

Febris remittens regionum calidarum, cl. Lind. med. Haflar. Essay on the diseases of hot climates.

Tertiana remittens symptomatica est :

Tritæophya lactea, sp. 8.

Febris lactea, Etmulleri Coll. consult. cas. 17.

QUARTANA. (2)

Paroxysmi similes intervallo septuaginta duarum circiter horarum : Accessionibus pomeridianis.

Quartana Auctorum, Sauv. gen. 89. Lin. 17. Vog. 3. Sag. 711. Hoffm. ii, p. 23. Junck. tab. 81.

Est vel,

1. *Interposita apyrexia.* Variat

A. Typo.

a. Quartana paroxysmis quarto quoque die singulis; aliis diebus nullis.

Q. legitima, sp. 1. Sydenham de morb. acut. c. v.

b. Quartana paroxysmis quarto quoque die binis; aliis diebus nullis.

Q. duplicata, sp. 4. Bonet.

c. Quartana paroxysmis quarto quoque die tribus; intermediis diebus nullis.

Q. triplicata, sp. 16.

d. Quartana quæ ex quatuor diebus tertium tantum
F f a febre

QUARTANA. (2)

a febre vacuum habet, paroxysmis quarto quoque die similibus.

Q. duplex, sp. 3. Vog. 13.

e. Quartana quotidie accedens, paroxysmis quarto quoque die similibus:

Q. triplex, sp. 5. Vog. 14. Barthol. H. anat. c. 1, 95.

B. Symptomatibus.

Q. cataleptica, sp. 7. Bonet. Polyalth. vol. i, p. 805.

Q. comatosa, sp. 15. Werlhof. de febr. C. Pisonis observ. de morbis a colluvie serof. obs. 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174.

Q. epileptica, sp. 8. Scholzii Conf. 379, 380.

Q. hysterica, sp. 10. Morton. pyret. exerc. i, c. ix, h. 10, 11.

Q. nephralgica, sp. 9.

Q. metastatica, sp. 17.

Q. amens, sp. 12. Sydenham de morb. acut. c. v.

Q. splenetica, sp. 2. Etmuller. Coll. consult. c. 25.

Q. hepatica, Macb. p. 354.

C. Aliis morbis complicata.

Q. syphilitica, sp. 6. Plateri obs. l. iii, pag. 676.

Edinb. Essays, art. xlvii, obs. 8.

Q. arthritica, sp. 11. Musgr. de arthr. symptom. cap. ix, h. 4 et 5.

Arthritis febrilescens, sp. 10.

Arthritis febricosa, sp. 10. Werlhof. de febr.

Cockburn de morbis navigantium, obs. 19.

Q. scorbutica, sp. 14. Barthol. de med. Dan. diss. iv. Tim. l. viii, cas. 18.

2. Interposita remissione tantum.

Tetartophya, S. gen. 85. Sag. 323. Lin. 22.

Quartana remittens Auctorum.

Varietates sunt,

Tetartophya simplex, sp. 1.

Amphimerina

* Quartanam continuam morbum rarissimum esse, testantur scriptores medici omnes; sed illius exemplum ex Franc. Joelis operum tomo 3. citat. Sauv. In loco autem citato, nihil ad rem pertinens inveni; sed tomi quinti p. 63, hæc verba proferuntur. Febris quartanæ "Species veteres duas constituunt. Quartanam Continuum, (quæ mihi septuagenario nunquam visa est, et ideo eam aut rarissimam aut nullam esse judico) et Interpolatam, quæ frequentissima est."

QUARTANA. (2)

Amphimerina semiquartana, sp. 23.

Tetartophya semitertiana, sp. 25.

————— maligna, sp. 6. Lautter. Hist. med. cas. 21. M. Donat. lib. iii, cap. 14. et M. Ga-
tenaria Horst. lib. i, obs. 15.

————— carotica, sp. 4. Werlhof. de febr. Bianchi Hist. hep. pars iii, const. ann. 1718, p. 751.

————— splenalgica, sp. 2. †

————— hepatalgica, sp. 3. Car. Pis. in præ-
fat. p. 33.

Amphimerina spasmodica, sp. 16.

ERRATICÆ. Ad Tertianam vel Quartanam Erraticas
S. pertinere putamus ‡; et hic ideo earum varieta-
tes subjunximus.

Erratica quintana, sp. 1. Tulp. lib. iii, 52. Fo-
rest. lib. iii, obs. 43. ex quartana ill. Van Swie-
ten, comm. p. 505.

———— septana, sp. 2. Boerh. apud ill. Van Swie-
ten, ibid. M. Don. l. 3, 14.

Hebdomadaria Schenkii ex Gibalto.

Septimana, ill. Morgagn. xlix, 36.

Erratica octana, sp. 3. Etmuller, prax. lib. i, § xv,
cap. 2. Cyrilli in Etmuller, p. 187, 188, 365.
Valles Controv. I. v, c. 25. P. Sal. Div. in not.
ad D. A. de Altomari, cap. xii. Zacut. Lus.
P. M. lib. iii, obs. 34. Schultzius in E.N.C.D.I.
ann. iv et v, ob. 70. Arnold. de febr. Stomach.
epid. sect. iv. apud Haller. dissert. pract. vol. v.
De Haën de divis. febr. div. iv, p. 9.

Hemictania lunatica, sp. 10.

Erratica nonana, sp. 4. Zac. Lus. ibid.

———— decimana, sp. 5. Zac. Lus. ibid.

Ephemera dichomene, sp. 11. M. Don. lib. iii, 14.
ex Gentili.

Erratica vaga, sp. 6. River. cent. iii, observ. 32.
Etmuller, lib. i, sect. xv, cap. 2.

QUOTIDIANA.

† Huc febrem Fernelianam Raym. Fortis refert Sauv. et vult febrem ita a Forte
dictam fuisse, quod ea mortuus sit ipse Fernelius: Sed quodammodo hic errasse
Sauvagesius mihi videtur. Nam febres quasdam Fernelianas vocat Fortis, tom. ii,
cent. ii, obs. 35 et 36, non quod e genere remittentium fuerint, sed quod visceris
cujusdam, hepatis præsertim, labe comitatæ sint; et mortuus quidem est Fernelius
ex inflammatione lienis. Sed quod hic morbus quartanæ typum unquam exhibuit,
non dicitur a Plantio, qui in vita Fernelii, operibus ejus præfixa, de eo morbo
narrat.

‡ Vide Senac. De recondita febrium natura, lib. i. cap. 1,

QUOTIDIANA. (3)

Paroxyfmi fimiles intervallo viginti quatuor circiter horarum: Paroxyfimis matutinis.

Quotidiana Auctorum, S. gen. 87. Linn. 15. Vog. 1.
Hoffm. 11, 33. Junck. tab. 79.

1. *Interposita apyrexia.* Variat

A. Solitaria.

a. Universalis: Quotidiana eadem hora matutina rediens.

Quotidiana simplex, sp. 1.

Quotidiana legitima, Sennert. de febr. cap. 18.

b. Partialis.

Quotidiana partialis, sp. 10. Cnoffel. E. N. C. D. I.
a. iii, obf. 205. Edinb. med. eff. vol. i, art. 31.
vol. ii, art. 19.

Quotidiana cephalalgica, sp. 6. Morton Pyret. exerc. i, hift. 27. Van Swieten in Boerh. p. 534.
Soc. Royale, ii. mem. p. 38.

Cephalalgia intermittens, sp. 7.

Cephalæa febricofa, sp. 4.

Quotidiana ophthalmica, Morton, ibid. hift. 17.
Van Swieten, ibid.

Ophthalmia febricofa, sp. 23.

B. Comitata.

Q. ifchiadica, sp. 5. Edinb. eff. vol. v, art. 49.

Ifchias intermittens, sp. 1.

Q. nephralgica, sp. 7. Morton, ibid. hift. 28.

Nephralgia febricofa, sp. 13.

Q. uretico-fputatoria, B. Scharf. E. N. C. D. ii,
a. ii, obf. 104.

Q. epileptica, sp. 4. Edinb. eff. loc. cit.

Hysteralgia febricofa, sp. 9.

Verfpertinæ vel fymptomaticæ videntur fequentes:

Q. hyfterica, sp. 3. catarrhalis, sp. 9. strangurifofa, sp. 11.

2. *Interposita remiffione tantum.*

Amphimerina, S. gen. 84. Lin. 20. Sag. 321.

Quotidiana continua, Vog. 15.

Quotidianæ remittentes et continuæ Auctorum.

Amphimerina

QUOTIDIANA. (3)

Amphimerina latica, sp. 1.

Febris continua lymphatica, Etmuller Coll. conf. cas. 32. River. obs. cent. i, ob. 57.

Amphimerina singultuosa, sp. 14.

Febris continua Lyngodes, Vog. 26.

Amphimerinæ S. cæteræ vel ad tertianas pertinere; quorsum plures supra retuli, vel symptomatice et vespertinæ esse videntur. Hujusmodi sunt,

Amphimerina catarrhalis, sp. 2. anginosa, sp. 12. tussiculosa, sp. 13. peripneumonica, sp. 15. variolosa, sp. 20. miliaris, sp. 11. arthritica, sp. 21.

De *Amphimerina mimosa* Bontii et *Phrenitica* ejusdem, S. sp. 17, 18, non liquet.

§ 2. *Continuæ*. *

Febres, sine intermissione, nec miasmate paludum ortæ, sed cum remissionibus et exacerbationibus, parum licet notabilibus, persistentes: Paroxysmis quovis die binis. †

Continuæ,

* Quæ sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat, Febrem Continuum esse, dixit Sauvagesius; et hujusmodi febres, cum scholis medicis plerisque, Continentes vocat Linnæus. Hujusmodi autem febrem in quadraginta annorum praxi fatis frequenti, vix unquam certo vidi, et fere semper in febribus, maxime continuis, exacerbationes et remissiones, etiam quotidie, fatis manifestas observavi. Mecum quidem sentire videtur Vogelius, uti ex ejus continuarum caractere fatis patet; nec dissentit expertissimus De Haen, uti videre est in libro ejus de divisione febrium. Divis. iv. Schol. i.; et apprime sententiam nostram confirmat Brendelius, verbis sequentibus: "Omnes namque febres nostræ, acutæ, et inflammatoriæ, et exanthematicæ, et malignæ, reliquæve hujus generis, sunt continuæ remittentes, et luculenta intensio-um remissionumque spatia integrant." Brendel. Opuscul. p. ii, diss. xi, sect. 5.

Porro, etsi in febribus quibusdam exacerbationes et remissiones parum notabiles, et perinde observatu difficiles sint, easdem tamen revera fieri censeo; et ob hoc præsertim, quod in febribus quibuscunque ex paroxysmis pluribus manifesto constantibus, paroxysmus quisque, inter nycthemeræ spatium, cursum suum, ex exacerbatione et remissione constantem, semper absolvat, ita ut in his rebus œconomiam animalem circuitus diurni legi cuidam subijci videatur. Huic etiam in sanitate parere solet, et huic in febribus hæcticis quibusque ad amissum subijcitur. Verisimillimum itaque videtur, eundem circuitum, quem toties observavimus, in febribus quibuscunque locum habere; nec febrem quamcunque continentem revera in rerum natura dari.

† Cum continuum quamque ex paroxysmis repetitis consistere ponimus, sæpe ambiguam fieri possit, utrum febris data ex continuarum sit, an ex remittentium ordine, et ut rite determinetur, tum intermittentium, ad quas omnes auctorum remittentes

- Continuæ, Sauv. cl. ii. ord. i. Vog. cl. i. ord. ii.
 Sag. 666. Macb. p. 303. Boerh. 727.
 Continentes, Lin. cl. ii. ord. i. Stahl. Caf. mag. 35.
 Caf. min. 87. Junck. 58. Sennert. de febr. lib. ii.
 cap. 2 et 10.

SYNOCHA. † (4)

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatæ.

Synochus, S. gen. 80. Lin. 12. Junck. 58.
 ———— five febris acuta sanguinea, Hoffm. ii, 105.

Synochus, Vog. 16.

Continua non putris, Boerh. 729.

Ephemera, S. gen. 79. Boerh. 728. Junck. 57.

Diaria, Lin. 11.

Febris inflammatoria Auctorum.

Varietates sunt :

Synocha plethorica, sp. 1. sanguinea, Sennert. de febr. lib. ii. c. 11. Ephemera plethorica, sp. 1. a frigore, sp. 3. a calore, sp. 4. Synochus pleuritica, sp. 5. Febris pleuritica ann. 1765. Sydenh. sect. v. cap. 1, 5. Synochus rheumatifans, sp. 7. Sydenh. sect. v, c. 2. hiemalis, sp. 8. Sydenh. in P.S. ad tractat. de hydrope.
 Symptomaticæ

remittentes pertinere putamus, tum continuarum, definitionem aliam quam antea nunc dedi. In plerisque casibus, ut opinor, definitiones nunc datæ satis facile et certo adhiberi possint. Sed sagacioribus quibuscvis examinandum relinquo, an vel definitiones nostræ recte dentur, vel si quid rectius dari queat. Febrem quamque continuam ex paroxysmis quovis die binis constare credimus; cum autem in quibusdam, tum intermittentibus tum remittentibus, itidem paroxysmi duplicati videantur, ex illa nota sola febres continuæ dignosci non possunt. Ex illa nota sola quidem ut dignoscantur nequaquam volui; nam in casu quovis ambiguo, vel a principio, vel a typo, vel ortu ab intermittentibus, remittentem quamvis cognosci posse puto. Videant porro in his rebus versati, annon a principio, sæpe manifesto et maxime frequenti, contagione nimirum humana, febres continuæ sæpe certe cognosci possint.

† Febrium continuarum divisio, a Galeni temporibus, in hunc usque diem, eadem fere usitata est, et vel ex putredinis gradu parum accurate definito, vel ex duratione morbi, desumpta fuit; utraque tamen nota, posterior præsertim, quæ præcipue usi sunt Nosologi Sauvagesius, Linnæus, et Sagarus, manifesto inepta est. Vide Prolegomena, pag. 212 et 215. Aliam itaque divisionem a differentia symptomatum, et a natura inorborum, quantum de ea judicare liceat, desumptam, institui; secutus simul illam apud Britannos nunc maxime usitatam divisionem febrium continuarum in Inflammatorias et Nervosas. Has autem appellationes, utpote quodammodo theoreticas, vitavi. Nomina quibus usus sum apud medicos dudum recepta sunt; et si forsitan sensu vulgo recepto, in quo medici ipsi parum constantes fuerunt, iis non usus sum, parum curo, cum definitiones subjunctæ ab errore quovis præcavere possint.

SYNOCHA. (4)

Symptomaticæ sunt :

- Ephemera nauseativa, sp. 2. a phlogosi, &c. sp. 6.
- Synocha dolorum, sp. 7. M. Tab. ord. i, gen. 1, sp. 1. var. D.
- Ephemera lactea, sp. 5. menstrua, sp. 8.
- Synocha catarrhalis, sp. 5. M. Tab. ord. i, gen. 1, sp. 1, var. E.
- scorbutica, sp. 6.
- Synochus scorbutica, sp. 13.
- Synocha cephalalgica, sp. 8. M. Tab. ord. i, gen. 1, sp. 2. var. A.

TYPHUS. (5)

Morbus contagiosus; calor parum auctus; pulsus parvus, debilis, plerumque frequens; urina parum mutata; sensorii functiones plurimum turbatae; vires multum imminutæ.

Typhus, Sauv. gen. 82. Sag. 677.

Species sunt,

A. Typhus (*petechialis*) plerumque cum petechiis.

Variat gradu: ||

a. Typhus mitior.

Febris maligna hæctica sive lues *νευρωδης* convulsiva,

Willis de morb. convulsiv. cap. 8. §

— pestilens Fracastor. de morb. contag. lib. ii, cap. 4.

— pestilens sine caractere veneni Forest. lib. vi, obs. 26.

— hæctica pestilens Forest. lib. vi, obs. 32.

Febris

|| Morbos gradu solum differentes nominibus diversis insignire nequaquam convenit; cum autem nuperis temporibus apud medicos usitatum sit, febrem quandam, quasi ab aliis quibusvis differentem, nomine Febris Nervosæ appellare; huic opinioni quodammodo morem gerens, sub titulo Typhi mitioris, variorum auctorum febres ad recentiorum nervosæ aliquomodo referendas recensui. In hac re autem, cum limites neutiquam accurate ponendi sunt, me accuratum fuisse non dixerim.

Minus adhuc placuit, ad mentem vel veterum vel recentiorum inter febrium genera aliquod sub nomine Febris Putridæ recensere. In omni Typho humorum in putredinem proclivitatem adesse puto; sed vario tantum gradu adest, ita ut major minorve putredo speciem variare, nequaquam mutare, potest. Sufficiat sub titulo Typhi Gravioris eas, quæ præsertim putridæ appellatae sunt, febres indigitasse, uti ex appositis variorum auctorum appellationibus satis patebit.

§ Hoc est exemplum, ni fallor, primum appellationis *Νευρωδης*, vel nervosæ, febribus quibusvis datæ; quam protinus Angli, non tamen nisi nuper admodum aliarum regionum medici, usurpati sunt.

TYPHUS. (5)

Febris nova anni 1685. Sydenham Sched. monitor.
 — putrida nervosa Wintringh. Comm. Nosolog.
 ad annos 1720, 1721.

— lenta nervosa. Huxham on fevers, chap. 8.
 Edinb. med. eff. ii, 18. iv, 23. v, 48. Macb.
 p. 304. Soc. Royale i. mem. p. 23.

— contagiosa. Lind on fevers and infection
 passim.

Typhus nervosus, sp. 2.

— comatosus, sp. 3.

Tritæophya typhodes Mangeti, sp. 11. Raym. Fort.
 de febribus, p. 24. M. 304.

b. Typhus gravior.

Febris pestilens, P. Sal. Divers. de febre pestilenti.
 — pestilens Ægyptiorum Alpin. de med. Ægypt.
 lib. i; cap. 14.

Typhus Ægyptiacus, sp. 6.

Cephalitis epidemica, anno 1510, sp. 6.

Febris pestilens maligna Sennert. de febribus, l. iv,
 cap. 10.

— maligna pestilens River. lib. xvii, f. iii, c. 1.

— pestilens maligna, anno 1643. Willis, de fe-
 bribus, cap. 14.

— Senegallensis, Lond. med. obs. ii, 21.

Typhus carcerum, sp. 1.

Febris nautica pestilentialis Huxham de aëre ad
 annum 1740.

Miliaris nautica, sp. g.

Febris putrida contagiosa in carceribus genita, Hux-
 ham de aëre ad annum 1742.

Miliaris purpurata, sp. h.

Febris carcerum et nosocomiorum. Ill. Pringle,
 Diseases of the army, p. 294. Ill. Van Swieten,
 Maladies des armées, p. 136. Soc. Royale ii.
 mem. p. 53. Ibid. iii. mem. p. 45 & 55.

Typhus castrensis, sp. 5.

Febris castrensis, quam vulgo cephalalgiam epide-
 micam vocant Henr. Maii et A. Ph. Koph. Dis.
 apud Hallerum, tom. v.

— Hungarica five castrensis Juncker. 74. et plu-
 rium Auctorum. †

Febris

† Morbum five febrem Hungaricam ad tertianas remittentes, cum Sauvagesio
 et ill. Pringle, supra retuli; nec dubium est quin morbus Hungaricus dictus sæ-
 pius

TYPHUS. (5)

Febris castrensis Gallorum in Bohemia, anno 1742.
Scrinci diff. apud Haller. tom. v.

— petechialis, Sennert. lib. iv, c. 13. River.
prax. lib. xvii, sect. iii, c. 1. Hoffm. ii, p. 84.
Juncker. 73. Huxham on fevers, ch. 8. Lud-
wig. Inst. med. clin. no. 146. Schreiber von
erkenntnis, und cur der Krankheiten, p. 126.
Monro, Diseases of military hospitals, p. 1.

— catarrhalis maligna petechizans, Juncker. 72.
Hoffm. ii, 75. Eller de cogn. et cur. morb. f. vi.

— putrida, Macb. p. 305.

— catarrhalis putrida 1768. De Martens obs.
cap. 1.

— putrida biliosa 1769. De Martens, cap. 2.

— putrida nervosa 1770. De Martens, cap. 3.

Exempla febrium petechialium sunt sequentia:

Febris quæ lenticulas, puncticula, aut peticulas vo-
cant, Fracastorius de morb. contag. lib. ii, c. 6.

— peticularis Tridenti, anno 1591. Roboretus,
de febr. peticul.

— petechialis epidemica Coloniae, anno 1672.
Donckers, Idea febris petechialis.

— petechialis epidemica, Pofonii 1683, C. F.
Lœu in Append. ad A. N. C. vol. ii.

— petechialis epidemica Mutinæ, 1692. Ramaz-
zini. Const. Mutinensis, oper. p. 187.

— maligna petechizans, anno 1698. Hoffm. ii,
p. 89.

— petechialis Wratislaviæ, anno 1699. Helwich,
Ephem. Germ. diff. iii, a. 7 et 8, obs. 132, p. 616.

— epidemia Lipsiæ 1718. M. Adolph. A. N. C.
iii, obs. 131, p. 296.

— endemica et epidemica Corcagiensis, an. 1708,
1718, et seq. Rogers, Essay on epidemic diseases.

— continua epidemica Corcagiensis, anno 1719,
et seq. M. O'Connel Observ. de morbis.

— petechialis epidemica, Cremonæ 1734. Val-
charenghi Med. ration. sect. iii.

— petechizans Petropoli 1735, Weitbrecht. diff.
apud Haller. tom. v.

G g

Febris

pius sub forma remittentis apparuerit; sed simul constat febrem in castris Hunga-
ricis primo ortam, et per milites inde redeuntes per totam fere Germaniam dif-
fusam, ex genere continuarum fuisse (Vide Ruland. de morbo Hungarico, c. viii.
quæst. 39), et plerumque eandem esse quam nunc in Nosocomiis quibuscvis sæpe
exorientem bene novimus. Ad hunc locum igitur etiam apponendam esse putavi.

TYPHUS. (5)

- Febris petechialis, annis 1740, 1741, in Hassia, Ritter, A.N.C. vol. vii, obf. 4.
 — petechialis epidemica Vigornæ et aliis Angliæ locis: Wall's works, p. 337.
 — maligna petechialis Rintelli 1741. Furstenau. A.N.C. vol. vii, obf. 5.
 — petechialis epidemica Silesiæ 1741 et seq. Brandhorst. diff. apud Haller. tom. v.
 — petechialis epidemica Viennæ 1757. Hase-nohrl. hist. med. cap. 2.
 — petechialis epidemica Lipsiæ 1757. Ludwig. Adversar. tom. i, pars 1.
 — petechialis epidemica variis Germaniæ locis ab anno 1755 ad 1761. Strack de morbo cum petechiis.
 — epidemica maligna a Coutances 1772 et 1773. Soc. Royale i. mem. p. 23.
 — petechialis nervosa a Dijon 1760 et 1761. Mem. par Maret. 1775.

B. Typhus (*icterodes*) cum flavedine cutis.

Typhus icterodes, sp. 7.

Febris flava Indiæ Occidentalis, Warren. Malignant fever of Barbadoes, Hillary's Diseases of Barbadoes. Linning on the yellow fever of South Carolina. Edinb. phys. litter. essays, vol. ii. Mackittrick de febre flava Indiæ Occidentalis, Edinb. 1766.

Typhi etiam species esse videtur,

Ephamera sudatoria, sp. 7.

———— Britannica, Caius de ephem. Brit.

Sudor Anglicus, Sennert. lib. iv, cap. 15.

Hydronosus, Forest. lib. vi, obf. 8.

An eodem pertinet: Miliaris sudatoria, sp. e?

Febris sudatoria, Le Sueur Gallorum, Meysercy Meth. aisé, &c. Ejusd. Maladies des Armées 250.

Boyer Methode à suivre dans les maladies épidémiques. Tessier, Soc. Royale ii. mem. p. 46.

De typho hysterico verminoso, sp. 4. exhaustorum, sp. 8. a manipuera, sp. 9. nobis non liquet.

SYNOCHUS.† (6)

Morbus contagiosus. Febris ex synocha et typho composita, initio synocha, progressu et versus finem typhus.

Synochus, S. gen. 81. Lin. 13. Lenta, Lin. 14. Phrenitis, Vog. 18. Febris continua putrida, Boerh. 730.

Varietates ex Sauvagesio sunt :

Synochus sanguinea, sp. 1. Febris depuratoria, anno 1661 ad 1664. Sydenh. de morb. acut. Synochus sudatoria, sp. 2. Febris continua epidemica, anno 1665 ad 1667. Sydenh. ibid. Synochus soporosa, sp. 12. Febris continua epidemica, anno 1673. Sydenh. ibid. Febris continua putrida annorum variorum. Wintringham Com. Nosolog. Synochus ardens, sp. 6. miliaris, sp. 14. Synocha miliaris, sp. 6.

De synocho variolode, sp. 3. et synocha dysenteriode, sp. 4. nobis non satis liquet; et minus adhuc de Synocho anniversaria, sp. 9. spermatica, sp. 10. tarantata, sp. 11. Complicata est Synochus scorbutica, sp. 13. et symptomatica est Synochus a scabie, sp. 15.

HECTICA.

Febris quotidie revertens; accessionibus meridianis et vespertinis; remissione, rarius apyrexia, matutina; plerumque sudoribus nocturnis, et urina sedimentum furfuraceo-lateritium deponente.†

Hectica, S. gen. 83. Linn. 24. Vog. 80. Sag. 684. Med. trans. ii, 1:

Ex Sauvagesio species sunt :

Hectica chlorotica, sp. 3. syphilitica, sp. 4. scrophulosa,

† Cum plures febres nec inflammatoriæ nec nervosæ ex omni parte sint, neque ideo vel ad Synocham vel ad Typhum facile referendæ; genus Synochi, cujus typus hisce regionibus frequens conspicitur, hic inserui. Inter Typhum tamen et Synochum limites accuratos ponere non possum; et an revera pro diversis generibus habenda, vel positis diversis, utri eorum Synonyma auctorum referenda sunt, dubito. Quæ vero hic subjunguntur, a Sauvagesio species dictæ, ad Synochum satis recte, ut mihi videtur, referri possunt.

† Cum febrium in numerum, hecticam receperint Nosologi omnes, eam etiam cum caractere hic apponendam duxi. Ejusmodi autem febrem, cum nunquam nisi symptomaticam observaverim, in numerum idiopathicarum, quas solas enumerare licet, admittere nolui. In plerisque exemplis, hecticam revera symptomaticam esse, ex Sauvagesii speciebus, quas vocat, hic recensitis, satis manifestum fiet. Vide ipsius Sauvagesii Scholium, tom. i. pag. 319.

SYNOCHUS. (6)

phulosa, sp. 5. a calculis, sp. 6. hydropum, sp. 7. verminosa, sp. 9. cachectarum, sp. 10. fluxuum, sp. 11. infantilis, sp. 1. Charactere caret, et nobis vel rachitica, vel scrophulosa, vel verminosa videtur. Vespertina, sp. 2. vix pro morbo haberi potest.

De hectica lymphatica, Baglivi, sp. 12. et hectica nervea, cl. Lorry, sp. 13. nobis non liquet.

ORDO II. PHLEGMASIÆ.

Febris synocha; phlogosis; vel dolor topicus, simul læsa partis internæ functione; sanguis missus, et jam concretus, superficiem coriaceam albam ostendens.

Phlegmasiæ membranosa et parenchymatosa, S. cl. iii. ord. i. ii. Sag. 605. *

Morbi febriles phlogistici, Linn. cl. iii.

Febres continuæ compositæ inflammatoriæ, Vog.

Morbi acuti febriles, Boerh. 770.

Febres inflammatoriæ, Hoffm. ii. 105. Junck. 61.

PHLOGOSIS.† (7)

Pyrexia, partis externæ rubor, calor, et tensio dolens.

Species sunt,

1. Phlogosis (*phlegmone*) rubore vivido; tumore circumscripto, in fastigium plerumque elevato, sæpe in apostema abeunte; dolore sæpe pulsatili.

Phlegmone

* Hæc phlegmasiarum in membranosas et parenchymatosas divisio prorsus inepta est; primo enim, quod de statu partium internarum statuit, de quo in Nosologia statuere non licet; dein, quod partes membranosa et parenchymatosa non satis certo distinguuntur; et hinc Metritis, quam inter membranosas recenset Sauvagesius, a Linnæo et Sagarò inter parenchymatosas collocatur; denique, quod phlegmasiæ quædam, ut hepatitis, vel membranosa vel parenchymatosa esse possunt.

Nec magis idonea est ordinis phlegmasiarum musculosarum apud Linnæum et Sagarum institutio, in qua neuter quidem satis accuratus est. Male enim phlegmone a Linnæo musculosa dicitur, nec bene Cynanche plerumque membranosa, rarius musculosa, a Sagarò ad musculosas in universum refertur.

† Pro nomine generis cujus species est Erythema, minus recte in prior editione usurpatum fuit phlegmone. Novum nomen necessarium nobis videbatur, et nihil aptius quam Phlogosis suppetebat.

PHLOGOSIS. (7).

Phlegmone Auctorum, Sauvag. gen. 15. Lin. 39.
 Vog. 351. Sag. 299. Macb. 418.
 Inflammatio, Lin. 231. Boerh. 370. Junck. 20.

Variat,

a. Forma.

Furunculus, S. gen. 18. Vog. 352. Sag. 23. Macb.
 p. 222. Terminthus, Vog. 381. Papula, Lin.
 275. S. p. 6. Varus, Vog. 436. Lin. 269. S. p. 7.
 Bacchia, Lin. 270. Gutta rosea, Sauv. gen. 4.
 Gutta roseacea, Vog. 437.

b. Sede. ||

Hordeolum, S. gen. 27. Lin. 276. Vog. 434. O-
 talgia, S. gen. 197. Lin. 44. Vog. 148. Dolor
 otalgicus, Hoffm. ii, 336. Parulis, Vog. 362.
 Mastodynia, S. gen. 210. Vog. 153. Parony-
 chia, S. gen. 21. Lin. 258. Vog. 345. Arthro-
 cace, S. gen. 78. Lin. 256. Pædarthrocace,
 Vog. 419. Spina ventosa, Boerh. 526. Phi-
 mosis, S. gen. 22. Lin. 297. Vog. 348. Para-
 phimosis, Vog. 349. Proctitis, Lin. 30. Pro-
 ctalgia, S. gen. 214. Clunisia, Vog. 167.

2. Phlogosis (*erythema*) colore rubicundo, pressione
 evanescente; ambitu inæquali, serpente; tumore vix
 evidente, in cuticulæ squamulas, in phlyctænas vel
 vesiculas abeunte; dolore urente.

Erythema, S. gen. 11. Sag. 16. Erysipelas Au-
 ctorum, V. 343. Macb. 421. Hieropyr, V. 344.

Variat,

a. Vehementia.

Anthrax, S. gen. 19. Lin. 272. Vog. 353. Sag. 24.
 Carbo et carbunculus Auctorum, Macb. p. 423.
 Erythema gangrænosum, S. sp. 7.

b. Causa remota.

Erythema a frigore. Erythema pernio, S. sp. 4.
 Pernio, Lin. 259. Vog. 350. Erythema ambu-
 stio, sp. 2. Erysipelas ambustio, sp. 4. Combu-
 stura, Lin. 245. Combustio, Boerh. 476. En-
 caufis, Vog. 347. Erythema ab acri alieno ap-
 plicato,

¶ An frequentes pro totidem speciebus recenferi possint, judicent peritiores.

PHLOGOSIS. (7)

plicato, Erysipelas Chinense, sp. 7. Erythema ab acri inquilino, Erythema intertrigo, sp. 5. Intertrigo, Lin. 247. Vog. 502. Erythema a compressione, Erythema paratrима, sp. 6. Erythema a punctura, sp. 9. Erysipelas a vespis, sp. 19. Psyrdracia a vespis, sp. 2.

c. Complicata.

Erythema cum phlegmone; Erysipelas phlegmonodes Auctorum. Erythema cum œdemate, Erysipelas lymphomaticum, sp. 6.

Phlogosis sequelæ sunt,

1. APOSTEMA. Post phlogosin, remittentibus dolore et pulsatione, tumor albescens, mollis, fluctuans, pruriens.

Apostema, S. gen. 39. Sag. 55. Abscessus, Lin. 132. Vog. 354. Boerh. 387, 402. Macb. p. 414. Pustula, Lin. 274.

2. GANGRÆNA. Post phlogosin, pars livens, mollis, parum sensibilis, sæpe cum vesiculis ichorosis.

Gangræna, S. gen. 314. Lin. 233. Vog. 327. Sag. 203. Boerh. 338, 419. Macb. p. 415.

3. SPHACELUS. Post gangrænam pars nigricans, flaccida, facile lacerabilis, sine sensu vel calore, et cum fœtore carnis putridæ; vitio celeriter serpente.

Sphacelus, Lin. 234. Vog. 328. Boerh. 419, 457.

OPHTHALMIA. (8)

Rubor et dolor oculi; lucis intolerantia; plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. gen. 196. Lin. 43. Vog. 341. Sag. 231. Junck. 24. Macb. p. 423.

Chemosis, Vog. 46.

Ophthalmites, Vog. 47.

Inflammatio oculorum, Hoffm. ii, 165.

Species et varietates sunt,

¶ 1. Idiopathica.

1. Ophthalmia (*membranarum*) in tunica adnata, et ei subjacentibus membranis, five tunicis oculi.

Variat

OPHTHALMIA. (8)

Variat

a. Gradu phlogosis externæ.

Ophthalmia taraxis, sp. 1. humida, sp. 8. chemosis, sp. 12. erysipelatoſa, sp. 7. puſtuloſa, sp. 6. phlyctænodes, sp. 21.

b. Affectis tunicis internis.

Ophthalmia choroideæ, sp. 13. tenebricoſa, sp. 10.

2. Ophthalmia (*tarſi*) cum tumore, eroſione, et exudatione glutinoſa tarſi palpebrarum.

Ophthalmia trachoma, sp. 4. et ſicca, sp. 5.

¶ 2. Symptomaticæ.

a. A morbo ipſius oculi.

Ophthalmia angularis, sp. 14. tuberculoſa, sp. 3. trichiaſis, sp. 2. cancroſa, sp. 15. a ſynechia, sp. 16. a lagophthalgo, sp. 17. ab elcomate, sp. 18. ab ungue, sp. 19. a corneæ fiſtula, sp. 20. uveæ, sp. 22.

b. A morbis aliarum partium vel totius corporis.

Ophthalmia metaſtatica, sp. 24. ſcrophuloſa, sp. 9. ſyphilitica, sp. 11. febricoſa, sp. 23.

PHRENITIS. (9)

Pyrexia vehemens; dolor capitis; rubor faciæ et oculorum; lucis et ſoni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. gen. 101. Lin. 25. Sag. 301. Boerh. 771. Hoffm. ii, 131. Junck. 63. Macbr. p. 432.

Phreniſmus, Vog. 45. Cephalitis, S. gen. 109. Sag. 310.* Sphaceliſmus, L. 32. Siraſis, Vog. 34.

Phrenitidis idiopathicæ ſpeciem unicam hic ponere licet, et cujus ſynonyma ſequentia eſſe putamus:

Phrenitis vera, sp. 1. Boerh. 771. P. idiopathica, Junck.

* Cum ſymptomata nulla dentur quæ ſemper phlegmaſiam cerebri a phlegmaſia membranarum ejus, ſive meningum, certo diſtinguere poſſint; neque ſectiões cadaverum diſtinctiones a Sauvageſio, Linnæo, et Sagarō, adhibitas confirment, Cephalitidem, Sauv. gen. 109. Sag. gen. 310. et Sphaceliſmum. Lin. 32 pro generibus a Phrenitide diverſis admittere nolui, et ea hic ideo, uti ſynonyma, ſub titulo Phrenitidis, poſui.

Recte monet Vogelius ſigna phrenitidis, vel ut vocat phreniſmi, hoc eſt, inflammationis cerebri aut membranarum ejus, admodum ambigua eſſe.

PHRENITIS. (9)

Junck. 63. Cephalalgia inflammatoria, sp. 9.
Cephalitis spontanea, sp. 3. siriasis, sp. 4. Lit-
triana, sp. 5. Siriasis, Vog. 34.

Phrenitides symptomaticæ sunt,

Phrenitis synochi pleuriticæ, sp. 2. synochi san-
guineæ, sp. 4. calentura, sp. 11. Indica, sp. 12.
Cephalitis Ægyptiaca, sp. 1. epidemica, ann. 1510.
sp. 6. verminosa, sp. 7. cerebelli, sp. 8. Phre-
nitis miliaris, sp. 3. variolosa, sp. 5. morbillo-
sa, sp. 6. a plica, sp. 8. aphrodisiaca, sp. 9.
a tarantismo, sp. 14. hydrophobica, sp. 15. a
dolore, sp. 13. Cephalitis traumatica, sp. 2.

CYNANCHE. (10)

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; de-
glutitio et spiratio difficiles, cum angustia in faucibus
sensu.

Cynanche, S. gen. 110. Lin. 33. Sag. 300.

Angina, Vog. 49. Hoffm. ii, 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, Boerh. 798.

Species sunt,

1. Cynanche (*tonfillaris*) membranam faucium muco-
sam, et præcipue tonsillas, tumore et rubore affi-
ciens, cum febre synocha.

Cynanche tonsillaris, sp. 1.

Anginæ inflammatoriæ, sp. 5. Boerh. 805.

2. Cynanche (*maligna*) tonsillas et membranam fau-
cium mucosam afficiens tumore, rubore, et crustis
mucosis coloris albescentis vel cineritii, serpentibus,
et ulcera tegentibus; cum febre typhode et exan-
thematis.

-Cynanche maligna, sp. 3.

———— ulcerosa, var. a. Journ. de Med. 1758.

———— gangrænosa, var. b. Ibid. 1756.

Ulcera faucium et gutturis anginosa et lethalia.

Hispanis Garotillo, Lud. Mercat. consult. 24.

Angina ulcerosa, clar. Fothergill, Account of the
ulcerous fore throat, edit. 1751, Huxham on the
malignant ulcerous fore throat, from 1751 to
1753.

Febris epidemica cum angina ulcusculosa, Douglas
Practical history, Boston 1736. Lond. med. obs.

... 20.

Angina

CYNANCHE. (10)

Angina epidemica, Ruffel œcon. natur. pag. 105.

— gangrænosa, Withering's diff. inaug. Edinb. 1766.

— suffocativa, Bard's Inquiry, New-York, 1771.

— maligna, Johnstone on the malignant angina, &c. Worcester 1779. Wall's works, p. 58.

3. Cynanche (*trachealis*) respiratione difficili, inspiratione strepente, voce rauca, tussi clangosa, tumore fere nullo in faucibus apparente, deglutitione parum difficili, et febre synocha.

Cynanche trachealis, sp. 5.

— laryngea Auctorum, Eller. de cogn. et curand. morb. sect. 7.

Anginæ inflammatoriæ, sp. 1. Boerh. 801.

Angina latens et difficilis, Dodon. obs. 18.

— interna, Tulp. lib. i, obs. 51.

— perniciosa, Greg. Horst. observ. l. iii, obs. 1.

An hæc Sauvagesii synonyma et sequentia ad eundem morbum pertinent, videant experti; sequentia autem ad morbum characteris dati manifesto pertinere videntur :

Suffocatio stridula, Scotis, the Croup. cl. Home on the Croup.

Asthma infantum, Millar on the asthma and chin-cough.

— infantum spasmodicum, Rush's dissertation, London 1770.

Cynanche stridula, Crawford, dissert. inaug. Edinb. 1771.

Angina epidemica, anno 1743. Molloy apud Ruttty's history of the weather.

Morbus strangulatorius, Starr, Phil. Transact. No. 495. §

— truculentus infantum, Francof. ad Viadrum et in vicinia grassans, anno 1758. C. a Bergen. A. nova N. C. tom. ii, p. 157.

Angina inflammatoria infantum, Ruffel, Oecon. nat. p. 70.

Catarrhus suffocativus Barbadenfis, anno 1758. Hilary's Barbadoes, p. 134.

Angina polyposa, five membranacea Michaelis, Ar-

H h

gentorati

§ An hic morbus ad Cynanchem malignam, an ad trachealem pertinet, mihi non certo constat, et sæpius de eorundem morborum apud plures auctores descriptionibus itidem incertus sum.

CYNANCHE. (10)

gentorati 1778, et Auctores ab ingenioso et erudito Michaelē allegati.

Morbus anginae polyposæ analogus, Soc. Royale ii, hist. p. 206.

4. Cynanche (*pharyngea*) cum rubore in imis præsertim faucibus; deglutitione maxime difficili, dolentissima; respiratione satis commoda, et febre synocha. Cynanche pharyngea, sp. 6. Eller de cogn. et cur. sect. 7.

Anginae inflammatoriæ, sp. 4. Boerb. 804.

5. Cynanche (*parotidea*) cum tumore externo parotidum et maxillarum glandularum magno; respiratione et deglutitione parum læsis; febre synocha plerumque leni.

Cynanche parotidæa, sp. 14. Gallis Oreillons et Ourlès, Tissot Avis au peuple, No. 116. Encyclopedie, au mot Oreillons.

Angina externa, Anglis, the Mumps, Russel, Oecon. natur. p. 114. Scotis, the Branks.

Catarrhus Bellinfulanus, sp. 4.

Offervazioni di Girol. Gaspari, Venez. 1731.

— di Targ. Tozzeti, Racolta 1ma, p. 176.

Cynanche purpuro-parotidæa, S. sp. 15, vel ad malignam, sp. 3, vel ad Scarlatinam pertinere videtur.

Cynanchæ symptomaticæ sunt,

a. A causis internis.

Cynanche epidemica, S. sp. 2. Amphimerina anginosa, sp. 12. Febris anginosa, Huxham de aëre.

Cynanche prunella, S. sp. 12. exanthematica, sp. 4. arthritica, sp. 10. hepatica, sp. 8. a dysenteria, sp. 13.

b. A causis externis.

Cynanche a deglutitis, sp. 9. mercurialis, sp. 11.

Cynanche thymica, S. sp. 7, raro inflammatoria est, et vix hujus loci.

PNEUMONIA. * (11)

Pyrexia; dolor in quadam thoracis parte; respiratio difficilis; tussis.

Febris pneumonica, Hoffm. ii, 136. Macb. p. 435.

Species

* Ab omni ævo, in hunc fere diem, scriptores medici, et eos secuti Nosologi omnes, phlegmasiarum pectoris interni duo esse genera, peripneumoniam scilicet

PNEUMONIA. (II)

Species sunt,

- I. Pneumonia (*peripneumonia*) pulsu non semper duro, aliquando molli; dolore thoracis obtuso; respiratione perpetuo difficili, sæpe non nisi trunco corporis erecto exercenda; faciei tumidæ colore purpureo; tussi plerumque humida, sæpe cruenta.

Peripneumonia, S. gen. 112. Lin. 34. Vog. 51.

Sag. gen. 311. Boerh. 820. Juncker 67.

¶ I. *Idiopathicæ simplices.*

Peripneumonia pura five vera Auctorum, sp. I.

gastrica, sp. II. Morgagn. de caus.
et sed. epist. xx, art. 30, 31.†

Variat gradu,

Peripneumonia catarrhalis, sp. 6.

notha||, Sydenh. f. 6, c. 4. Boerh. 867.

Morgagni de caus. et sed. epist. xxi, 11—15.

¶ 2.

et pleuritidem, statuerunt. Recentiores autem ex sectione cadaverum didicerunt, veteres de sede, ideoque de differentia horum morborum sæpe falso statuisse, et quem in pleura costali sedem habere veteres putabant, sæpius in pleura pulmonem investiente situm fuisse invenerunt anatomici recentiores. Novimus, porro, quod si quidem morbi illi diversam aliquando sedem habuerint, id tamen per symptomata vix certo cognosci posse; et, utcumque sit, morbos illos quatenus, quovis modo distinctos, revera maxime esse affines, plerumque simul conjunctos, et eosdem distinxisse ad usus medicinæ parum omnino contulisse. Hisce igitur perpensis, phlegmasias pectoris interni non nisi genus unicum constituere, cum Hoffmanno expetitissimo putamus; quamobrem hujusmodi genus hic sub nomine Pneumoniæ posuimus. Symptomata, quæ pro characteristicis adhibuimus, cum quæ in omni phlegmasia pectoris interni semper adsint, et in qualibet præcipua sint, ea recte characterem genericum constituere videntur.

An species diversæ vere statuendæ sint, anceps hæreo. Sed, opinionibus et consuetudini medicorum aliquid concedere volens, peripneumoniæ et pleuritidis quatenus, vel ex opinione medicorum vel ex propria observatione, eas distinguere liceat, characteres specificas dedi. Interim tamen observari velim, inter illos morbos, utcumque aliquando distinctos, limites accuratos plerumque non ponendos esse.

† Ad Peripneumoniam, an ad Pleuritidem, potius pertinet hæc varietas, mihi non certo constat.

¶ Peripneumoniam Notham a Vera gradu tantum differre opinor; ideoque uti varietas hic apposui. In eo quidem differre puto, quod in peripneumonia Notha inflammatio sit lenior, et affluxus humorum in pulmones copiosior, quam in Vera. Cum autem in Notha symptomata pyrexia, doloris, dyspnææ, et tussis, vario gradu et varia ratione conjuncta, adesse possint, minime mirandum si hujus morbi apud diversos auctores descriptiones parum uniformes sint, et necne morbus sub titulo peripneumoniæ nothæ a diversis auctoribus descriptus idem revera sit, dubia quædam moverit doctissimus Morgagni. Perpensis tamen omnibus de hac re dictis, et cum observationibus pluribus apud ipsos ægros factis collatis, nihil dubito quin morbus a Sydenhamo et Boerhaavio, sub titulo Peripneumoniæ nothæ descriptus, unus idemque sit, nec ab eo, morbum a Valsalva in Francisco Coralio, vel morbum in celebri Antonio Valsinerio, ab ipso Morgagni observatum, re ipsa diversum fuisse puto. Vide First Lines of the Practice of Physic, edit. 1784. § cccxxvi.

PNEUMONIA. (II)

¶ 2. *Idiopathicæ complicatæ febre.* †

Peripneumonia putrida, S. sp. 2. ‡ ardens, sp. 3.
maligna, sp. 4. typhodes, sp. 5. Amphimerina
peripneumonica, sp. 15.

¶ 3. *Symptomaticæ.*

Peripneumonia arturitica, S. sp. 7. exanthematica,
sp. 9. phthysicorum, sp. 8. hydrophobia, sp. 10.
rachialgica, sp. 12.

2. Pneumonia (*pleuritis*) pulso duro; dolore, plerumque lateris, pungente, sub inspiratione præsertim aucto; decubitu in latus molesto; tussi dolentissima, initio sicca, postea humida, sæpe cruenta.

Pleuritis, S. gen. 103. Lin. 27. Vog. 50. Sag. 303. Boerh. 875. Junck. 67.

Paraphrenesis, S. gen. 102. Lin. 26.*

Paraphrenitis, Vog. 55. Boerh. 907.

Diaphragmitis, Sag. gen. 304.

¶ 1. *Idiopathicæ simplices.*

Pleuritis vera, S. sp. 1. Boerh. 875. Verna, princeps morb. acut. pleuritis, lib. i, cap. 2. 3. Zeviani, della parapleuritide, cap. 3. Morgagn. de sed. et caus. morb. ep. xx, artic. 56, xxi, 45. Wendt. de pleuritide, apud Sandifort. thes. ii.

— pulmonis, S. sp. 2. Zevian. dell. parapleur. iii, 28, &c.

Pleuripneumonia, pleuro-peripneumonia, peripneumo-pleuritis Auctorum. Baronius de pleuripneumonia.

III.

† Cum morbi diversi simul complicati sint, sæpe, quis illorum pro morbo primario habendus sit dubitari potest; nec in hac re me ubique recte iudicatum iri spondeo. In quibusdam mei ipsius iudicio usus sum; in plerisque vero Sauvagesium secutus sum. Sufficere plerumque ratus ob oculos studiosorum complicationes istas quomodocunque ponere.

‡ Sauvagesium, ut soleo, secutus, hanc et tres sequentes species quasi diversas recensui, cum tamen pro una eademque habere vellem.

* In morbo qui vulgo Paraphrenesis vel Paraphrenitis, et rectius a Sagaro Diaphragmatis, appellatur, pleuræ super diaphragma extensæ inflammationem adesse, et in ea morbum consistere agnoscunt medici omnes; non recte igitur uti genus a pneumonia diversum recensuerunt Nosologi.

Nec quidem pro diversa a pleuritide specie recenseri potest; cum plerumque nulla alia præter illa pleuritidis symptomata ostendit. Quæ a plurimis huic morbo tributa sunt risus nempe sardonicus, et delirium phreniticum, certe non semper adiunt. Primum quod nunquam vidi, certe rarissimum est; et posterius, alias etiam pneumoniæ species sæpe comitatur, nec tantum a parte pleuræ inflammata, quantum a gradu pyrexiae, vel diathesis phlogisticæ, pendere videtur.

PNEUMONIA. (II)

Ill. Halleri opuscul. patholog. ob. 13. Morgagn. de fed. et caus. epist. xx et xxi. passim. Cleghorn Minorca, p. 247. Triller de pleuritide, aph. 1, 2, 3. cap. i, 8. Huxham dis. on pleurifies, &c. ch. i. Ill. Pringle dis. of the army, p. 147.

Pleuritis convulsiva, S. sp. 13. Bianch. hist. hep. vol. i, p. 234.

—— hydrothoracica, sp. 15. Morgagn. de caus. et fed. xx, 34.

—— dorsalis, sp. 3. Verna, p. iii, c. 8.

—— mediastini, sp. 4. P. Sal. Div. de affect. part. cap. 6. Friend, hist. med. de Avenzoare.

Mediastina, Vog. 52.

Pleuritis pericardii, sp. 5. Verna, p. iii, c. 9.

Parapleuritis Zeviani della parapleuritide.

Pleurodyne, parapleuritis, sp. 19.

Paraphrenesis diaphragmatica, sp. 1. De Haen, rat. med. i, 7. iii, p. 31.

—— pleuritica, sp. 2.

—— hepatica, sp. 3.

De inflammatione mediastini, pericardii, et diaphragmatis, vide Morgagn. de caus. et fed. viii, 13. xxi, 35, 36, 46. xlv, 16. Van Swieten ad Boerhaav. 913.

¶ 2. *Complicatae.*

a. Febre.

Pleuritis biliosa, S. sp. 7. erysipelatosa, sp. 11. biliosa, Bianch. hist. hep. vol. i, p. 236. putrida, sp. 9. Synochus pleuritica, sp. 5. Pleuritis pestilens, sp. 16. miliaris, sp. 20.

b. Catarrho.

Pleuritis catarrhalis, sp. 10.

—— lymphatica, Bianch. hist. hep. i, p. 233.

¶ 3. *Symptomaticae.*

Pleuritis traumatica, sp. 6.

—— verminosa, sp. 8. Verna pleur. p. i, c. 1. p. iii, c. 11. Morgagn. de fed. et caus. xxi, 43, 44.

—— stomachalis, Bianch. hist. hep. i, p. 232.

Pleurodyne verminosa, sp. 2.

Pleuritis lactea, sp. 17.

—— Polonica, sp. 18.

¶ 4. *Falsae.*

Pleuritis hepatica, sp. 12. Panarol. Pentac. i, o. 37.

—— splenica, sp. 19.

PNEUMONIA. (11)

Pneumoniæ sequelæ sunt,

1. VOMICA. Post pneumoniam, resolutione quadam non terminatam, dyspnœa et tussis perstantes, cum decubitu in latus sanum difficili, et febre hæctica.

Vomica, Boerh. 835. Junck. 35. †
Pleurodyne vomica, S. sp. 21.

2. EMPYEMA. Post pneumoniam suppuratione terminatam, sæpe post vomicam, remissio doloris, dum perstant dyspnœa, tussis, decubitus difficilis, et febris hæctica, sæpe cum sensu liquoris in pectore fluctuantis, et signis hydrothoracis.

Varietates ex Sauvagesio, licet non semper distinguendas, hic subjungimus:

Empyema a peripneumonia, sp. 1. vomica, sp. 2. pleuræ, sp. 3. mediastini, sp. 4. diaphragmatis, sp. 5. intercostale, sp. 6.

CARDITIS. † (12)

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inæqualis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. gen. III. Vog. 54.

Pericarditis, Vog. 53.

¶ 1. Idiopathica.

Carditis spontanea, S. sp. 1. Senac. Traité de cœur.

1. iv, ch. 7. Meckel, Mem. de Berlin, 1756.

Erysipelas pulmonis, Lomm. observ. lib. ii.

¶ 2. Symptomática.

Carditis traumatica, S. sp. 2. Senac. ibid. ch. 6.

PERITONITIS. (13)

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Si signa darentur quibus dignosci queant, sequentes pro speciebus peritonitis recenseri possent.

1. Peritonitis (*propria*) in peritonæo strictius dicto, sive in peritonæo, abdomen intus succingente.

Peritonitis,

† Vomica vocamus quam vomicam clausam appellant medici, et inde character noster. Characteres autem vomicæ apud Linnæum et Vogelium vomicam apertam tantum respiciunt; ideoque ad illos auctores hic non referimus.

‡ Recte omnino dixit Vogelius, Carditidis symptomata fere eadem esse ut in peripneumonia, sed graviora, et ita etiam sensisse videtur Linnæus, cum apud illum neque Carditis, neque Pericarditis, inter morbos phlogisticos recensetur. Certe novimus, pericardium sæpe inflammatum fuisse sine aliis præter peripneumonia signis.

PERITONITIS. (13)

Peritonitis, Vog. 62. Lieutaud. hist. anat. med.
l. i, obs. 3. Raygerus apud eund. l. i, obs. 341.
Morgagn. de sed. lvii, 20.

2. Peritonitis (*omentalis*) in peritonæo, per omentum extenso.

Epiploitis, S. gen. 106. Sag. 308.*

Omentitis, Vog. 61.

Omenti inflammatio, Boerh. 958. et Van Swieten
comm. Stork. ann. med. i, 132. Hulme on the
puerperal fever.

3. Peritonitis (*mesenterica*) in peritonæo, per mesenterium extenso.

Mesenteritis, Vog. 60.

Enteritis mesenterica, S. sp. 4.

GASTRITIS. (14)

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor,
ingestis quibuscumque auctus; vomendi cupiditas, et ingesta
protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. gen. 104. Lin. 28. Vog. 56. Sag. 306.

Ventriculi inflammatio, Boerh. 951.

Febris stomachica inflammatoria, Hoffm. ii, 120.

¶ 1. *Idiopathica*.

a. A causis internis.

1. Gastritis (*phlegmonodea*) dolore acuto, pyrexia vehementi. †

Gastritis legitima, S. sp. 1. Eller, de cogn. et cur.
morb. sect. xi. Haller. obs. 14. hist. 3. Lieut.
hist. anat. med. lib. i, 74.

—— erysipelatoſa, S. sp. 4. ‡

Cardialgia inflammatoria, S. sp. 13. Tralles de
opio, sect. ii, p. 231.

b. A causis externis.

Gastritis a veneno, S. sp. 3.

2. Gastritis

* Tum Epiploitis, tum Mesenteritis, ut Peritonitidis species hic recensetur, non
quam quod ejusdem continuæ membranæ sint affectiones, quam quod nulla fere
signa dari possunt, quibus a peritonitide, strictius dicta, dignosci queant.

† Tum gastritis, tum enteritis duarum esse specierum, quarum una phlegmono-
dea, altera erysipelatoſa dici potest, mihi ex pluribus observationibus satis certo
constat; et ejusmodi species itaque hic recensui, etsi fatendum sit, gastritidis erysi-
pelatoſæ, et magis adhuc enteritidis erysipelatoſæ, signa sæpe obscura et incerta
esse. De his vero monere volui ut diligentius inquirent posteri.

‡ Quam hic gastritidem erysipelatoſam dixit Sauvagesius, omnino phlegmono-
deam esse mihi videtur.

GASTRITIS. (14)

2. Gastritis (*erythematica*) dolore, et pyrexia lenioribus, rubore erysipelatoso in faucibus apparente.

¶ 2. *Symptomaticæ.*

Gastritis exanthematica, S. sp. 5.

———— herniosa, sp. 7.

De gastritide sternocostali, sp. 6. non liquet.

ENTERITIS. (15)

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter stricta.

Enteritis, S. gen. 105. Lin. 29. Vog. 57. Sag. 307.

Intestinatorum inflammatio, Boerh. 959.

Febris intestinatorum inflammatoria ex mesenterio, Hoffm. ii, 170.

¶ 1. *Idiopathicæ.*

Species sunt,

1. Enteritis (*phlegmonodæa*) dolore acuto, pyrexia vehementi, vomitu et alvo stricta.

Enteritis iliaca, S. sp. 1. colica, sp. 2. Boerh. 963.

2. Enteritis (*erythematica*) dolore et pyrexia lenioribus, sine vomitu, et cum diarrhœa.

¶ 2. *Symptomaticæ.*

Enteritis flatulenta, S. sp. 3. enterocelica, sp. 5.

HEPATITIS. (16)

Pyrexia; hypochondrii dextri tensio, et dolor sæpe pungens pleuritici instar, sæpius obtusus; dolor ad claviculam et summum humeri dextri; decubitus in sinistrum latus difficilis; dyspnœa; tussis sicca; vomitus; singultus. †

Hepatitis, S. gen. 113. Lin. 35. Vog. 58. Sag. gen. 312. Boerh. 914. Hoffm. ii, 14. Junck. 66. Macbr. p. 446.

Variat,

- a. Acuta, signis in charactere dictis dignoscenda.
b. Chronica. Hæc sæpe nulla, quibus dignoscatur, signa præbet; aliquando tamen eandem adesse suspicari potest, ex hepatitidis causis quibusdam prægressis

† Inter symptomata hepatitidis, colorem faciei flavescentem, posuit tum Sauvagesius, tum Sagarus, et hic etiam addit, urinas icteritias, biliosas, et serum sanguinis missi et crusta subflava; sed hæc symptomata bilis regurgitantis vel resorptæ rectius a Linnæo et Vogelio omissa fuisse censeo; nam ejusmodi symptomata non tantum non perpetua, sed etiam rarissima sunt.

HEPATITIS. (16)

sis, ex sensu quodam plenitudinis et gravitatis in hypochondrio dextro, ex doloribus plus minusve pungentibus in eadem parte subinde perceptis, ex dolore quodam a presso hypochondrio dextro, vel a decubitu in latus sinistrum sentito, et denique ex pyrexia leviore cum dictis signis subinde infestante.

Sauvagesii species sunt,

Hepatitis erysipelatoſa, sp. 1. *

———— pleuritica, sp. 2. Bianch. hist. hep. tom. i, p. 388.

Pleuritis hepatica, sp. 12.

Hepatitis cystica, sp. 4†

———— obscura, sp. 5.

Pro specie male recensetur morbus secundarius:

Hepatitis suppurans, sp. 6. Cheston's pathol. inq. ch. iii, sect. 2, et app. case 12.

Hepatalgia apostematosa, sp. 7.

SPLENITIS. (17)

Pyrexia; hypochondrii sinistri tensio, calor, tumor, et dolor pressu auctus; absque signis nephritidis.

Splenitis, S. gen. 114. Lin. 36. Vog. 59. Junck. 67. Sag. 313. Mach. p. 448.

Lienis inflammatio, Boerh. 958, et ill. Van Swieten comm.

Una tantum species recensetur.

Splenitis phlegmonodea, S. sp. 1. Forest, lib. xx. obs. 5, 6. De Haen, apud Van Swieten, p. 958.

Pleuritis splenetica, sp. 19.

Splenalgia suppuratoria, sp. 3.

NEPHRITIS. (18)

Pyrexia; dolor in regione renis, sæpe ureteris iter sequens; mictio frequens urinæ, vel tenuis decoloris, vel ruberrima;

I i

* De erythemate vel erysipelate, quod vocant, viscerum, minus recte sensisse medicos cenſeo; nam, me saltem iudice, erythema non nisi superficies illas internas quas tegit epithelion et tunica villosa, epidermidi externæ continua et analogâ, afficere potest. Nullum igitur eryſipelas pulmonis, de quo scripsit Lommius, Obſerv. lib. 2. agnosco; nec hepatitidem quandam a Sauvageſio hic eryſipelatoſam recte dictam eſſe puto, et hepatitidem quidem ex Amato hic deſcriptam revera phlegmonodeam fuiſſe credo.

† Quin ex contuſione vel aliis cauſis oriri poſſit inflammatio cyſtidis fellæ, vel ductus choledochi, nullus dubito; ſed quibus ſignis cognosci queat, niſi in uno caſu, non novi. In ictero, ſcilicet, cum dolore in regione epigaſtrica acuto, a calculo, ut videtur, in ductu choledochi hærente, inflammationem ductus cyſtici sæpe ortam fuiſſe, omnino cenſendum, et ne oriatuſ ſemper cavendum.

NEPHRITIS. (18)

mæ; vomitus; cruris stupor; testiculi ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. gen. 115. Lin. 37. Vog. 65. Sag. 314.

Species

¶ 1. *Idiopathica*. Spontanea.

Nephritis vera, sp. 1.

¶ 2. *Symptomaticæ*.

Nephritis calculosa, S. sp. 2. Nephralgia calculosa, sp. 1. arenosa, sp. 2. purulenta, sp. 7. Cheston's inq. ch. 2. arthritica, sp. 3.

CYSTITIS. (19)

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. gen. 108. Lin. 31. Vog. 66. Sag. 309.

Inflammatiō vesicæ, Hoffm. ii, 157.

Species sunt,

1. A causis internis.

Cystitis spontanea, sp. 1.

2. A causis externis.

Cystitis a cantharidibus, sp. 2. traumatica, sp. 3.

HYSTERITIS. (20)

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, Lin. 38. Vog. 63.

Metritis, S. gen. 107. Sag. gen. 315.

Inflammatiō et febris uterina, Hoffm. ii, 156.

Species sunt,

Metritis puerperarum, S. sp. 1. typhodes, sp. 2. lactea, sp. 3.

RHEUMATISMUS. (21)

Morbus ab externa, et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.

Rheumatismus, S. gen. 185. Lin. 62. Vog. 138.

Boerh. 1490. Junck. 19.

Dolores rheumatici et arthritici, Hoffm. ii, 317.

Myositis, Sag. gen. 301.

Lumbago, S. gen. 212. Vog. 138. Sag. 169.

Ischias, S. gen. 213. Vog. 138. Sag. 170.

Pleurodyne, S. gen. 148. Vog. 138. Sag. 254.

Macb. p. 511.

Species

RHEUMATISMUS. (21)

Species idiopathica,

Rheumatismus acutus, S. sp. 1. vulgaris, sp. 2.

Variat sede.

a. In musculis lumborum.

Lumbago rheumatica, S. gen. 212, sp. 1.

Nephralgia rheumatica, sp. 4.

b. In musculis coxendicis.

Ischias rheumaticum, S. gen. 213, sp. 10.

c. In musculis thoracis.

Pleurodyne rheumatica, S. gen. 148, sp. 3.

Pleuritis spuria, Boerh. 878.

Species symptomaticæ,

Lumbago plethorica, S. sp. 3. Ischias sanguineum, sp. 2. Pleurodyne plethorica, sp. 1. Rheumatismus hystericus, sp. 7. Ischias hystericum, sp. 3. Pleurodyne hysterica, sp. 6. Rheumatismus saltatorius, sp. 8. Pleurodyne flatulenta, sp. 4. a spasmate, sp. 9. Rheumatismus scorbuticus, sp. 4. Lumbago scorbutica, sp. 5. Pleurodyne scorbutica, sp. 11. Ischias syphiliticum, sp. 7. Pleurodyne venerea, sp. 5. Lumbago sympathica, sp. 13. —a mesenterii glandulis induratis, —a pancreate tumido, purulento, scirrroso, putri, —ab induratis pyloro, vena cava, pancreate, —a rene scirrroso, putrefacto, —ab abscessu circa venæ cavæ bifurcationem, —a vermibus intra renes. —Lumbago a faburra, sp. 8. Pleurodyne a cacochylia, sp. 7. Rheumatismus saltatorius verminosus, sp. 8. Ischias verminosum, sp. 8. Pleurodyne verminosa, sp. 2. Rheumatismus metallicus, sp. 10. Lumbago a hydrothorace, sp. 14. pseudoischuria, sp. 16. ex aneurismate, sp. 11. Pleurodyne ex aneurismate, sp. 10. a rupto œsophago, sp. 20. rachitica, sp. 13. Ischias a sparganosi, sp. 5. Pleurodyne catarrhalis, sp. 14. phthistica, sp. 8. Rheumatismus necroseos, sp. 14. convulsivus, sp. 15. Ischias gravidarum, sp. 4. Lumbago partus, sp. 7. a nisu, sp. 10. Ischias a subluxatione, sp. 9. Rheumatismus dorsalis, sp. 11. Lumbago a satyriasi, sp. 15. Rheumatismus febricosus, sp. 9. Lumbago febrilis, sp. 4. Pleurodyne febricosa, sp. 15. Rheumatismus miliaris, sp. 12. Lumbago miliaris, sp. 9. Pleurodyne miliaris, sp. 16.

Rheumatismi

RHEUMATISMUS. (21)

Rheumatismi sequela est,

ARTHRODYNIA.* Post rheumatismum, nifum violentum, vel subluxationem; dolores artuum vel musculorum, sub motu præfertim, aucti, plus minufve fugaces, calore lecti vel alio externo levati; artus debiles, rigidi, facile, et sæpe sponte frigefcentes; pyrexia nulla; tumor plerumque nullus.

Rheumatismus chronicus Auctorum:

Lumbago et ischias aliquando morbi acuti, sed cum sæpius chronici sint, plerumque ad hunc locum pertinent. Lond. med. obs. iv, 5.

ODONTALGIA. † (22)

Rheumatismus vel arthrodynia maxillarum a carie dentium.

Odontalgia, S. gen. 198. Linn. 45. Vog. 145.

Sag. gen. 157. Junck. 25. Macbr. 509.

— five rheumatismus odontalgicus, Hoffm. ii, 330.

Varietates ex Sauvagesio sunt,

Odontalgia cariosa, sp. 1. scorbutica, sp. 4. catarrhalis, sp. 3. arthritica, sp. 6. gravidarum, sp. 2. hysterica, sp. 3. stomachica, sp. 9.

PODAGRA. ‡ (23)

Morbus hæreditarius, oriens sine causa externa evidente, sed

* Si, ut quidam statuunt, rheumatismus chronicus ab acuto, genere omnino diversus sit, nomen simplex, uti genus omne, habere oportet, et hujusmodi nec inceptum, ut puto, imposui. Porro, cum pro sequela rheumatismi acuti vel rheumatismi simpliciter dicendi, rheumatismum chronicum dictum semper habeo, et cum inter utrumque morbum sæpe limites vix statuendi sint, ideoque pro diverso genere rheumatismum chronicum recensere vix potui; rheumatismus tamen chronicus exquisitus ab acuto natura adeo diversus evadit, et medelam adeo diversam exposcit, ut merito nomine prorsus diverso insigniri possit; et si quis pro genere etiam diverso ponere velit, per me profecto licet.

† In priori Nosologiæ methodicæ nostræ editione, Odontalgiam pro rheumatismi specie habui, ac recensui; sed, cum eam a rheumatismo alio quovis causam prorsus diversam, acre, scilicet, membranas sensibiles irritans, habere observaverim, pro genere, a rheumatismo diverso, etiam habere vellem, et hic itaque uti genus diversum posui.

Etiam si odontalgiam a frigore et aliis irritamentis aliquando fuscitari viderur, cariem dentium, diathesin phlogisticam inducentem, semper subesse puto. Sunt fortassis alii morbi, ab acri irritante orti, qui rheumatismum exacte satis referunt; sed de iis nobis non constat. Si tamen revera existeret, ad mentem clariss. D. Cottunnii, Ischias nervosa, rheumatismi ab acri nervos irritante orti exemplum aliud haberemus; sed neque phenomena a Cottunnio relata, neque ratio medendi, neque sectiones cadaverum, ejusmodi morbum unquam existisse mihi probant; ideoque neque hic, neque alibi, Ischiadem nervosam Cottunnii inter rheumatismi species recensui.

‡ Arthritis nomen, utpote apud medicos ambiguum, rejeci, et Podagra nomine, utpote typum morbi præcipuum notante, cum celebri Boerhaavio usus sum.

PODAGRA. (23).

sed præeunte plerumque ventriculi affectione insolita; pyrexia; dolor ad articulum, et plerumque pedis pollicis, certe pedum et manuum juncturis, potissimum infestus; per intervalla revertens, et sæpe cum ventriculi, vel aliarum internarum partium, affectionibus alternans.

Podagra, Vog. 175. Boerh. 1254.

Febris podagrica, Vog. 69.

Arthritis, S. gen. 183. Lin. 60. Vog. 139. Sag. 142. Macb. p. 487. Lond. med. obs. vi, 20.

Dolor podagricus et arthriticus verus, Hoffm. ii, 339.

Dolores arthritici, Hoffm. ii, 317.

Affectus spastico arthritici, Junck. 46.

Recte forsitan Sauvagesius, more sibi insolito, hujus morbi non nisi unicam esse speciem affirmavit; sed varietates sequentes notari possunt:

1. Podagra (*regularis*) cum inflammatione artuum factis vehementi, per aliquot dies persistente, et paulatim cum tumore, pruritu, et desquamatione partis, recedente.

Arthritis podagra, sp. 1. rachialgica, sp. 11. || æstiva, sp. 4.

2. Podagra (*atonica*) cum ventriculi vel alius partis internæ atonia, et vel sine expectata aut solita artuum inflammatione, vel cum doloribus artuum lenibus tantum et fugacibus, et cum dyspepsia vel aliis atoniæ symptomatis, subito sæpe alternantibus.

Arthritis melancholica, S. sp. 6. hiemalis, sp. 2. chlorotica, sp. 5. athmatica, sp. 9.

3. Podagra (*retrograda*) cum inflammatione artuum subito recedente, et ventriculi vel alius partis internæ atonia mox infecta.

4. Podagra (*aberrans*) cum partis internæ inflammatione, vel non prægressa, vel prægressa, et subito recedente, inflammatione artuum.

Conjungitur aliquando aliis morbis podagra.

Arthritis rheumatica, sp. 3. scorbutica, sp. 7. syphilitica, sp. 8.

Ad podagram nequaquam pertinere videntur sequentes:

Arthritis rachitica, sp. 13. Americana, sp. 14. Bahamensis, sp. 15.

ARTHROPUOSIS.

¶ Ut solitus sum, Sauvagesii varietates, sive species quas vocat, hic appono; sed tum quod species ejus non semper bene definitæ sint, tum quod podagra regularis et atonica a se invicem non semper prorsus disjungantur, in apponendis locis idoneo Sauvagesii speciebus, me ubique accuratura fore. Secundo.

ARTHROPUOSIS. † (24)

Dolores artuum vel partium musculofarum, sæpe post contusionem, profundi, obtusi, diurni; tumor vel nullus, vel modicus, et diffusus; phlogosis nulla; pyrexia primum lenis, tandem hæctica, et simul partis apostema.

Lumbago psoadica, S. sp. 8. Fordyce, Practice of Physic, part ii, p. 70. Cheston, app. case 4 et 5.

—— apostematosa, sp. 12.

—— ab arthrocace, sp. 17.

Ischias ex abscessu, sp. 6.

Morbus coxarius, De Haen, Rat. med. vol. i, c. 32.

ORDO III. EXANTHEMATA.

Morbi contagiosi, semel tantum in decursu vitæ aliquem afficientes; cum febre incipientes; definito tempore apparent phlogoses, sæpe plures, exiguæ per cutem sparsæ. *

Exanthemata, Sag. cl. x.

Phlegmasiæ exanthematicæ, Sauv. cl. iii. ord. 1.

Morbi exanthematici, Lin. cl. i. ord. 2.

Febres exanthematicæ, Vog. cl. i. ord. 2.

VARIOLA.

† Cum neque rheumatismum neque podagram in apostema unquam abire credo, est hic morbus ab utroque certe diversus, ideoque pro genere peculiari recensendus. Utinam character ad eum a rheumatismo, arthrodynia, arthrocace, et phlogosi, distinguendum, ubique satis certo adhibendus, dari posset.

* Quo characterē recte definiri, et quibus limitibus circumscribi debeat hic ordo, admodum incertum est. Si eruptiones enim a contagione specifica ortæ, solæ pro exanthematis, et morbis hujus ordinis, habendæ sint; certe eruptiones a nulla contagione specifica, sed a quodam febris statu solum, pendentes, inter exanthemata genuina nequaquam recensendæ sunt. Ita Petechia a nobis omittitur, et fortitan tum Miliaria tum Aphtha omittenda esset. Dein, cum exanthemata pleraque contagiosa sint, et non nisi semel in decursu vitæ aliquem afficiant, omnino idoneum videtur ut hæc ab eruptionibus non contagiosis, quæ sæpe in decursu vitæ aliquem afficiant vel afficere possint, rite distinguantur. Variola igitur et erysipelas minus recte sub eodem ordine collocantur. Denique, cum eruptiones in morbo quodam non semper ejusdem sint formæ, nec semper, nec certo quovis morbi die, in illo morbo compareant, an ejusmodi morbus inter exanthemata recensendus sit, merito dubitari potest; ideoque an pestis ad exanthematum, an ad februm ordinem, referri debeat, dubito.

De hisce omnibus utiliter fortassis disputari potest; de iisdem vero certo statuere vix ausim; quod mihi tamen in Nosologia maxime idoneum esse videtur id ex characterē quem dedi satis patebit.

Cum autem ad characteres generum et specierum, ordinis character non omnino necessarius sit, hunc quodammodo neglexi, et hic morbos a Nosologis pro exanthematis habitos perseros recensui.

VARIOLA. (25).

Synocha contagiosa cum vomitu, et, ex epigastrio pressio, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quæ, spatio octo dierum, in supurationem, et in crustas demum abeunt, sæpe cicatrices depressas, five foveolas in cute, relinquentes.

Variola, S. gen. 92. Lin. 3. Sag. gen. 290.

Febris variolosa, Vog. 35. Hoffm. ii, 49.

Variolæ, Boerh. 1371. Junck. 76.

Species sunt,

1. Variola (*discreta*) pustulis paucis, discretis, circumscriptione circularibus, turgidis; febre, eruptione facta, protinus cessante.

Variola discreta benigna, sp. 1.

Variolæ regulares discretæ, Sydenh. sect. iii, c. 2.

—— discretæ simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola discreta complicata, sp. 2. Helv. sp. 2.

Variolæ anomalæ, Sydenh. sect. iv, cap. 6.

Variola discreta dysenteriodes, sp. 4. Sydenh. f. iv, cap. 1.

—— discreta vesicularis, sp. 5.

—— discreta crystallina, Mead de variol. cap. 2.

—— discreta verrucosa, sp. 6. Mead ibid.

—— discreta siliquosa, sp. 7. Friend oper. p. 358.

—— discreta miliaris, sp. 8. Helvet. obs. sp. 3.

2. Variola (*confluens*) pustulis numerosis, confluentibus, circumscriptione irregularibus, flaccidis, parum elevatis; febre post eruptionem persistente.

Variola confluens, sp. 9.

Variolæ regulares confluentes, ann. 1667. Sydenh. sect. iii, cap. 2.

—— confluentes simplices, Helvet. obs. sp. 1.

Variola confluens crystallina, sp. 10.

—— Japonica, Kempfer.

Vesiculæ Divæ Barbaræ, C. Pis. obs. 149. †

Variola confluens maligna, Helvet. obs. sp. 1.

—— confluens cohærens, sp. 11.

—— confluens maligna, Helvet. sp. 2.

—— confluens nigra, sp. 12. Sydenh. sect. v, c. 4.

—— confluens maligna, Helvet. sp. 3.

—— sanguinea, Mead de variolis, cap. 2.

—— confluens corymbosa, sp. 13.

—— confluens maligna, Helvet. sp. 4.

VARICELLA.

† Pro specie variolæ, has vesiculas hic posuit Sauvagesius. Sed vesiculæ a Pifone descriptæ potius ad pemphigum pertinere mihi videntur.

VARICELLA. (26)

Synocha. Papulæ post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolæ similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, Vog. 42.

— lymphatica, sp. 1.

Anglis, the Chicken-Pox, Ed. med. eff. vol. ii, a. 2, near the end. Heberden, Med. trans. art. 17.

RUBEOLA. (27)

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulæ exiguæ, confertæ, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeuntes.

Rubeola, S. gen. 94. Lin. 4. Sag. 293.

Febris morbillosa, Vog. 36. Hoffm. ii, 62.

Morbilli, Junck. 76.

1. Rubeola (*vulgaris*) papulis minimis, confluentibus, corymbosis, vix eminentibus.

Rubeola vulgaris, sp. 1.

Morbilli regulares, Sydenh. sect. iv, cap. 5.

Lond. med. obs. iv, 19, 20.

Variat

- a. Symptomatis gravioribus, et decursu minus regulari.

Rubeola anomala, sp. 2.

Morbilli anomali, Sydenh. sect. v, cap. 3.

- b. Comitante cynanche.

Rubeola anginosa, sp. 4. Edinb. essays, vol. v, a. 2.

- c. Comitante diathesi putrida.

Clar. Watson, Lond. med. obs. vol. iv, art. 11.

2. Rubeola (*variolodes*) papulis discretis eminentibus.

Rubeola variolodes, sp. 3. ‡ Scotis, the Nirls.

SCARLATINA. (28)

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tumens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus,

‡ Sauvagesium secutus, hunc morbum hic indicavi, etsi multum dubito an recte ad rubeolam referendus sit. Non solum enim forma papularum plurimum differt, sed, quod majoris momenti esse videtur, est plerumque absque symptomatis catarrhalibus, rubeolæ adeo propriis.

SCARLATINA. (28)

coalescentibus, post tres dies in squamulas furfuraceas abiens; superveniente dein sæpe anasarca.

Scarlatina, S. gen. 98. Vog. 39. Sag. 294. Junck. 75.

Species sunt,

1. Scarlatina (*simplex*) nulla comitante cynanche.

Scarlatina febris, S. sp. 1. Sydenh. sect. vi, cap. 2.

Soc. Royale i. mem. p. 10. Macbr. p. 380.

2. Scarlatina (*cynanchica*) cum cynanche ulcerosa. †

Scarlatina anginosa, S. sp. 6. Withering on the scarlet fever.

De scarlatina porriginosa, S. sp. 3. Sydenh. sect. vi, cap. 6. et Scarlatina variolode, S. sp. 5, nobis non liquet.

PESTIS. (29)

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate. †

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel anthracum.

Pestis, S. gen. 91. Lin. 2. Junck. 78.

Febris pestilentialis, Vog. 33. Hoffm. ii, 93.

Variat gradu,

Pestis benigna, sp. 2. Pestis Massiliensis class. 3.

Traité de la peste, pag. 41. Ejusdem pestis, cl. 5.

Traité, p. 228.

K k

Pestis

† Spatio quadraginta annorum Scarlatinam sexies vel septies in Scotia epidemicam observavi, et in unoquoque exemplo morbus illius speciei erat quam Scarlatinam anginosam vocat Sauvagesius. Nos Cynanchicam appellavimus, ex eo quod ulceribus faucium internarum fere semper comitata fuit. Cum in plerisque ægris morbus cynanchem malignam plurimum, aliquando satis exacte referebat, nec unquam scarlatinam epidemicam in omnibus ægris simplicem esse viderim, sæpe dubitavi annon scarlatina omnis sit cynanchica, et semper idem fere morbus ac cynanche maligna, supra inter Phlegmasias relata. Plures autem rationes in hanc sententiam ire non sinunt. Certe enim, testibus Sydenhamo perspicacissimo et aliis, scarlatina simplex, sive nulla comitante cynanche, aliquando observata fuit, et datur, itaque contagio quædam specifica efflorescentiam cutis scarlatinam, et hanc absque affectione quadam cynanchica, gignens. Quod, si aliquando etiam contagio sit, fauces afficiens, quæ plerumque etiam scarlatinam gignat, hoc nihil præterea mihi probare videtur, quam quod sit contagionum quarundam natura, ejusmodi ut simul tum fauces, tum cutem, afficere valeat. Cum tamen contagiones istæ ita differre possint, ut altera cutem, altera fauces magis et primario afficere proclivis sit, hanc differentiam inter scarlatinam et cynanchis malignæ contagionem semper inesse puto. In morbo epidemico, quem pro Scarlatina habui, aliquot ægrotantium sine cynanche quacunque erant; et in iis fere omnibus, quibus adfuit cynanche, hæc benigna admodum, ulcera tonsillarum, parva tantum nec serpentina, et plerumque pus bonum fundentia, exhibuit, et morbus raro funestus fuit. In cynanche vero maligna ægrotantes omnes in ipso morbi ingressu, cynanche correpti sunt, et hæc fere semper ulcera maligna, fœda, serpentina, gangrænosa, ostendebat. Morbus porro, putredinis et debilitatis indicia plurima prodens, plerumque exitialis evasit.

- † De charactere pestis, lites inter medicos sæpe ortæ sunt, nec facile dirimendæ, ita ut character quibuscunque pestis casibus adhibendus dari possit; sed sufficiat characterem dedisse qui in plerisque adhiberi queat.

PESTIS. (29)

- remittens, sp. 9.
 - vulgaris, sp. 1. Pestis Maffil. cl. 2. Traité, p. 38: Ejusd. cl. 2, 3, et 4ta. Traité, p. 225, &c. Waldschmidt. de peste Hollatica, apud Halleri, diff. pract. tom. v. Chenot de peste Transylvanica 1755, 1759. De Haen, Rat. med. pars xiv. Car. de Mertens De peste Moscouense 1771. Samoilowitz Memoire sur la peste de Moscou 1771. Ejusd. lettre sur l'expériences des frictions glaciales pour la guerison de la peste. Ejusd. mem. sur l'inoculation de la peste. Unterricht vors volk gegen die pest. Dantzic. 1770. Muratoris Del Governo della peste. Brescia 1721.
 - Ægyptiaca, sp. 11. Alpin. de med. Ægypt.
 - interna, sp. 3. Pest. Maffil. cl. 1. Traité, p. 37, 224.
- Species dubiæ sunt,
 Pestis sporadica, S. sp. 4. carbunculosa, sp. 5. Siamaea, sp. 8. scorbutica, sp. 10.

ERYSIPELAS. || (30)

Synocha duorum vel trium dierum, plerumque cum somnolentia, sæpe cum delirio.

In aliqua cutis parte, sæpius in facie, phlogosis erythema, gen. vii, sp. 2.

Erysipelas, S. gen. 97. Lin. 10. Sag. gen. 296.

Febris erysipelacea, Vog. 68. Hoffm. ii, 98.

— erysipelatoſa, Macbr. p. 382.

Species sunt,

1. Erysipelas (*vesiculosum*) erythemate, rubedine ferpente, latum spatium occupante, et locis ejus quibusdam in vesiculas magnas abeunte.

Erysipelas rosa, sp. 1. Sennert. de febr. lib. ii, c. 15.

Febris erysipelatoſa, Sydenh. sect. vi, cap. 5.

Erysipelas typhodes, sp. 2.* pestilens, sp. 5.† contagiosum, sp. 9.

2. Erysipelas

|| Vox Erysipelas tum pro phlogosi erythemate, tum pro febre erysipelacea, a scriptoribus medicis usurpatur, sed recte Sauvagesius vitium cutaneum; quod nullam febrem, nisi symptomaticam, sibi junctam habeat, erythema appellari, et erysipelas, tantum febris illa exanthematica, quam erythema sequitur, vocari velit.

Minus recte forsitan Ill. Linnæus erysipelas pro protypo exanthematicorum habuit; inter exanthemata enim, an recte, recensetur ipsum erysipelas dubitari potest.

* Hæc non nisi varietas erysipelatis vesiculosi gradu solum differens, esse videtur.

† Hæc et sequens non nisi febres cum erythemate symptomatico videntur. Hic tamen notandum est, erysipelas sæpe aliquid putridæ et gangrænosæ indolis præ-

ERYSIPELAS. (30)

2. Erysipelas (*phlyctænodes* †) erythemate ex papulis pluribus, trunci corporis partes præcipue occupantibus, et protinus in phlyctænas, sive vesiculas parvas, abeuntibus.

Erysipelas Zoster, sp. 8.

Zona; Anglis, the shingles, Ruffel de tabe gland.
p. 124. hist. 35.

Zona ignea, Hoffm. app. tom. iii, p. 426.

Herpes Zoster, sp. 9.

Symptomaticum; Erysipelas a veneno, S. sp. 3. Cæteræ Sauvagefii species ad erythema pertinent.

MILIARIA. || (31)

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctationibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulæ rubræ, exiguæ, discretæ, per totam cutem, præter faciem, crebræ, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria,

se ferre; nec dubito quin erysipelas, quod in hac regione, plerumque diathesi phlogistica comitatur, aliquando, præsertim in regionibus calidioribus, cum diathesi putrida adsit; et forsitan duas erysipelatis species, inflammatoriam nempe et putridam, indicare potuissemus; sed de posteriori nobis non satis constat.

† An hæc species ad idem cum erysipelate vesiculoso genus recte referatur, dubito; sed judicent periti.

|| Inter medicos, speciatim Viennenses, de indole morbi miliaris nuper acriter disputatum est; et imprimis an unquam idiopathicus, an vero semper symptomaticus sit, certatum queritur. Quod nunquam idiopathicus sit, præter opinionem medicorum, a medio sæculi decimi septimi in hunc fere diem, omnium, et contra sententiam medicorum hujus ævi quorundam spectabilem, affirmare non ausim; sed cum experientiam in hac re sæpe fallacem, et medicos plerosque imitatorum servum pecus fuisse noverim, dubitare cogor; et, utcumque sit, morbum miliarem plerumque symptomaticum fuisse, ex observatione propria, per multos annos frequenti, certo novi. Nunquam contagiosum, nec manifesto epidemicum, quibusdam licet temporibus solito frequentiore, vidi. Morbis febrilibus quibuscunque, tum inflammatoriis tum putridis, aliquando adjungitur; in nullis tamen, nisi regimine calido et sudoribus præeuntibus, ortum, et in pluribus, regimine temperato, et sudoribus vitatis, morbum, alias expectandum, prorsus vitatum observavi. In quibusdam corporis partibus quasi arte excitatum aliquoties novi. Denique, cum contagionum specificarum plerarumque indolem materia, si qua datur, miliaris nequaquam imitetur, tum quod certo morbi die eruptionem non efficiat, tum quod non semel tantum, sed sæpius in vitæ decursu, hominem afficiat. De hujus igitur materię natura specifica, vel ad morbum quemvis idiopathicum gignendum apta, valde dubito. In hac re mecum sentientem experientissimum et peritissimum Carolum White habere mihi gratulor. Vide White on the Management of Lying-in Women.

Cutem autem in hac re me falli potuisse, facile agnosco, ne tamen alios simul fallerem, miliariam inter exanthemata hic recensui, et characterem ejus, quem quivis, hunc morbum pro idiopathico habens, dare voluerit, exhibui; peritis quibusvis hanc rem certius dijudicandum relinquens.

MILIARIA. (31)

- Miliaria, Lin. 7.
 Miliaris, S. gen. 95. Sag. gen. 295.
 Febris miliaris, Vog. 37.
 — purpurata rubra et alba miliaris, Hoffm. ii, 68.
 — purpurea seu miliaris, Junck. 75.
 Germanis der Friesel. God. Welfch. hist. med. de novo puerperarum morbo, qui der Friesel dicitur, Lips. 1655.
 De hoc morbo scriptores præcipui sunt,
 Hamilton, de febr. miliar. 1710. Fontanus, de febr. mil. 1747. Allioni de miliar. 1758. Fordyce, de febr. mil. 1748. Fischer, de febr. mil. 1767. De Haen, de divis. febr. 1760. et in Ratio med. passim. Matt. Collin ad Baldinger de mil. 1764. Baraillon sur la fièvre miliaire, Soc. Royale i. mem. p. 193. ibid. ii. hist. p. 198.
 Gastellier sur la fièvre miliaire des femmes en couche, Montargis 1779. Varnier sur la fièvre miliaire de Normandie, Soc. Royale iii. mem. p. 281.
 Ad idiopathicam, si qua datur, pertinent,
 Miliaris benigna, sp. 1. maligna, sp. 2. recidivans, sp. 3. Germanica, sp. 5.
 Symptomaticæ manifesto sunt,
 Miliaris Boia, S. sp. a. Britannica, sp. i. nova febris, Sydenh. Sched. monit. S. sp. d. sudatoria, sp. e. nautica, sp. g. purpurata, sp. b. lactea, sp. c. puerperarum, sp. k. scorbutica, sp. l. critica, sp. b.

URTICARIA. † (32)

Febris amphimerina. †

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdum fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeunt. ||

Febris urticata, Vog. 40. Uredo, Lin. 8. Purpura urticata, Junck. 75. Scarlatina urticata, S. sp. 2.

† Est morbus ab Anglis, *The Nettle Rash* dictus, qui quibusdam Urticaria audit; sed morbus ille, *The Nettle Rash*, ut ab eruditissimo viro G. Heberden, in Coll. Reg. Med. Lond. Actis describitur, et qualem sæpius ipsi vidimus, est ab Urticaria nosologorum omnino diversus, utpote sine febre chronicus, et ad Impetigines fortassis referendus.

† Hanc in priori editione contagiosam dixi; sed ex propria experientia contagiosam fuisse non novi, et quo auctore contagiosam antea dixi, nunc non invenio.

|| Ad aliorum potius quam mei ipsius mentem hic character conscriptus est; nam hunc morbum raro vidi, et nunquam epidemicum, vel regulariter, ut hic describitur, decurrentem, observavi.

URTICARIA. (32)

S. sp. 2. Erysipelatis species altera, Sydenh. sect. vi. cap. 6. Febris scarlatina, et febris urtica, Meyserey, Mal. des armées, 291. et seq.

PEMPHIGUS. (33)

Typhus contagiosa.

Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculæ, avellanæ magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. gen. 93. Sag. 291. Morta, Lin. 1.

Febris bullosa, Vog. 41.

Species ex Sauvagesio sunt,*

Pemphigus major, S. sp. 1.

Exanthemata serosa, C. Pison. obs. 150.

Febris pemphygodes, Eph. Germ. D. I. A. viii. ob. 56.

Pemphigus castrensis, sp. 2.

Febris syneches, cum vesiculis per pectus et collum sparfis, Morton. app. ad exerc. ii.

Pemphigus Helveticus, S. sp. 3. Langhans in Act.

Helvet. vol. 2. p. 260. et in Beschreibung des

Siementhals, Zurich, 1753.

Febris Vesicatoria, Macbr. p. 389.

De Pemphigo Indico, S. sp. 4. et Pemphigo Brasiliensi, sp. 5. non liquet.

APHTHA. (34)

Synochus.† Lingua tumidiuscula; linguæ et faucium color

* Cum Pemphigum, quem pro exanthemate habere possim, nondum ipse viderim, et in scriptis medicorum de ejusmodi morbo paucissima tantum invenerim; quæ in Nosologia nostra de eo dicenda essent, omnia fere ex Sauvagesio necessario depromenda erant. Eum itaque secutus sum; sed hunc morbum lubenter ipse prorsus omissem, cum omnia fere de eo dicta, dubia, obscura, et ambigua mihi videntur. Quæ ex sui ipsius aut Caroli Pisonis observatione habet Sauvagesius, omnino credere fas est; quæ autem ex Christophori Seligeri, tenuis certe judicii hominis, observatione duxit, parva attentione digna mihi videntur. Quæ porro ex D. Thierry relatione adducuntur meam fidem omnino superant: Nimirum, quod in morbo admodum exitiali acetum bezoarticum, a medico quodam datum, omnes salvos fecit, interea dum vix unus, aliis medicis commissus, mortem evadebat. Denique, de morbo admodum ambiguo a D. Langhans in Actis Helveticis descripto, donec aliæ observationes rem elucidaverint, nihil concludere vellem. Nihil aliud, fortassis, quam cynanche maligna fuit ille morbus, et, ad summum, quod pemphigus omnis morbus symptomaticus sit, satis verisimile videtur. Paulo postquam hæc impressa sunt, Collega noster eximius Franciscus Home mihi hominem leviter febricitantem ostendit, cui primum in brachiis, et successive demum in toto corpore, vesiculæ magnitudinis avellanæ obortæ sunt, et post duos tresve dies effuso humoris serosi pauxillo collapsæ sunt. Hæc febris autem nullam indolem vel typum peculiarem monstrabat et cito disparuit nequaquam contagiosa.

† An aphtha inter exanthemata recensenda sit, dubito. Aphtha enim quæque fere quam ego vidi sine febre fuit; et si quando cum aphtha infantum febris adfuit.

APHTHA. (34)

lor purpurascens; escharæ in faucibus et ad linguæ margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albidæ, aliquando discretæ, sæpe coalescentes, abrafæ cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aphtha, S. gen. 100. Lin. 9. Sag. 298. Boerh. 978. Hoffm. ii. 478. Junck. 137.

Febris aphthosa, Vog. 44.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Aphtha infantum.

Aphtha lactucimen, sp. 1.

Symptomatica videntur, Aphtha febrilis, S. sp. 2. maligna, sp. 3.

Manifesto symptomaticæ sunt, Aphtha syphilitica, S. sp. 4. scorbutica, sp. 5.

Exanthema symptomaticum est, Purpura, S. gen. 96. Sag. gen. 292. † Petechia, Lin. 5.

ORDO IV. HÆMORRHAGIÆ. †

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet.

Hæmorrhagiæ, Vog. cl. ii. ord. i. Hoffm. ii. 194. Junck. 4.

Sanguifluxus, S. cl. ix. ord. i. Sag. cl. v. ord. i.

EPISTAXIS.

fuit, hæc fere semper aphthæ supervenerat. Aphtha adultorum quidem sæpe febri supervenit. Sed, febribus diversarum specierum plerumque sub earum finem jungitur, nec, quantum novi, febris quævis aphthæ propria, a medicis nota, vel quidem dicta fuit.

† Cum in quibusvis febribus, vel intermittentibus vel continuis, in quibusvis etiam exanthematis et profluviis, modo in iis morbis sit quædam ad putredinem proclivitas, appareant petechiæ; has pro efflorescentia symptomatica, potius quam pro exanthemate idiopathico, habere volui.

† Classem Fluxuum apud Sauvagesium et Sagarum, vel Profluviolorum apud Vogelium, vel morborum evacuatoriorum apud Linnæum, cum illa morbos, tum facie, tum natura, omnino dissimiles conjunxerit minime naturalem esse, nec proinde idoneam putavi. In nostram, igitur, Nosologiam ejusmodi classem admittere nolui, et morbos in ea recensitos aliorum referendos esse censui. Illi, quos pyrexia quædam semper comitatur, sub classe Pyrexiarum certe recensendi sunt; et hic igitur hæmorrhagias Activas quas vocant posui. Hoffmannum sequor, qui mox post febres de ejusmodi hæmorrhagiis tractavit, et in præfatione rationem reddidit; quod, scilicet, "Probe consideratis phænomenis, et paulo penitius subductis rationibus, sanguinis eruptiones iisdem propemodum, aut, non satis completis motibus quibus febres oriuntur, progignuntur."

EPISTAXIS.* (35)

Capitis dolor vel gravitas; faciei rubor; profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, Vog. 82.

Hæmorrhagia, S. gen. 239. Lin. 173. Sag. 174.

—— narium, Hoffm. ii. 196. Junck. 6.

¶ 1. *Idiopathica.*

Hæmorrhagia plethorica, S. sp. 2. Hoffm. ii. 198.

Variat ratione ætatis,

a. Epistaxis (*juniorum*) cum signis plethoræ arteriosæ.

b. Epistaxis (*senum*) cum signis plethoræ venosæ.

¶ 2. *Symptomaticæ.*

a. A causis internis.

Hæmorrhagia febrilis, S. sp. 3. critica, sp. 4. Hoffm.

ii. 198. insalubris, sp. 5. Hoffm. ibid. in chronicis, sp. 6.

b. A causis internis.

Hæmorrhagia passiva, sp. 1. a hirudine, sp. 7.

HÆMOPTYSIS. (36)

Genarum rubor; molestiæ aut doloris, et aliquando caloris, in pectore sensus; dyspnœa; titillatio faucium; tussis aut tussicula sanguinem floridum, sæpe spumofum, rejiciens.

Hæmoptysis, S. gen. 240. Lin. 179. Vog. 84.

Sag. gen. 175. Junck. 8.

Hæmoptoe, Boerh. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, Hoffm. ii, 202.

¶ 1. *Idiopathicae.*

1. Haemoptysis (*plethorica*) nulla vi externa applicata, neque praegressa tussi aut evacuationis solitae suppressione.

2. Hæ-

* Recte tum in Criticis Botanicis, tum in Philosophia Botannica, No. 233. monuit Linnæus, " Nomina generica, cum classium et ordinum naturalium nomenclaturis communis, omittenda esse. " Contra hanc regulam tamen ipse peccat, cum vocabulo hæmorrhagia, classis vel ordinis naturalis appellatione satis frequenter usitata, pro nomine generico utatur. Nec quidem, cum erraverit, ipse Hippocrates imitandus sit. Hujus generis itaque nomen mutandum erat, et a Vogelio quod hic usurpatum est desumptum.

HÆMOPTYSIS. (36)

2. Hæmoptyfis (
- violenta*
-) a vi externa applicata.

Hæmoptyfis accidentalis, sp. 1. habitualis, sp. 2.
traumatica, sp. 12.

3. Hæmoptyfis (
- phthifica*
-) post tussim cum macie et debilitate diuturnam.

Hæmoptyfis phthifica, sp. 9.

—— ex tuberculo pulmonum, sp. 10.

Hæmoptoe, Lond. med. obs. iv, 16, 18.

4. Hæmoptyfis (
- calculosa*
-) rejectis simul moleculis calculosis plerumque calcariis.

Hæmoptyfis calculosa, sp. 14.

5. Hæmoptyfis (
- vicaria*
-) post evacuationis solitae suppressionem.

Hæmoptyfis catamenialis, sp. 4. periodica, sp. 5.

¶ 2. Symptomaticæ.

Hæmoptyfis Pneumonica. catarrhalis, S. sp. 8.
peripneumonica, Lælii a Fonte. exanthematica.
variolosa, sp. 7. rubeolosa. Hæmoptyfis hydro-
pica, ascitica, sp. 15. hydrothoracica. cachecti-
ca. splenetica, sp. 16.

Ineptæ et spuriae sunt,

Hæmoptyfis a diapedesi, sp. 3. a sphacelo pulmo-
num, sp. 11. scorbutica, sp. 6. Helvigiana,
sp. 17. a hirudine, sp. 13.

Haemoptyses sequela est

PHTHISIS. Corporis emaciatio et debilitas, cum tussi,
febre hectica, et plerumque expectoratione puru-
lenta.

Phthisis, S. gen. 276. Lin. 208. Vog. 319. Sag.

101. Junck. 33.

—— pulmonalis, Boerh. 1196.

Affectio phthifica, sive tabes pulmonalis, Hoffm. iii.

284. Lond. med. obs. iv, 18, 23. Vog. 33.

Simmons on consumptions, 1780.

Species sunt,

1. Phthisis (
- incipiens*
-) sine expectoratione puris.

Phthisis incipiens, Morton. Physiolog. lib. ii. c. 3.

—— sicca, S. sp. 1.

2. Phthisis

HÆMOPTYSIS: (36)

2. Phthifis (*confirmata*) cum expectoratione puris.

Phthifis confirmata Auctorum. humida, S. sp. 2.

Variat utraque species,

- a. Ratione causae remotae.

Phthifis haemoptoica, S. sp. 6. a peripneumonia, sp. 11. asthmatica, sp. 5. calculosa, sp. 7. exanthematica, sp. 14. a febris, sp. 13. rheumatico-arthritis, sp. 12. chlorotica, sp. 10. icteritia, sp. 15. Schacht. de phthifi icterit. 1724. hypochondriaca, sp. 16. scrophulosa sp. 3. chylosa, sp. 17. scorbutica, sp. 4. syphilitica, sp. 8. a plica, sp. 19. a metastasi puris, sp. 9.

- b. Ratione fontis purulentae.

Phthifis a vomica, S. sp. 18. cellularis, sp. 20. De Haen, Rat. medendi, vol. I. cap. 7. 11. Ed. Leid.*

HÆMORRHOIS: (37)

Capitis gravitas vel dolor; vertigo; lumborum dolor; dolor ani; circa anum tubercula livida dolentia, e quibus plerumque profluit sanguis, qui aliquando etiam, nullo tumore apparente, ex ano stillat.

Haemorrhoids, Sauv. gen. 217. Lin. 192. Sag. 182.

Macb. p. 481.

Haemorrhoidalis fluxus, Hoffm. 219.

Haemorrhoides, Junck, 11, et 12.

Leucorrhoids, Vog. 112.

Proctalgia haemorrhoidalis, Macb. p. 540.

Species sunt,

1. Haemorrhoids (*tumens*) externa a mariscis.

Marisca, S. gen. 35. Sag. gen. 37.

Variat,

- a. Cruenta.

Haemorrhoids moderata, S. sp. 1.

Haemorrhoides ordinatae, Junck. 11.

Haemorrhoides nimiae, Junck. 11.

Haemorrhoids immodica, S. sp. 2.

Haemorrhoides excedentes, Alberti de haemorrhoid. p. 179.

Haemorrhoids polyposa, S. sp. 3.

L 1

b. Mucosa.

* Utrum, de hoc fonte puris, recte an secus judicaverit Haenius, hujusmodi species vix in Nosologia locum habere potest, cum a signis quibuscvis externis diagnosci non queat.

HAEMORRHOIS. (37)

b. Mucosa.

Hæmorrhoides decoloratae, albae, et mucidae,
Junck. 13. Alberti, pag. 248.

Proctagia intertriginosa, Macb. p. 541.

2. Hæmorrhoids (*procidens*) externa a procidentia ani.
Hæmorrhoids ab exania, S. sp. 4. Med. Eff. Liter.
et Phys. ii. 27. Morg. de caus. ep. xxxiii.

3. Hæmorrhoids (*fluens*) interna absque tumore externo, vel procidentia ani*.

4. Hæmorrhoids (*caeca*) cum dolore et tumore ani,
sine profusione sanguinis.

Hæmorrhoides caecæ, Junck 12. Alberti pag.
274. §

Proctalgia inflammatoria, Macb. p. 540.

MENORRHAGIA. (38)

Dorsi, lumborum, ventris, parturientium instar, dolores;
menstruorum copiosior, vel sanguinis e vagina præter ordinem fluxus.

Menorrhagia, Sauv. gen. 244. Lin. 202. Vog. 96.

Metrorrhagia, Sag. gen. 179.

Uteri hæmorrhagia, Hoffm. II. 224.

Hæmorrhagia uterina, Junck. 14.

Leucorrhœa, S. gen. 267. Lin. 201. Vog. 119. Sag.
gen. 202.

Cachexia uterina, sive fluor albus, Hoffm. iii. 348.

Fluor

* Stahlus, et ejus sequaces, distinxerunt hæmorrhoides in internas, quæ sanguinem ex ramis venae portarum, et externas, quæ sanguinem ex ramis venae cavae profundunt; sed, quantum video, scaturigo sanguinis profusi nullo modo dignosci queat. Huic itaque distinctioni nullus locus esse videtur, nec, si esset, quicquid ad distinguendam morbi naturam, vel effectum, conferre posset; nam arteriae et venae, ad inferiorem intestini recti partem pertinentes, ortu utcumque diversae, tam frequenter inter se invicem communicantur et conjunguntur, ut uniuscujusvis affectio ad alteram statim communicari, et utriusvis effectus fere idem semper esse oporteat. Non ideo hæmorrhoidem internam et externam ad mentem Stahlianorum distinxī, sed prout scaturigo sanguinis profluentis magis intra vel extra anum fuerit.

§ Hæmorrhoids saepe corporis universi morbus est, sive a quodam universi corporis statu pendens: sed saepe etiam morbus est mere localis. Non tamen hujusmodi species ad morbos locales referre volui; quoniam hæmorrhoids quævis, etiam si initio mere localis sit, si saepius, et solet redierit, tandem, sicut hæmorrhagia alia quævis saepe rediens, necessario in universi corporis morbus. Affines itaque separare nolui, et hæmorrhoidem quidem omnem hic inter morbos universales recensendam esse censui.

MENORRHAGIA. (38)

Fluor albus, Junck. 133.†

Abortus, S. gen. 245. Lin. 204. Sag. gen. 180.
Junck. 92.

Abortio, Vog. 97.

Fluor uterini sanguinis, Boerh. 1303.

Convulsio uteri, sive abortus, Hoffm. iii. 176.

Species sunt,

1. Menorrhagia (*rubra*) cruenta in non gravidis nec puerperis.

Menorrhagia immodica, S. sp. 3. a Pasta. Differt. supra i menstrui.

Menorrhagia stillatitia, S. sp. 2.

2. Menorrhagia (*abortus*) cruenta in gravidis.

Menorrhagia gravidarum. S. sp. 6. Pasta, intorno al flusso di sangue dall utero nelle gravide.

Abortus effluxio, S. sp. 1. a. subtrimestris. b. subsemestris. c. octimestris.

Abortus ab uteri laxitate, S. sp. 2.

3. Menorrhagia (*lochialis*) cruenta in puerperis.

Menorrhagia lochialis, S. sp. 8. Pasta diff. supra citat.

4. Menorrhagia (*vitiorum*) cruenta ex vitio locali.

Menorrhagia ex hysteroptosi, S. sp. 5.

————— ulcerosa, sp. 9.

5. Menorrhagia (*alba*) ferofo sine vitio locali in non gravidis.*

Leucorrhœa, gen., ut supra.

Menorrhagia decolor, S. sp. 7.

Leucorrhœa Americana, sp. 5.

————— Indica, sp. 6.

6. Menorrhagia

† Leucorrhœam, sive fluorem album, auctorum, hic ad menorrhagiæ genus retuli, et leucorrhœam sine vitio locali omnem huc omnino referendam esse cenfeo. Plerumque enim, et fere semper, leucorrhœa vel cum menorrhagia conjuncta est, vel eam mox secuta, et a temporibus quando apparet leucorrhœa serum sub hac effusum ab iisdem vasis, quæ menses profundunt, provenire, et sæpe leucorrhœam ab iisdem causis ac menorrhagiam rubram oriri, satis verisimile est.

* Hic fortassis lector eruditus mirari possit, quod ad clariss. medici Parisiensis Raulin, de fluore albo librum, *Traité des fleurs blanches*, neque studiosos relegaverim, neque species fluoris albi varias ab illustri auctore indicatas ipse recensuerim. Recte an fecus fecerim, peritis dijudicandum relinquo; sed quod non fecerim hæc causa fuit. Plura in libro illo ingenioso subtilius, quam erius dicta, mihi videntur; et vel quomodo fluor albus, ab aliarum præter uteri partium affectione oriri possit, non intelligo, vel quod revera oriantur, ex meis saltem observationibus, forsitan paucioribus, mihi nequaquam constat. Lectores itaque nostros potius ad auctorem ipsum relegare, quam doctrinam ejus male intellectam, et forsitan minus recte traditam, hic exhibere velim.

MENORRHAGIA. (38)

6. Menorrhagia (*Nabothi*) serosa in gravidis.

Leucorrhœa Nabothi, S. sp. 9.

———— gravidarum, sp. 8.

Menorrhagiam serosam, five leucorrhœam ex vitio locali, ad morbos locales referendam esse censeo.

Hæmorrhagiæ sequentes plerumque, si non semper, symptomatice sunt.

STOMACACE, S. gen. 241. Lin. 175. Vog. 85. Sag. gen. 176.

Vel scorbuti, vel vitii oris, vel injuriæ externæ, symptoma est. Cum autem species Sauvagesii fere omnes recensere idoneum duco nunc sequenti serie recensitas velim.

1. Stomacace scorbutica. 2. universalis. 3. hæmorrhœo. 4. purulenta.

HAEMATEMESIS, S. gen. 242. Lin. 184. Vog. 89. gen. 177.

Plerumque hæmorrhagiæ solitæ vicaria est, vel vitii ventriculi localis, vel morbi nigri, vel denique vis externæ, symptoma est.

Hæmatemesis plethorica, S. sp. 1. catamenialis, sp. 5. hæmorrhoidalis, ex splene, sp. 7. ex hepate, sp. 13. ex pancreate, sp. 6. atra, sp. 12. scorbutica, sp. 8. ex aneurismate, sp. 2. carnositas cruenta, sp. 11. traumatica, sp. 3. ab hirudine, sp. 4. cholericæ, sp. 9. a veneno, sp. 14. Simulata, sp. 10.

HAEMATURIA, S. gen. 243. Lin. 198. Vog. 92. Sag. gen. 178. Edinb. eff. V. 72.

Plerumque calculi renalis, aliquando febrium putridarum symptoma est.

Species secundum Sauvagesium sunt.

Hæmaturia spontanea, S. sp. 1. catamenialis, sp. 12. calculosa, sp. 5. nigra, sp. 11. purulenta, sp. 4. violenta, sp. 2. traumatica, sp. 14. hæmorrhoidalis, sp. 9. ejaculatoria, sp. 7. stillantia, sp. 8. in exanthematicis, sp. 6. Spuria, sp. 10. deceptiva, sp. 3. a transfusione, sp. 13. a verme, sp. 15.

CYSTIRRHAGIA, Vog. 93.

Plerumque calculi vesicalis, rarius alius morbi vesicæ, symptoma.

ORDO

ORDO V. PROFLUVIA.*

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.

Profluvia, Vog. cl. ii.

CATARRHUS. (39)

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranarum, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. gen. 186. Vog. 98. Sag. gen. 145.

Coryza, Lin. 174. Vog. 100. Sag. gen. 196.

Rheuma, S. gen. 149. Sag. gen. 255.

Tussis, S. gen. 142. Lin. 155. Vog. 205. Sag. gen. 249. Junck. 30.

—— catarrhalis et rheumatica, Hoffm. iii. 109.

Genera sequentia ad hunc titulum referenda, plerumque symptomatica sunt.

Anacatharsis, S. gen. 262. Sag. 198. Expectorationis, Lin. 178. Raucedo, Lin. 146. Raucitas, Vog. 252. Gravedo, Lin. 42.

1. Catarrhus a frigore.

Catarrhus benignus, S. sp. 1. pectoreus, sp. 6.

Coryza, catarrhalis, sp. 1. phlegmatorrhagia,

sp. 2. Salmuth. obs. cent. 1. 37. Junck. 28.

Morgagn. de sed. xiv. 21. febricosa, sp. 6.

Tussis catarrhalis, sp. 1. N. Rosen. diss. apud

Haller, disput. pract. tom. ii. Rheuma catarr-

rhale, sp. 1. Amphimerina catarrhalis, sp. 2.

Febris remittens catarrhalis, Macb. p. 359.

Amphimerina tussiculosa, sp. 13? Cephalalgia

catarrhalis, sp. 10.

2. Catarrhus a contagio.

Catarrhus epidemicus, sp. 3. Rheuma epidemicum,

sp. 2. Synocha, catarrhalis, sp. 5.

Hujus exempla sunt.

Anno 1323. Cronica meteorologica della Toscana,

apud Targioni Tozzetti Osservaz.

Med. Racolta i. p. 175.

Anno

* Ob eandem rationem qua Haemorrhagias, Profluvia etiam febrilia quaedam hic in classe Pyrexiarum collocavi. Catarrhus quidem, pyrexia et diathesi phlogistica, phlegmasiis maxime affinis est; et dysenteria non solum pyrexia semper comitatur, sed in multis etiam a fluxibus aliis quibusvis differt.

CATARRHUS. (39)

Anno 1328. Ibid.

1358. Ibid.

1387. Ibid.

Valefcus de Taranta apud Morgagn. de
fedibus, xiii. 4.

Marchefi ibid.

1510. Valleriola append. ad loc. com. cap. 2.

1575. Valeriola, ibid.

Riverii obf. in biblioth. vet. rept.
obf. ix.

Forefti, lib. vi. obf. i.

1580. Hænifchius in Aretæum, p. 315. 396.

Wieri, obf. lib. ii.

P. Sal. Diverfus, de febre peftilenti,
cap. xi.

Foreftus lib. vi. obf. 3.

Riverii obf. in biblioth. vet. rept.
obf. x.

Sennertus de febre, lib. iv. cap. 17.

1591. Sennertus, ibid.

Pechlin, lib. ii. obf. 17.

1658. Willis de febribus, cap. 16.

1675. Sydenham, feft. v. cap. 5.

Raygerus in Ephem. Germ. D. I. A.
vi. et vii. obf. 213.

P. de Sorbait.

1679. Sydenham, Ep. refp. ad R. Brady.

Zod. med. Gall. A. I. Decemb. obf. 6.

1708. Schroekius in Ephem. Germ. cent. i. et
ii. in append. p. 14.

1709. Hoffm. ii. 47.

1712. Camerarius in Ephem. Germ. cent. iii.
et iv. obf. 58.

Schrockius, ibid. in append. p. 26.

1729. et 1730. Hoffm. ii. 109.

C. Fr. Loew, in append. ad A. N. C.
vol. iii.Scheuchzer, obf. meteorol. in app. ad
A. N. C. vol. iv.

Morgagni de fed. et cauf. xiii. 3, 4.

Beccarius, A. N. C. iii. obf. 48. p. 142.

Hillary on weather and difeafes, p. 35.

Winteringham, Comm. Nofol. p. 319.

Rutty's hift. of weather, p. 17.

Perkin's Soc. Royale i. hift. p. 209.

Anno

CATARRHUS. (39)

- Anno 1732 et 1733. *Commerc. lit. Norimb.* 1733. pag. 6, 52, 108, 267.
 Detharding de febr. Eyderostad. in Halleri disputat. pract. vol. v.
 Edin. Med. Ess. vol. ii. art. 2.
 Hillary of weather, &c. p. 47.
 Winteringham, *Comm. Nosol.* p. 354.
 Huxham de aëre, &c. 1733, M. Febr.
 Ruty's history of weather, p. 30.
 1737. Jan. Ruty, *ibid.* p. 60.
 Octob. Ruty, *ibid.* p. 60.
 Julio. *Comm. lit. Norimb.* 1737, pag. 347.
 1742. 1743. *Comm. lit. Norimb.* 1743, pag. 106. 188. 313. 336.
 Juch et Zuberbuchler de febre catarrhali, apud Haller's *Disp. pract.* tom. v.
 Huxham de aëre, 1743, M. April.
 Ruty, hist of weather, p. 99.
 Targioni Tozzetti. *Racolt. i. di osservaz.* Med. p. 176.
 1748. Cleghorn, *Minorca*, p. 132.
 Perkin's *Soc. Royale i. hist.* p. 210. et suivans.
 1758. Ruty, hist of weather, p. 211.
 Whytt, *Lond. Med. obs.* vol. ii. art. 13.
 1762. Baker de catarrho, *Lond.* 1764.
 Monro, *Dis. of mil. hosp.* pag. 137. Macb. p. 333.
 1767. Heberden, *Med. Transact.* i. art. 18. Macb. p. 334.
 1775. *Lond. Med. Obs.* vi. 30.
 1779. et 1780. *Soc Royale iii. mem.* p. 16.
 Saillant *Tableau des Epidemies catarrhales*, 1780.

Inter catarrhi, coryzae, et tussis species apud Sauvagesium, symptomaticae sunt,

Catarrhus rubeolofus, S. sp. 5. Tussis exanthematica, sp. 20. Coryza, variolosa, sp. 4. virulenta sp. 3. purulenta, sp. 5. Tussis accidentalis, sp. 4. gutturalis, sp. 8. xerolaryngea, sp. 23. verminosa, sp. 21. sicca, sp. 3. calculosa, sp. 22. phthifica, sp. 7. haemoptoica, sp. 15. a polypo, sp. 16. a dentitione, sp. 12. stomachalis humida, sp. 6. stomachalis sicca, sp. 7. hysterica, sp. 2. gravidarum, sp. 14. hepatica, sp. 9.

CATARRHUS. (39)

rheumatica, sp. 18. arthritica, sp. 19. metalli-
corum, sp. 4.

DYSENTERIA. (40)

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, mucosae, vel sanguinolentae, retentis plerumque faecibus alvinis; tormina; tenesmus.

Dysenteria, S. gen. 248. Lin. 191. Vog. 107.
Sag. 183. Hoffm. iii. 151. Junck. 76.

Non nisi speciem unicam novi cujus nomina apud Sauvagesium sunt,

Dysenteria epidemica, S. sp. 6. Sydenham. sect. iv. cap. 2. Helwich. in hist. morb. Wratislav. ann. 1699, Degner. de Dysenteria Neomagenfi 1736. Huxham, de aëre, &c. ad. an. 1743. Cleghorn's Minorca, chap. 5. Grimm. hist. dysenteriae malign. 1759, &c. in append. ad A. Nov. N. C. vol. iii. Baker de catarrho et dysenteria, Lond. 1762. Akenfide de dysenteria, Lond. 1762. Stark, hist. et sectiones dysenteric. diff. inaug. L. B. 1766. Zimmerman von der Ruhr. Zurich. 1767. Soc. Royale iii. mem. p. 32.

Dysenteria castrensis, S. sp. 7. Ramazzini de morb. artific. cap. 40. Illust. Pringle, Dis. of the army, p. 224. Cl. Monro, Dis. of mil. hospitals, pag. 57.

Dysenteria æquinoctialis, S. sp. 14. Bont. de med. Ind. cap. 3.

Variat,

1. Vermibus comitata.

Dysenteria verminosa, S. sp. 15. Huxham de aere, &c. ad ann. 1743. M. Maio. Ill. Pringle, pag. 225. Monro p. 62.

2. Rejectis moleculis carnosis, vel sebaceis.

Dysenteria carnosa, S. sp. 16.

Diarrhoea carnosa, sp. 5. Wedelius Ephem. Germ. D. ii. A. ii. obs. 182. Wagner, ibid. D. ii. A. iii. obs. 187. cum scholio Schroekii, Morgagn. de sed. Ep. xxxi. 17---24. Ill. Pringle, p. 237. Monro, p. 62.

3. Febre intermittente comitata.

Dysenteria intermittens, S. sp. 17. Morton in append. ad exerc. ii. Cleghorn's Minorca, p. 236. Lautter. hist. med. bienn. cas. 17, 20.

4. Sine

DYSENTERIA. (40)

4. Sine sanguine.

Dysenteria alba, S. sp. 10. Willis, Pharm. rat. P. i. sect. iii. cap. 3. Sydenham, ed. Leid. p. 179. Morgagn. de sed. ep. xxxi. 11. Ill. Pringle, p. 225. Cl. Monro, p. 61. Roederer, de morbo mucoso, Gotting. 1762.

5. Miliaria comitata.

Dysenteria miliaris Gruberi, S. sp. 2. Febris exanthematico-dysenterica Tiguri epidemica, 1747.

Symptomaticae sunt,

Dysenteria benigna spontanea, S. sp. 1. catamenialis, sp. 2. gravidarum, sp. 4. atrabilaria, sp. 5. syphilitica, sp. 13. scorbutica, sp. 18. Polonica, sp. 19. mesenterii vomica, sp. 11.

Ad diarrhoeam pertinent,

Dysenteria Parisiaca, S. sp. 3. a catharticis, sp. 12.

CLASSIS. II. NEUROSES.*

Sensus et motus laesi, sine pyrexia idiopathica, et sine morbo locali.

ORDO I. COMATA.

Motus voluntarii imminuti cum sopore five sensuum feriatiōe.

M m

Comata,

* A tempore celebris quondam apud Anglos medici Thomæ Willis, morbos quosdam ab aliis quibusvis, sub nomine Nervosorum, distinxerunt Britanni; sed, ni fallor, parum accurate, dum affectiones hystericas et hypochondriacas fere solas sub nomine Nervosarum indigitarunt. Quantum ego quidem video, motus morbosus fere omnes a motibus in systemate nervorum ita pendent, ut morbi fere omnes quodammodo Nervosi dici queant. Inter eos tamen distinctionem satis commode adhibere licet, et morbi isti qui nervorum systema fere solum, vel saltem primario, neque simul vel sanguinis circuitum, vel humorum naturam, nisi secundario afficiunt, Nervosi a nobis dicendi sunt. Classem itaque tam a classe Pyrexiarum, quam a classe Cachexiarum diversam, sub nomine Nervosium recte instituisse mihi videor.

Comata, Sauv. cl. vi. ord. ii. Sag. cl. ix. ord. v.
 Soporosi, Lin. cl. vi. ord. ii.
 Adynamia, Vog. cl. vi.
 Nervorum resolutiones, Hoffm. iii. 194.
 Affectus soporosi, Hoffm. iii. 209.
 Motuum vitalium defectus, Junck. 114.

APOPLEXIA. (41)

Motus voluntarii fere omnes imminuti, cum sopore,† plus minus profundo, superflite motu cordis et arteriarum.

Apoplexia, Sauv. gen. 182. Lin. 101. Vog. 229.
 Boerh. 1007. Junck. 117. Sag. gen. 228. Wepfer. hist. apoplecticorum.

Carus, S. gen. 181. Lin. 100. Vog. 231. Boerh. 1045. Sag. gen. 287, Mach. p. 561.†

Cataphora, S. gen. 180. Lin. 99. V. 232. Boerh. 1048. Sag. gen. 286.

Coma, Vog. 232. Boerh. 1048.

Hæmorrhagia cerebri, Hoffm. ii. 240.

Ad hoc genus pertinere mihi videntur,

Catalepsis, S. gen. 176. Lin. 129. Vog. 230. Sag. gen. 281. Boerh. 1036. Junck. 44.

Affectus cerebri spasmodico-ecstaticus, Hoffm. iii. 44.

Ecstasis, S. gen. 177. Vog. 333. Sag. gen. 283.

Symptomata esse videntur,

Typhomania, S. gen. 178. Lin. 97. Vog. 23. Sag. gen. 284.

Lethargus, S. gen. 179. Lin. 98. Vog. 22. Sag. gen. 285.

Apoplexiæ idiopathicae species sunt,

1. Apoplexia (*sanguinea*) cum signis plethoræ universalis, et præcipue capitis.

Apoplexia sanguinea, S. sp. 1. Morgagn. de causis, &c. ii. iii. lx, Preysinger, sp. 1.

Carus spontaneus, S. sp. 2. Boerh. 1045.

Asphyxia* spinalis, Du Hamel, hist. Acad. ann. 1688. cap. 2. Boerh. prelect. instit. 401.

Morgagn. de caus. &c. iii. 3.

Cataphora coma, S. sp. 2.

3. Apoplexia

† Apud Linnaeum vocabulum Sopor, tam pro motuum, quam pro sensuum fermentatione ponitur; sed sensu vulgari, tantum pro somno, vel pro statu somno simili, eodem utimur.

‡ Cum genera Carus, &c. hic subijuncta non nisi apoplexiæ leviores esse videntur, nec vel respiratione vel excitatione satis accurate distinguenda sint, ad unum genus omnia referenda esse censui.

* Genus Asphyxiæ ad Syncopen olim retuli, et ejusdem species quasdam non gradu a syncope differre, adhuc cenſeo. Plures vero asphyxiæ species ad apoplexiæ

APOPLEXIA. (41)

2. Apoplexia (*serosa*) in corpore plerumque senum, leucophlegmatico.

Apoplexia pituitosa, S. sp. 7. Apoplexia serosa,

Preysinger, sp. 4. Morg. de causis, &c. iv. 1x.

Carus a hydrocephalo, S. sp. 16.

Cataphora hydrocephalica, sp. 6.

———— somnolenta, sp. 1.

Lethargus literatorum, sp. 7. Van Swieten in aph.

1010. 2 γ et 3 α.

3. Apoplexia (*hydrocephalica*†) paulatim adoricens; infantem et impuberes, primum lassitudine, febricula, et dolore capitis, dein pulsu tardiore, pupillae dilatatione, et somnolentia afficiens.

Hydrocephalus interior, S. sp. 1.

Hydrocephalus internus, Whytt's Works, p. 725.

Lond. Med. Observ. vol. iv. art. 3. 6. and 25.

vi. 6. 7. 8. Gaudelius de hydrocephalo, apud

Sandifort Thesaur. vol. ii. Ed. Med. Ess. ii. 18.

iii. 23. Soc. Royale iii. mem. p. 194.

Hydrocephalus acutus, Quin, diff. de hydrocephalo,

Edinb. 1779.

Asthénia a hydrocephalo, S. sp. 3.

4. Apoplexia (*atrabiliaria*) in corpore melancholico.

Apoplexia atrabiliaria, S. sp. 12. Preysinger, sp. 6.

Carus traumaticus, sp. 5.

5. Apoplexia

plexiae genus pertinere olim et nunc etiam persuasum habeo; ideoque eas hic recensui. Asphyxia spinalis quidem hic apposita, utpote signis nullis externis dignoscenda, male inter species recensetur; si vero ad causas internas unquam respicere liceret, certe inter apoplexiae species recensenda esset. Cum autem ad causas externas et evidentes omnino respicere liceat, ab his fati perspectis plures asphyxiae species a Sauvagesio recensitas inter apoplexiae species enumeravi; nec huic obstare velim quod. in quibusdam asphyxiae speciebus, tum pulsus arteriarum tum respiratio, vita etiam superstit, tandem penitus cessant; nam in harum plerisque sub initio, cum motus et sensus fere penitus abolentur, superest adhuc motus quidam tum cordis tum pulmonum; et si tandem omnino cessant, idem aliquando apoplecticis ante mortem accidit. In apoplexia porro, cerebrum, in syncope autem cor, primario affectum esse opinor; et asphyxiae species itaque, prout cerebrum vel cor primario afficiant, quatenus id fieri, ex causis earum externis, conicere liceat, ad apoplexiae vel syncopes genus refero.

† In opere nosologico, morbos qui sub suo decursu variam induunt formam, rite collocare, ideoque apoplexiae hydrocephalicae locum maxime idoneum assignare, difficile est. Hunc morbum autem sub apoplexiae potius quam hydrocephali titulo ponere vellem; primo, quia hydrocephalus, qui hic subest, nequaquam sensibus evidens est; dein quia hic morbus symptomatis ab hydrocephalo evidente plurimum differt; denique, quia causa proxima et tandem symptomatis, apoplexiae quam maxime affinis est.

APOPLEXIA. (41)

5. Apoplexia (*traumatica*) a vi externa mechanica capiti illata.

Apoplexia traumatica, S. sp. 2. Ed. Eff. v. 52.

6. Apoplexia (*venenata*) a potentiis sedantibus interne vel externe adhibitis.

Apoplexia temulenta, S. sp. 3. Carus a narcoticis, sp. 14. Lethargus a narcoticis, sp. 3. Carus a plumbagine, sp. 10. Apoplexia mephitica, sp. 14. Ed. Eff. v. 55. Asphyxia a mephitide, sp. 9. a musto, sp. 3. Catalepsis a fumo, sp. 3. Asphyxia a fumis, sp. 2. a carbone sp. 16. foricariorum, sp. 11. sideratorum, sp. 10. Carus ab insolatione, sp. 12. a frigore, sp. 6. Lethargus a frigore, sp. 6. Asphyxia congelatorum, sp. 5.

7. Apoplexia (*mentalis*) a pathemate mentis.

Carus a pathemate, S. sp. 11.

Asphyxia a pathemate, sp. 7.

Ecstasis catoche, sp. 1.

—— resoluta, sp. 2.

8. Apoplexia (*cataleptica**) musculis, sub artuum a vi externa motu, contractilibus.

Catalepsis Sauv. gen. 176. Lin, 129. Vog. 230. Sag. gen. 281. Boerh. 1036. Junck. 44.

Species apud Sauvagesium sunt,

Catalepsis hysterica, S. sp. 1. verminosa, sp. 2. a fumo, sp. 3. a menostasia, sp. 4. melancholica, sp. 5. delirans, sp. 6.

9. Apoplexia (*suffocata*) a potentia externa suffocante.

Asphyxia suspensorum, S. sp. 4.

—— immerforum, sp. 1. M'Donel de submersis, Edin. 1784.

—— flatulenta, sp. 12. ad apoplexiae genus pertinet, si a signis externis dignosci possit.

Apoplexia saepe symptomatica est,

1. Febris intermittens.

Apoplexia febricosa, S. sp. 9. Carus febricosus, sp. 3. Cataphora timor, sp. 8. Typhomania febricosa, sp. 1. Catalepsis quartanaria, sp. 7.

2 Febris

* Catalepsin nisi simulatam ipse nunquam vidi, et ab aliis visam frequenter simulatam fuisse credo. De morbo itaque rarius viso, varie descripto, et saepe prorsus simulato, pro certo statuere mihi vix liceret; sed genere ab apoplexia neutrumquam diversum esse, bene persuasus sum; ideoque hic inter Apoplexiae species collocavi.

APOPLEXIA. (41)

2. Febris continuæ.

Carus febrilis, S. sp. 2. Typhomania continua sp. 2.

Typhomania agrypnocoma, sp. 3. Lethargus a febre, sp. 1.

3. Phlegmasiæ.

Apoplexia inflammatoria, S. sp. 13. Lethargus cephaliticus, sp. 4. pulmonicus, sp. 2

4. Exanthematis.

Carus variolosus, S. sp. 8. Apoplexia, metastatica, sp. 6. Carus exanthematicus, sp. 18. Cataphora exanthematica, sp. 5.

5. Hysteriæ.

Apoplexia hysterica, S. sp. 4. Carus hystericus, sp. 9. Asphyxia hysterica, sp. 8. Carus mystagmus, sp. 17. hypochondriacus, sp. 13.

6. Epilepsiæ.

Apoplexia epileptica, S. sp. 8. fuspriorosa, sp. 10.

7. Podagrae.

Apoplexia arthritica, S. sp. 5. Carus arthriticus, sp. 6. Cataphora arthritica, sp. 4. Lethargus arthriticus, sp. 5.

8. Vermium.

Apoplexia verminosa, S. sp. 15. Carus verminosus, sp. 7. Typhomania verminosa, sp. 4.

9. Ischuriæ.

Carus Ischuriosus, S. sp. 4.

10. Scorbuti.

Cataphora scorbutica, S. sp. 3.

PARALYSIS. (42)

Motus voluntarii nonnulli tantum imminuti, sæpe cum sopore.

Paralyfis, Boerh. 1057. Hemiplegia, S. gen. 170. Lin. 103. Vog. 228. Paraplexia, S. gen. 171. Paraplegia, Lin. 102. Vog. 227. Paralyfis, S. gen. 169. Lin. 104. Vog. 226. Junck. 115. Atonia, Lin. 120.

* *Idiopathicae.*

1. Paralyfis (*partialis*) quorundam musculorum tantum.

Paralyfis, S. gen. 169. Lin. 104. Vog. 226. Junck. 115. plethorica, S. sp. 1. serosa sp. 12. nervæ,

PARALYSIS. (42)

vea, sp. 11. Mutitas a glossoylis, sp. 1. Aphonia paralytica, sp. 8.

2. Paralyfis (*hemiplegica*) alterius corporis lateris.

Hemiplegia, S. gen. 170. Lin. 103. Vog. 228.

Sag. gen. 276.

Variat ratione habitus corporis.

a. Hemiplegia in habitu plethorico.

Hemiplegia ex apoplexia, S. sp. 7.

Hemiplegia spasmodica, sp. 2.

b. Hemiplegia in habitu leucophlegmatico.

Hemiplegia serosa, S. sp. 10.

Male recensetur, Hemiplegia apostematodes, S. sp.

11. quae signis externis dignosci non potest ;
et Hemiplegia ex epilepsia, S. sp. 12. recenseri
vix meretur.

3. Paralyfis (*paraplegica*) dimidii corporis transversim sumpti.

Paraplexia, S. gen. 171. Sag. gen. 277. Paraplexia. Lin. 102. Vog. 227. Paraplexia sanguinea, S. sp. 2. a spina bifida, sp. 3. rheumatica, sp. 1.

4. Paralyfis (*venenata*) a potentiis sedantibus externe vel interne adhibitis.

Paralyfis metallariorum, S. sp. 22.

Hemiplegia saturnina, sp. 14.

** *Symptomaticæ.*

Hemiplegia intermittens, S. sp. 8. Paraplegia intermittens, sp. 6. Paralyfis febrilis, sp. 8. Hemiplegia exanthematica, sp. 6. Paralyfis rheumatica, sp. 3. Hemiplegia arthritica, sp. 5. Paralyfis rachialgica, sp. 2. Paraplegia rachialgica, sp. 5. Paralyfis biliosa, sp. 9. Hemiplegia transversa, sp. 1. Paralyfis scorbutica, sp. 6. scrophulosa, sp. 5. Hemiplegia scrophulosa, sp. 4. syphilitica, sp. 3. Paraplegia syphilitica, sp. 7. Paralyfis Polonica, sp. 7. a vomica, sp. 10. traumatica, sp. 4. Hemiplegia traumatica, sp. 9. Paraplegia traumatica, sp. 4.

Tremorem, utpote semper symptomaticum, in numerum generum recipere nollem ; species autem a Sauvagesio recensitas, prout mihi Astheniae vel Paralyfios, vel convulsionis symptomata esse videntur, hic subiungam.

TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequentes moti-
tatio.

Tremor, S. gen. 129. Lin. 139. Vog. 184. Sag.
236.

1. Species asthenicae,

Tremor a debilitate, S. sp. 1. fenilis, sp. 2. a cof-
fea, sp. 4. a pathemate, metu, ira, gaudio, libi-
dine, sp. 14. typhodes, sp. 19.

2. Species paralyticae.

Tremor paralytodes, S. sp. 11. vertiginosus, sp. 7.
a plethora, sp. 13. a saburra, sp. 12. a hydro-
cephalo, sp. 8. scorbuticus, sp. 10. rheumatif-
malis, sp. 18. temulentus, sp. 3. metallurgo-
rum, sp. 5. traumaticus, sp. 17.

3. Species convulsivae.

Tremor coactus, S. sp. 6. tendinum, sp. 9. palpi-
tans, sp. 16.

ORDO II. ADYNAMIÆ.

Motus involuntarii, five vitales five naturales, im-
minuti.

Adynamiae, Vog. cl. vi.

Defectivi, Lin. cl. vi. ord. i.

Leipopsychiae, S. cl. vi. ord. iv. Sag. cl. ix. ord. iv.

SYNCOPE. (43)

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. gen. 174. Lin. 94. Vog. 274. Sag.
280. Junck. 119.

Leipothymia, S. gen. 173. Lin. 93. Vog. 273.
Sag. 279.

Aphyxia, S. gen. 175. Lin. 95. Vog. 275. Sag. 281.

Virium lapsus et animi deliquia, Hoffm. iii. 267.

* Idiopathicae.

1. Syncope (cardiaca) sine causa manifesta saepe redi-
ens, cum palpitatione cordis vehementi in intervallis:
Ex vitio cordis vel vasorum vicinorum.

Syncope plethorica, S. sp. 5. Senac, Tr. de coeur,
p. 540.

Syncope a cardiogmo, sp. 7. Senac, de coeur, 414.
Morgagn. de sed. xxv. 2. 3. 10.

Syncope a polypo, sp. 8. Senac, p. 471.

Syncope

SYNCOPE. (43)

Syncope ab hydrocardia, S. sp. 12. Senac, 533.
Schreiber Almag. l. iii. § 196.

Syncope Lanzoni, sp. 18. Lanzon. op. ii. p. 462.

Asphyxia Valsalviana, sp. 13.

2. Syncope (*occasionalis*) a causa manifesta oriens: Ex affectione totius systematis.

Leipothymia a pathemate, S. sp. 1. Senac, p. 544.

Syncope pathetica, sp. 21.

Asphyxiae a pathemate, sp. 7.

Syncope ab antipathia, sp. 9. Senac, p. 554.

———— a veneno, sp. 10. Senac. p. 546.

———— ab apostematis, sp. 11. Senac, p. 554.

———— a sphacelo, sp. 14. Senac, p. 553.

———— ab inanitione, sp. 1. Senac, p. 536.

———— a phlebotomia, sp. 4.

———— a dolore, sp. 2. Senac, p. 583.

Asphyxia traumatica, sp. 14.

———— neophytorum, sp. 17.

*** Symptomata,*

five symptomata morborum vel totius systematis
vel aliarum præter cor partium.

Syncope febrilis, S. sp. 3. Senac, p. 548.

———— febricosa, sp. 17. Torti Therap. spec. L.
iii. cap. 1.

———— exanthematica, sp. 19.

———— metastatica, sp. 20.

Leipothymia stomachica, sp. 2.

Syncope stomachica, sp. 13. Senac, p. 545.

———— hysterica, sp. 6. Senac, p. 547.

———— arthritica, sp. 16. Musgrave de arthr. anomala, cap. 8.

———— scorbutica, sp. 15. Lind. Treat. on scurvy.

P. ii. chap. 11. Senac, p. 552.

DYSPEPSIA. (45)

Anorexia, nausea, vomitus, inflatio, ructus, ruminatio, cardialgia, gastrodynia, pauciora, saltem vel plura horum simul concurrentia, plerumque cum alvo adstricta, et sine alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium, morbo.

Dyspepsia, Vog. 233. Lond. Med. Obs. vi. 11.

Apepsia, Vog. 276.

Diaphora, Vog. 278.

Anorexia, S. gen. 162. Lin. 116. Sag. gen. 160.

Gastrodynia, S. gen. 203. Sag. gen. 161.

Soda, Lin. 47. Vog. 161.

Nausea, S. gen. 250. Lin. 182. Vog. 159. Sag. gen. 185.

Vomitus

DYSPEPSIA. (44)

Vomitus, S. gen. 251. Lin 183. Vog. 214. Sag. 186.

Flatulentia, S. gen. 271. Lin. 165. Vog. 127.

Sag. gen. 207.

Cardialgia, S. gen. 202. Lin. 48. Vog. 157. Sag. 160.

* *Idiopathicae.*

Anorexia, pituitosa, S. sp. 2. a sabura, sp. 9. exhaustorum, sp. 8. paralytica, sp. 1. Nausea ex cacochylia, sp. 11. Vomitus pituitosus, sp. 26. ruminatio, sp. 6. a saburra, sp. 2. a crapula, sp. 1. lacteus, sp. 3. Flatulentia infantilis, sp. 5. acida, sp. 1. nidorosa, sp. 2. Cardialgia bradypeptæ, sp. 9. a saburra, sp. 2. lactantium, sp. 11. flatulenta, sp. 3. paralytica, f. 7. Gastrodynia saburræ, sp. 1. flatulenta, sp. 2. periodynia, sp. 7. attergens, sp. 9. atterens, sp. 10. a frigore, sp. 18.

** *Symptomaticæ.*

1. A morbo ipsius ventriculi.

Cardialgia scirrhusa, S. sp. 6. Vomitus, a pyloro calloso, sp. 8. a steatmate ventriculi, sp. 11. Nausea ab apostemate circa cardiam, sp. 9. Gastrodynia ulcerosa, sp. 5. Vomitus ab ulcere ventriculi, sp. 10. Cardialgia a veneno, sp. 2. Gastrodynia a veneno, sp. 4. Vomitus a veneno, sp. 7. Flatulentia accidentalis, sp. 4. Gastrodynia a peregrinis, sp. 11. Anorexia biliosa, sp. 6. Nausea biliosa, sp. 6. Gastrodynia biliosa, sp. 3. Vomitus urinosus, sp. 27. Gastrodynia calculosa, sp. 8. Vomitus bezoarticus, sp. 13. Cardialgia, verminosa, sp. 10. Nausea a tænia, sp. 1. Vomitus verminosus, sp. 5. Gastrodynia a xiphoide, sp. 12. Gastrodynia Americana, sp. 6. Nausea ex compresso ventriculo, sp. 5. Vomitus a cartilagine xiphoidea, sp. 22. Vomitus ab œsophago obstructo, sp. 21. Gastrodynia gastrocelica, sp. 20. Nausea ex gastrocele, sp. 4. Vomitus gastrocelicus, sp. 18. Cardialgia sputatoria, sp. 5. Cardialgia inflammatoria, sp. 13. Nausea ex gastritide, sp. 10. Vomitus gastriticus, sp. 19.

2. A morbo aliarum partium vel totius corporis.

Vomitus cephalalgicus, sp. 23. Vomitus a dentitione, sp. 4. Vomitus iliacus, sp. 24. Nausea ex pancreatis schirro, sp. 3. Vomitus a pancreate, sp. 17. Vomitus ab hepate obstructo, sp. 16. Anorexia melancholica, sp. 5. Gastrodynia hy-

pochondriaca, sp. 16. Flatulentia hypochondriaca, sp. 3. Flatulentia convulsiva, sp. 7. Vomitus hypochondriacus, sp. 6. Vomitus atrabiliaris, sp. 15. Anorexia mirabilis, sp. 10. Gastrodynia hysterica, sp. 14. Gastrodynia pulsatilis, sp. 13. Gastrodynia chlorotica, sp. 15. Nausea a semine corrupto, sp. 8. Nausea gravidarum, sp. 2. Vomitus gravidarum, sp. 12. Flatulentia lochialis, sp. 6. Anorexia arthritica, sp. 12. Cardialgia arthritica, sp. 8. Nausea nephritica, sp. 7. Vomitus nephriticus, sp. 20. Anorexia Stewartiana, sp. 13. Cardialgia a cardiogmo, sp. 12. Anorexia plethorica, sp. 3. Anorexia cachectarum, sp. 7. Anorexia febrilis, sp. 4. Cardialgia febricosa, sp. 4. Gastrodynia febricosa, sp. 17. Vomitus febricosus, sp. 29. Vomitus rabiosus, sp. 14. Vomitus hæmorrhagicus, sp. 28. Gastrodynia metastatica, sp. 19. Nausea marina, sp. 12. Vomitus marinus, sp. 25. Anorexia neophytorum, sp. 11.

HYPOCHONDRIASIS. (45)

Dyspepsia cum languore, moestitia, et metu, ex causis non æquis, in temperamento melancholico.

Hypochondriasis, S. gen. 220. Lin. 76. Vog. 218. Sag. 332.

Morbus hypochondriacus, Boerh. 1098.

Malum hypochondriacum, Hoffm. iii. 64. Junck. 36.

Speciem idiopathicam unicam tantum novi.

Hypochondriasis melancholica, S. sp. 3.

De Hypochondriasi algida, S. sp. 10. mihi non liquet.

Species sequentes ex Fræcassino, ex theoria parum certa cōfictæ, mihi videntur:

Hypochondriasis biliosa, S. sp. 1. sanguinea, sp. 2. pituitosa, sp. 4.

Symptomaticæ sunt,

Hypochondriasis hysterica, S. sp. 5. phibifica, sp. 6. asthmatica, sp. 7. calculosa, sp. 8. tympanitica, sp. 9.

CHLOROSIS. (46)

Dyspepsia, vel rei non esculentæ desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venæ minus plenæ, corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum† retentio.

Chlorosis

† In hoc charactere antea dixi menstruorum *sæpe* retentio; quasi species chlorosis esset in qua menses rite fluxerunt, et cogitavi de specie quadam cachexiæ huc

Chlorosis, S. gen. 309. Lin. 222. Vog. 335. Sag.
135. Boerh. 1285. Hoffm. iii. 311. Junck. 86.

Chloroseos unicam speciem veram agnoscimus, scilicet,

Chlorosis virginea, S. sp. 1. a. Chlorosis amatoria.

Caeterae Sauvagesii species spuriae, sive decolorationes, symptomaticae sunt :

Chlorosis a menorrhagia, S. sp. 2. gravidarum,
sp. 3. infantum, sp. 4. verminosa, sp. 5. viridis, sp. 6. ab hydrothorace, sp. 7. maculosa, sp.
8. Carthagenica, sp. 10. Bengualensis, sp. 11.
rachialgica, sp. 12.

ORDO. III. SPASMI.

Musculorum vel fibrarum muscularium motus abnormes.*

Spasmi, S. cl. iv. Vog. cl. v. Sag. cl. vii.

Motorii, Lin. cl. vii.

Morbi spasmodici et convulsivi, Hoffm. iii. 9.

Spasmi et convulsiones, Junck. 45. 54.

Epilepsia, Boerh. 1071. 1088.

§ I. In functionibus animalibus.

TETANUS. (47)

Plurium musculorum rigiditas spastica.

Variat,

a. Gradu ; dimidium vel totum corpus spasmis affectum.

Tetanus, S. gen. 122. Lin. 127. Vog. 180. Sag.
gen. 228.

Catochus,

huc referenda. Sed nunc dubito an species cachexiae quaevis sub titulo Chlorosis, vel sub caractere hic dato, recte poni possit ; et nullam Chlorosis speciem veram, praeter illam quae retentionem menstruorum comitatur, agnoscere vellem. Hinc vocabulum *saepe* in caractere nunc omissum est ; sed simul fateri cogor, chlorosin ideo hic minus recte pro genere recensitam esse, cum pro symptomate, amenorrhoeae semper haberi possit.

* Motus abnormes sunt, qui ex causa praeternaturali oriuntur, et qui violentia, frequentia, vel diuturnitate contractionis praeter modum fiunt ; et nullus dubito quin huiusmodi motus, in morbis omnibus sub hoc ordine a nobis collocatis, revera fiunt ; plures licet morbi sint, quam sub eodem ordine ab aliis nosologis recensiti fuerunt.

TETANUS. (47)

Catochus,* S. gen. 123. Lin. 128. Vog. 183. Sag. 229.

Opisthotonos, Vog. 181.

Episthotonos, Vog. 182.

Hujus species, ut solet, plures recensuit Sauvagesius ; sed omnes, quae idiopathicae dici queunt, ad unam, ni fallor, referri possunt, et cujus forma præcipua apud Sauvagesium appellatur

Tetanus Indicus, S. sp. 5. de quo plura haberi possunt apud Hillary Barbadoes, p. 219. Chalmers, Lond. Med. Obs. vol. i. art. 12. D. Monro, Edinb. Phys. et Liter. Essays, vol. iii. art. 30. A. Monro, art. 31. et sub nomine Spasmi apud Eontium de med. Ind. meth. med. cap. 2.

Nec alius morbos est, Convulsio Indica, S. sp. 9.

b. Ratione causae remotae, quatenus nimirum vel a causa interna, vel frigore, vel a vulnere oriatur.

A vulnere, varietas frequentissima apud Sauvagesium appellatur

Tetanus traumaticus, S. sp. 11.

c. Ratione partis corporis affectae, quavis causa ortus ; hinc,

Tetanus tonicus S. sp. 1.

Tetanus holotonicus, sp. 4.

Catochus holotonicus, sp. 1. M. Febr. in Ephem. German. D. ii. A. i. obs. 1.

Catochus cervinus, S. sp. 2. Stork. Ann. Med. 1758 M. Julio.

Tetanus opisthotonicus, sp. 3.

Tetanus emprosthotonicus, sp. 2.

Tetani species symptomticae sunt,

Tetanus febricosus, S. sp. 10. Stork. Ann. Med. 759. p. 166. hemiplegicus, sp. 9. lateralis†

sp. 6.

* Catochus apud Sauvagesium genus est minime naturale, cum genus illud conjunxerit species naturae prorsus diversas ; ideoque ejusmodi genus omisi, sed species sub eo recensitas, quæ a rigiditate spastica pendeant, ad Tetani genus huc retuli.

† In exemplo Tetani lateralis quod profert Sauvagesius, adfuit in eodem ægro alterius lateris paralyfis ; ideoque hic mox post Tetanum hemiplegicum posui ; sed si Tetani lateralis exemplum a Morgagnio allatum, sine alterius lateris paralyfi fuit, de quo tamen mihi non constat, idem inter varietates idiopathicas recenseri potuisset. Interim, donec hæc res certius determinaretur, post Tetanum lateralem posui Pleurosthoton Strackii,

TETANUS. (47)

sp. 6. Morgagn. de caus. et sed. x. 2, et 3. Pleurosthotonos Strack. Tetanus syphiliticus, sp. 7. verminosus, sp. 8. hystericus, sp. 12. mirandus, sp. 13. Catochus diurnus, sp. 6.

TRISMUS. (48)

Praecipue maxillae inferioris spastica rigiditas.

Trismus, S. gen. 117. Lin. 124. Sag. 223.

Capistrum, Vog. 208.

I. Species verae sunt,

1. Trismus (*nascentium*) infantes intra duas primas a nativitate septimanas corripiens.

Trismus nascentium, S. sp. 1. Gallis Americanis mal de machoire. Heister, comp. med. pract. cap. xv. § 10. Cleghorn's Minorca, Introd. p. 33. Hofer. in Act. Helvet. tom. 1. p. 65. Maco. p. 459.

2. Trismus (*traumaticus*) omnium ætatum, a vulnere vel frigore.

Trismus traumaticus, S. sp. 2. Lond. Med. Obs. vol. i. art. 1. 7. vol. ii. 8. 34. vol. iii. 31. vol. iv. 7. vi. 13. Med. Trans. ii. 4.

Angina spasmodica, sp. 118. Zwingeri act. Helvet. Convulsio a nervi punctura, sp. 2.

Trismus catarrhalis, sp. 15. Hillary's Barbadoes, 221. Lond. Med. Obs. vol. iv. 7.

- II. Sequentes apud Sauvagesium Trismi species, spurias, vel falsas dicimus; vel quod non a spasmus, sed ab alio musculorum vitio pendeant, vel quod convulsivae potius quam spasmodicae sint, vel, denique, quod faciei potius quam maxillae inferioris, musculorum affectiones sint,

Trismus inflammatorius, S. sp. 3. scorbuticus, sp. 4. capistratus, sp. 11. arthriticus, sp. 9. verminosus, sp. 5. hypochondriacus, sp. 8. febrilis, sp. 10. crepitans, sp. 7. occipitalis, sp. 12. maxillaris, sp. 13. dolorificus, sp. 14. cynicus, sp. 16. cynogelos, sp. 17. sardonius, sp. 18. diastrophe, sp. 19.

CONVULSIO. (49)

Musculorum contractio clonica, abnormis, citra soporem.

Convulsio, S. gen. 128. Lin. 142. Vog. 191. Sag. 235.

1. Idio-

CONVULSIO. (49)

1. Idiopathicae.

Convulsio universalis, S. sp. 11. Hieranofos, Lin.
144. Vog. 190. Convulsio habitualis, S. sp. 12.
intermittens, sp. 16. hemitotonos, sp. 15. abdo-
minis, sp. 10. ab inanitione, sp. 1. ab onani-
smo, sp. 13. Scelotyrbe festinans, sp. 2.

2. Symptomaticae.

Convulsio a capitis ictu, S. sp. 4. nephralgica, sp. 6.
gravidarum, sp. 14. Scelotyrbe verminosa, sp. 5.
Convulsio febrilis, sp. 3.

CHOREA.* (50)

Impuberes utriusque sexus, ut plurimum intra decimum
et decimum quartum ætatis annum adoriens, motus
convulsivi ex parte voluntarii, plerumque alterius lateris,
in brachiorum et manuum motu, histrionum gesticulatio-
nes referentes; in gressu, pedem alterum sæpius trahen-
tes quam attollentes.

Scelotyrbe, S. gen. 136. Sag. gen. 243.

Chorea, Lin. 139.

Speciem unam tantum videre mihi contigit, quae apud
Sauvagesium audit,

Scelotyrbe chorea Viti, S. sp. 1.

Chorea St. Viti Sydenham. Sched. monitoria.

Nec alia est,

Scelotyrbe instabilis, S. sp. 3. et fortassis,

Scelotyrbe intermittens, sp. 4.

Hieranofis, Mach. 558.

RAPHANIA. (51)

Articulorum contractio spastica, cum agitatione convulsiva,
dolore violentissimo, periodico.

Raphania, Lin. 145. Vog. 193. Linn. Amoen.
acad. vol. vi.

Convulsio raphania, S. sp. 7.

Germanis Die Kriebel Krankheit.

Eclampsia typhodes, S. sp. 1. Sennert. de febr. Lin.
iv. cap. 16. Gregor. Horst. oper. tom. ii. Lin.
viii. obs. 22. Willis de morb. convuls. Muller
apud Haller, disp. tom. i. Watschmied apud
Haller, disp. tom. vii. Wedel, ibid. Hoffm.
tom.

* In priore hujus libri editione, Choream pro convulsionis specie habui; cum
autem ratione tum ætatis quam adoriatur, tum motuum quos exhibet, a quavis
alia convulsionis specie plurimum differat, hic pro genere diverso posui.

RAPHANIA. (51)

tom. i. 231. Kannigieffer, A. N. C. tom. vii. Brunner in Ephem. Germ. D. iii. A. ii. obs. 224. Willisch. ibid. Cent. vii. obs. 13. Wepfer de affect. cap. obs. 120. Breslauer Sammlung 1717. Julio, Septembri, et Decembr. Ibid. 1723. Januar. A. N. C. vol. vii. obs. 41. Bruckmann. Comm. Norimb. 1753, p. 50. Soc. Royale, i. mem. p. 303. ii. mem. p. 587.

Convulsio ab ustilagine, S. sp. 8.

An Convulsio Soloniensis vel Necrosis ustilaginea sit idem morbus?

Vide Salerne in Memoires presentés a l'acad. des sciences, tom ii.

EPILEPSIA. (52)

Musculorum convulsio cum sopore.

Epilepsia, S. gen. 134. Lin. 143. Vog. 188. Sag. 24. Boerh. 1771. Hoffm. iii. 9. Junck. 54. Lond. Med. Obs. vi. 9.

Eclampsia,* S. gen. 133. Vog. 189. Sag. 240.

* *Idiopathicae.*

1. Epilepsia (*cerebralis*) sine causa manifesta subito adoriens; praegressa nulla sensatione molesta, nisi fortassis vertiginis vel Scotomiae alicujus.

Epilepsia plethorica, S. sp. 1. Eclampsia, plethorica, sp. 7. Epilepsia cachectica,† sp. 2? a terrore, Macb. p. 556.

2. Epilepsia (*sympathica*) sine causa manifesta; sed praegressa sensatione aurae cujusdam a parte corporis quadam versus caput assurgentis.

Epilepsia sympathica, S. sp. 8.

—— pedisympomatica, sp. 6.

3. Epilepsia

* Eclampsiam quasi morbum acutum, ab Epilepsia, quam pro Chronico habent, distinguere, et pro diverso genere ponere, voluerunt Sauvagesius et Vogelius; sed, cum inter morbos acutos et chronicos limites accuratos ponere ubique difficile sit, et cum Eclampsia Sauvagesii, tum causis tum phaenomenis plerumque cum Epilepsia exacte congruat, illam genere ab Epilepsia diversam esse nequaquam habere possum. Ejusmodi genus prorsus omisit Linnaeus et quae plura ad Eclampsiam ab Epilepsia distinguendam protulit Sagarus, speciem tantum, non genus, distinguere possunt.

† Epilepsia, apud Sauvagesium cachectica dicta, revera duarum specierum esse videtur. Primo enim hanc cachecticam cum serosa Hoffmanni et Pilonis eandem esse auctor statuit; deinceps, utpote acri repulso orta, eadem esse cum specie sua undecima, nimirum Exanthematica, statui potest. Hinc est quod hanc epilepsiam cachecticam utroque loco posui, sed dubius, et aliis dijudicandum relinquens.

EPILEPSIA. (52)

3. Epilepsia (*occasionalis*) ab irritatione manifesta oriens, et ablata irritatione cessans.

Variat pro diversitate irritamenti, et hinc

- a. Ab injuria capiti illata.

Epilepsia traumatica, S. sp. 13.

Eclampsia traumatica, sp. 9.

- b. A dolore.

Epilepsia a dolore, S. sp. 10. Ed. Eff. V. 61.

———— rachialgica, sp. 14.

Eclampsia a doloribus, sp. 4.

a. Rachialgica.

b. Ab otalgia.

c. A dentitione.

Eclampsia parturientium, sp. 3.

- c. A vermibus.

Eclampsia verminosa, S. sp. 2.

- d. A veneno.

Eclampsia ab atropa, S. sp. 11. ab oenanthe, sp. 12.

a cicuta, sp. 13. a coiiaria, sp. 14.

- e. A scabie, vel alia acris humoris effusione, retro-pulsa.

Epilepsia exanthematica, S. sp. 11.

———— cachectica, sp. 2.

- f. A cruditate ventriculi.

Epilepsia stomachica, S. sp. 3.

Eclampsia a saburra, sp. 5.

- g. A pathemate mentis.

Epilepsia a pathemate, S. sp. 7.

- h. Ab hæmorrhagia nimia.

Eclampsia ab inanitione, S. sp. 8.

- i. A debilitate.

Eclampsia neophytorum, S. sp. 15.

** *Symptomaticæ.*

Epilepsia febricosa, S. sp. 9. Eclampsia febricosa,

sp. 17. exanthematica, sp. 10. Epilepsia uteri-

na, sp. 4. syphilitica, sp. 12. Eclampsia ab

hydrocephalo, sp. 16. ab ischuria, sp. 6.

§, II. *In functionibus vitalibus.*

* *In actione cordis.*

PALPITATIO. (53)

Motus cordis vehemens, abnormis.

Palpitatio

PALPITATIO. (53)

Palpitatio, S. gen. 130. Lin. 132. Vog. 213. Sag. 257. Hoffm. iii. 83. Junck. 33. Macb. 569.

Si palpitatiois causae variae externis dignosci possent, plures ejus species cum Sauvagesio pro diversitate causae statuere potuissimus; sed, cum causae diversae nullo modo, quantum novimus, distingui queant, non nisi speciem unicam idiopathicam statuere possum, et quam caractere sequenti insigniri vellem.

Palpitatio (*cardiaca*) fere constans, saltem saepe rediens, sine alio morbo evidente.

Pro synonymis sequentes Sauvagesii species recensere placet.

Palpitatio ab aneurysmate cordis, sp. 1. Senac, Mal. de coeur. p. 284. Lancisi de aneurysm.

—— tremula, sp. 4. Senac de coeur, p. 504.

—— apostematosa, sp. 7. Lancisi de aneurysmate, lib. 1. prop. 5. Senac de coeur, 485.

—— a corde officato, S. sp. 2. Senac de coeur, p. 484. Morgagn. de sed. Ep. xxiv. 17.

—— calculosa, sp. 3.

—— a polypo, sp. 5. Senac de coeur, lib. iv. cap. 16. p. 484. polyposa, sp. 6.

—— ex aortae aneurysmate, sp. 8.

—— ex aortae angustia, sp. 9. Lancisi de aneurysm. prop. 53. Senac, 484.

Palpitationis species symptomaticae sunt,

Palpitatio a pancreate, S. sp. 10. Storck, Ann. med. i. p. 245.

—— arthritica. sp. 11.

—— chlorotica sp. 12.

—— hysterica, sp. 13.

—— melancholica, sp. 14. Lancisi de aneurysm. prop. 44.

—— febricosa, sp. 15. Storck, Ann. med. i. p. 75.

** In actione pulmonum.

ASTHMA. (4)

Spirandi difficultas per intervalla subiens; cum angustiae in pectore sensu, et respiratione cum sibilo strepente; tussis sub initio paroxysmi difficilis, vel nulla, versus finem libera, cum sputo mucosi saepe copioso.

ASTHMA. (54)

Asthma, S. gen. 145. Lin. 161. Vog. 268. Sag. 252.
Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum.

Hoffm. iii. 94.

Asthma spasticum, Junck. tab. 51.

* *Idiopathicae.*

1. Asthma (*spontaneum*) sine causa manifesta, vel alio morbo comitante.

Asthma humidum, S. sp. 1. flatulentum, Floyer on the asthma, chap. 1.

Asthma convulsivum, sp. 2. Willis, Pharm. rat. p. 2. sect. 1. cap. 12. Med. Tr. i. 7.

Asthma hysterium, sp. 3. Floyer on the asthma, chap. 1.

Asthma stomachicum, sp. 8. Floyer, scheme of the species of asthma. Periodic asthma, 6.

Orthopnoea spasmodica, sp. 3.

Orthopnoea hysterica, sp. 4.

2. Asthma (*exanthematicum*) a scabie vel alia acris effusione retropulsa.

Asthma exanthematicum, S. sp. 11.

—— cachecticum, sp. 13.

3. Asthma (*plethoricum*) a suppressa evacuatione sanguinis antea solita, vel a plethora spontanea.

Asthma plethoricum, S. sp. 15.

** *Symptomaticae.*

Asthma hypochondriacum, sp. 4.

—— arthriticum, sp. 5.

—— venereum, sp. 14. Junck. tab. 32.

DYSPNOEA. (55)

Spirandi difficultas perpetua, sine angustiae, et potius cum repletionis et infarctus in pectore, sensu. Tussis per totum morbi decursum frequens.

Dyspnoea, S. gen. 144. Lin. 160. Vog. 267. Sag. 251. Junck. 32.

Orthopnoea, S. gen. 146. Lin. 162. Vog. 269. Sag. 253. Macb. 574.

* *Idiopathicae.*

1. Dyspnoea (*catarrhalis*) cum tussi frequente, mucum viscidum copiosum ejiciente.

Asthma catarrhale, S. sp. 16.

—— pneumonicum, Willis, Pharm. rat. P. ii. sect. 1. cap. 12.

Asthma

DYSPPNOEA. (55)

Asthma pituitosum, Hoffm. iii. sect. ii. cap. 2. § 3.
 ——— pneumodes, sp. 17. Ed. Eff. iii. 25.

2. Dysppnoea (*sicca*) cum tussi plerumque sicca.

Hujus causae variae haud facile dignoscendae sunt;
 sequentes autem Sauvagesii species huc referri possunt.

Dysppnoea a tuberculis, S. sp. 2. a steatomatis, sp. 5.
 Orthopnoea a lipomate, sp. 18. Dysppnoea, a hydatibus, sp. 4. polyposa, sp. 20.

3. Dysppnoea (*aërea*) a minima quavis tempestatum mutatione aucta.

Dysppnoea a pneumatia, S. sp. 12.

4. Dysppnoea (*terrea*) cum tussi materiem terream vel calculosam ejiciente,

Dysppnoea calculosa, Macb. 574.

5. Dysppnoea (*aquosa*) cum urina parca et oedemate pedum, sine fluctuatione in pectore, vel aliis characteristicis hydrothoracis signis.

Dysppnoea pituitosa, S. sp. 1.

Orthopnoea ab hydropneumonia, sp. 12.

6. Dysppnoea (*pinguedinosa*) in hominibus valde obesis.

Orthopnoea a pinguedine, S. sp. 6.

7. Dysppnoea (*thoracica*) a partibus thoracem cingentibus laesis, vel male conformatis.

Dysppnoea traumatica, S. sp. 15. Orthopnoea traumatica, sp. 14. Dysppnoea Galenica, sp. 16. rachitica, sp. 10. Asthma a gibbo, sp. 9.

8. Dysppnoea (*extrinseca*) a causis externis manifestis.

Asthma pulverulentorum, S. sp. 7. metallicum, sp. 12. Orthopnoea a vaporibus, sp. 16. a deglutitis, sp. 9. a fungis, sp. 25. ab antipathia, sp. 15. a bronchocele, sp. 10.

** Symptomaticae

1. Morborum cordis vel vasorum majorum.

Dysppnoea a corde, S. sp. 11. Asthma a polypocordis, sp. 6. Orthopnoea cardiaca, sp. 2. polyposa, sp. 26. Dysppnoea aneurysmatica, sp. 19. Orthopnoea ab aneurysmate, sp. 8. Dysppnoea ab aortae angustia, sp. 22.

2. Tumoris abdominalis,

Dysppnoea a physconia, S. sp. 7. a graviditate, sp. 8. tympanitica, sp. 9. a liene sp. 14. a stomacho, sp. 13.

DYSPONOEA. (55)

sp. 13. a gastrocele, sp. 17. Orthopnoea a gastrocele, sp. 11.

3. Variorum morborum.

Asthma febricosum, S. sp. 18. Orthopnoea febricosa, sp. 20. peripneumonica, sp. 1. pseudo-peripneumonica, sp. 21. variolosa, sp. 24. Dyspnoea scorbutica, sp. 18. Orthopnoea scorbutica, sp. 22. a hydrothorace, sp. 5. ab empyemate, sp. 13. a vomica sp. 7. Dyspnoea a vomica, sp. 6. Orthopnoea a hydrocephalo, sp. 23. a vermibus, sp. 17.

PERTUSSIS. (56)

Morbus contagiosus; tussis convulsiva, stragulans, cum inspiratione sonora, iterata; saepe vomitus.

Pertussis Sydenham. Ed. Leid. p. 200. 311. 312.

Huxham de aëre, ad ann. 1732. Lond. Med. Obs. iii. 27. 30. Soc. Royale iii. hist. p. 268.

Tussis convulsiva, sive ferina, Hoffm. iii. 111.

Tussis ferina, sp. 10. Sag. sp. 10.

Tussis convulsiva, sp. 11. Sag. sp. 11.

Amphimerina tussiculosa, sp. 13.

§ III. *In functionibus naturalibus.*

PYROSIS. (57)

Epigastrii dolor urens, cum copia humoris aquei, plerumque insipidi, aliquando acris eructata.

Pyrosis, S. gen. 200. Sag. gen. 158.

Soda, Lin. 47. Vog. 154.

Scotis, the *Water-Brash*.

Species unica vera,

Pyrosis Suecica, S. sp. 4.

Cardialia sputatoria, sp. 5. Macb. p. 515.

Cæteræ Sauvagesii species symptomaticae sunt;

Pyrosis vulgaris, S. sp. 1. a conceptione, sp. 6. biliosa, sp. 2. a phlogosi, sp. 3. ulcerosa, sp. 5.

COLICA. (58)

Dolor abdominis, praecipue circa umbilicum torquens; vomitus; alvus adstricta.

Colica, S. gen. 204. Lin. 50. Vog. 160. Sag. 162. Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, Hoffm. ii. 284. Macb. p. 519.

Rachialgia,

COLICA (38)

Rachialgia, S. gen. 211. Sag. 168.

Ileus, S. gen. 252. Vog. 162. Sag. 187.

Iliaca, Lin. 185.

Dolor et spasmus iliacus, Hoffm. ii. 263.

Passio iliaca, Junck. 107.

* *Idiopathicae.*

1. Colica (*spasmodica*) cum retractione umbilici et spasmis musculorum abdominalium.

Colica spasmodica, S. sp. 7. flatulenta, sp. 1. Ile-

us physodes, sp. 9. Colica biliosa, sp. 5*. Edin.

Med. Eff. iii. 27. Colica pituitosa, sp. 2†. Ile-

us a colo pituita infarcto, sp. 5. Indicus, sp. 8.

Variat symptomatis superadditis; hinc,

- a. Colica cum vomitu stercoris, vel rerum per anum injectarum.

Ileus spasmodicus, S. sp. 3†. Lond. Med. Obs. IV.

17. Edinb. Phys. Eff. II. 27. 28.

Ileus volvulus, S. sp. 7.

- b. Colica cum inflammatione superveniente.

Ileus inflammatorius, S. sp. 1.

Colica phlogistica, sp. 6.

2. Colica (*pietionum*) praeunte ponderis vel molestiae in abdomine, praecipue circa umbilicum, sensu; accedente dolore colico, primum levi, non continuo, et praecipue post pastum aucto; tandem graviore et fere perpetuo; cum dolore brachiorum, et dorsi, in paralyfin demum abeunte.

Rachialgia

* Cum vomitus quivis vehemens et saepe repetitus bilem plerumque eliciat, colicam quam, ex vomitu bilis solo, biliosam appellarunt medici, omnino spasmodicam esse censeo.

† Pituita in parte quadam intestinorum congesta non nisi a spasmio obstruente fieri videtur; ideoque tum colicam pituitosam, tum ileum, a colo pituita infarcto, hic apposui.

‡ Ileus gradu tantum, nequaquam natura, a colica differre mihi videtur; ideoque ileum pro varietate colicae tantum hic recensui. Multi quidem medici ileum omnem inflammatorium esse putarunt. Dolorem autem abdominis, sive colicam, cum vomitu stercoris sine inflammatione adesse, ipse aliquoties vidi. Sin autem inflammatio aliquando adfit, si eadem colicae supervenerit, colicam phlogisticam dari recte monuit Sauvagesius; nec ideo epigenomeno genus mutari; et si quidem cum dolore abdominis et vomitu ab initio adfuerit inflammatio, morbum pro enteritide habere vellem. Denique, quovis modo dari ileum genus a colica diversum concedere non possum.

COLICA. (58)

Rachialgia pictonum, S. sp. 1*.

Colica pictonum Citesii et succedentium Auctorum.
Med. Trans. i. 12. 13. 14. 15. 20. Edinb. Phys.

Eff. i. 22. Chalmers's Carolina, p. 187.

Colica nervosa, Macb. p. 524.

Variat ratione causae remotae; et hinc

a. A veneno metallico.

Rachialgia metallica, S. sp. 3.

Colica pictonum Tronchin. sp. 2. five a causa remota 2da.

b. Ab acidis ingestis.

Rachialgia pictonum, S. sp. 1. Tronchin. sp. 3.

c. A frigore.

Rachialgia ab adiapneustio, Tronchin. sp. 5.

d. A contusione dorfi.

Rachialgia traumatica, S. sp. 7.

3. Colica (*stercorea*) in hominibus alvi tardae, post diurnam alvi obstipationem.

Colica stercorea, S. sp. 3.

Ileus a faecibus induratis, S. sp. 2.

4. Colica (*accidentalis*) a materie acri ingesta.

Colica accidentalis, S. sp. 18. Colica Japonica, sp.

10. Colica lactentium, sp. 20. Ileus a veneno,

sp. 14. Cholera sicca auriginosa a fungis venenatis, sp. 2.

5. Colica (*meconialis*) neophytorum a meconio retento.

Colica meconialis, S. sp. 19.

6. Colica (*callosa*) cum sensu in quadam intestinorum parte stricturae, et saepe ante eam collecti flatus cum aliquo dolore, qui flatus etiam per eandem paulatim transiens evanescit; alvo tarda, et tandem non nisi faeces paucas liquidas egerente.

Ileus a callosa coli strictura, S. sp. 11, Edin. Med.

Eff. iv. 31.

7. Colica

* Rachialgiam a colica genere diversam esse nequaquam video. Symptomata enim colicae essentialia in utroque morbo semper adsunt; et si forte alteri quaedam superaddita sint, haec speciem non genus diversum constituere possunt. Ut medici igitur nuperi fere omnes, ita ego quam rachialgiam appellarunt Astrucius et Sauvagesius, pro specie colicae habui ac recensui.

COLICA. (58)

7. Colica (*calculosa*) cum duritie in quadam parte abdominis fixa; calculis quondam per anum dejectis.

Colica calculosa, S. sp. 15. Edinb. Med. Ess. i. 32.

Edinb. Phys. Ess. ii. 26.

Ileus calculosus, S. sp. 10.

** *Symptomaticæ.*

Colica febricosa, S. sp. 21. Rachialgia febricosa, sp. 2. Tronchin. sp. 1. Colica hysterica, sp. 17. gravidarum, sp. 16. verminosa, sp. 4. Ileus verminosus, sp. 13. Colica Lapponica, sp. 9. Rachialgia arthritica, sp. 4. Tronchin. sp. 4. scorbutica, sp. 6. Ileus herniosus, sp. 6. Colica enterocelica, sp. 22. Ileus ab intestino compresso, sp. 4. Colica schirrosa, sp. 12. pancreatica, sp. 13. mesenterica, sp. 11. Rachialgia ab osteofarctosi, sp. 8. Colica plethorica, sp. 8. *a.* haemorrhoidalis. *b.* catamenialis. Colica pulsatilis, sp. 14. Ileus imperforatorum, sp. 12.

CHOLERA. (59)

Humoris biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; furarum spasmata.

Cholera, S. gen. 253. Lin. 186. Vog. 110. Sag. G. 188. Hoffm. ii. 165.

Diarrhoea cholericæ, Junck. 112.

* *Idiopathicae.*

1. Cholera (*spontanea*) tempestate calida, sine causa manifesta oboriens.

Cholera spontanea, S. sp. 1. Sydenh. sect. iv. cap.

2. Cleghorn's diseases of Minorca.

Cholera Indica, sp. 7.

2. Cholera (*accidentalis*) a rebus acribus ingestis.

Cholera crapulosa, S. sp. 11. a venenis fossilibus,

sp. 4. a veneno animali, sp. 5.

** *Symptomaticæ.*

Cholera intermittens, S. sp. 6. inflammatoria, sp.

8. arthritica, sp. 10. verminosa, sp. 9.

DIARRHŒA. (60)

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. gen. 253. Lin. 187. Vog. 105. Sag. 189. Junck. 112.

Hepatirrhoea, S. gen. 246.

Cholericæ

DIARRHOEA. (60)

Cholerica, Lin. 190.

Coeliaca, S. gen. 255. Lin. 189. Vog. 109. Sag. 199.

Lienteria, S. gen. 256. Lin. 188. Vog. 108. Sag. 191.

Pituitaria, Vog. 111.

Leucorrhœis, Vog. 112.

Lambisma ventris fluxus multiplex. Amst. 1756.

* *Idiopathicae.*

1. Diarrhoea (*crapulosa*) qua stercora naturalibus liquidiora et majori copia dejiciuntur.

Diarrhoea stercorosa, S. sp. 1. vulgaris, sp. 2.

2. Diarrhoea (*biliosa*) qua faeces flavae magna copia dejiciuntur.

Diarrhoea biliosa, S. sp. 8.

3. Diarrhoea (*mucosa*) qua vel ab acribus ingestis, vel a frigore, praecipue pedibus applicato, mucus copiosus dejicitur.

Diarrhoea lactentium, S. sp. 19. Dysenteria Pari-
fiaca, sp. 3. Diarrhoea ab hypercatharsi, sp. 16.
Dysenteria a catharticiis, sp. 12. Pituitaria, Vog.
111. Leucorrhœis, Vog. 112. Diarrhoea pitu-
itosa, sp. 4. Coeliaca mucosa, sp. 3. Diarrhoea
serosa, sp. 10. 2. Diarrhoea urinosa.

4. Diarrhoea (*coeliaca*) qua humor lacteus specie chyli dejicitur.

Coeliaca chylosa, S. sp. 1. lactea, sp. 4.

5. Diarrhoea (*lienteria*) qua ingesta parum mutata ce-
leriter dejiciuntur.

Lienteria spontanea, S. sp. 2.

6. Diarrhoea (*hepatirrhoea*) qua materies seroso-cru-
enta, sine dolore dejicitur.

Hepatirrhoea intestinalis, S. sp. 2.

** *Symptomaticae.*

Diarrhoea febrilis, S. sp. 3. febricosa, sp. 20. He-
patirrhoea intermittens, sp. 7. Diarrhoea vario-
losa, sp. 6. pleuriticorum, sp. 21. arthritica,
sp. 9. colliquativa, sp. 13. cholericodes, sp. 17.
Hepatirrhoea vera, sp. 1. a vulnere, sp. 3. me-
senterica, sp. 4. Dysenteria a mesenterii vomica,
sp. 11. Diarrhoea purulenta, sp. 11. Coeliaca
purulenta, sp. 2. Hepatirrhoea scorbutica, sp. 5.
Dysenteria

DIARRHOEA. (60)

Dysenteria scorbutica, sp. 18. Lienteria scorbutica, sp. 3. ex ulcere ventriculi, sp. 1. aphthosa, sp. 4. secundaria, sp. 5. Diarrhoea verminosa, sp. 14. a dentitione, sp. 15. chilienfis, sp. 12. acrasia, sp. 7.

DIABETES. (61)

Urinae plerumque praeternaturalis, copia immodica, profusio chronica.

Diabetes, S. gen. 263. Lin. 197. Vog. 115. Sag. 199. Junck. 99. Dobson, Lond. Med. Observations, Vol. v. Art. 27. Home's Clinical Experiments, sect. xvi.

Diurefis, Vog. 114.

* *Idiopathicae.*

1. Diabetes (*mellitus*) cum urina odoris, coloris, et saporis mellei.

Diabetes Anglicus, S. sp. 2. Mead on poisons. Essay 1. Ejusdem Monita Med. Cap. IX. sect. 2. Lond. Med. Obs. iii. 26. Dobson, in Lond. Med. Obs. Vol. v. Art. 27. Myers, Diss. inaug. de Diabete, Edinb. 1779.

Diabetes febricosus, S. sp. 7. Sydenh. Epist. resp. ad R. Brady*.

2. Diabetes (*insipidus*) cum urina limpida non dulci†.

P p

M. Lister

* Quæri potest, an diabetes febricosus Sydenhami ad diabete mellitum, an ad insipidum referri debeat? Et simul quæri potest, an urina in diabete hysterico vel arthritico sit mellita, an insipida, cum Sydenhamus ipse nullibi de sapore urinae, in diabete quovis, quicquid dixerit? Ad posterius respondere possum, quod, ex propria observatione, novi, urinam in diabete hysterico et arthritico nequaquam dulcem, et fere prorsus inspidam, esse, et diabete febricosum Sydenhami ad diabete mellitum ideo retuli; quod in simili senis, post diuturnam febrem, diabete, urinam omnino dulcem inveni.

† An hujusmodi diabeticæ species sit frequens, incertum est. In omnibus exemplis, iisque non paucis, quæ viderat Willisius, urinam mellitam semper invenit; et observationes nuperac frequentes fere omnes ejusmodi urinam exhibuerunt; ita ut dubium sit, an alia diabeticæ idiopathicae et permanentis species revera detur.—Affirmat autem Listerus; et ego ipse inter plures mellitas unicam inspidam observavi. Ejusmodi itaque speciem dari concedo, ideoque recensui; sed, an recte legitima dici queat, vel an diabetes Aretæi et plurium auctorum ejusmodi fuissent, multum dubito. Ante Willisium quidem, vel prioris ævi, vel extra Angliam, medicorum nemo urinam dulcem annotaverat; sed ejusmodi urinam temporibus Willisi primo et in Anglia tantum comparuisse, minus verisimile est; omnesque ante Willisium de urina in diabete dulci prorsus siluisse, potius observationi perfunctoriae, vel omnino neglectæ, imputarem. Quod observatores, quibus diabeticæ exempla antea occurrebant, vel negligentes vel malæ fidei fuissent suspicor; cum plurimi eorum tam incredibilia, de potu in diabeticis per renes transeunte prorsus

DIABETES. (61)

M. Lister Exerc. medicin. ii. de Diabete.

Diabetes legitimus, S. sp. 1. Aretaeus de Morb. diurn. Lib. ii. cap. 2.

Diabetes ex vino, S. sp. 5. Ephem. Germ. D. i. A. ii. Obs. 122.

**** Symptomaticæ.**

Diabetes hystericus, S. sp. 3. Sydenh. diff. epist. ad G. Cole.

Diabetes arthriticus, S. sp. 6. Sydenh. de podagra.

Diabetes artificialis, S. sp. 4. Malpigh. de liene.

HYSTERIA. (62)

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum et fauces ascendentis, ibique strangulantis; sopor; convulsiones; urinae limpidae copia profusa; animus, nec sponte, varius et mutabilis*.

Hysteria, S. gen. 135. Lin. 126. Vog. 219. Sag. 242.

Malum hystericum, Hoffm. iii. 50. Junck. 36.

Affectio hystERICA, Willis de morb. convulsiv. cap. 5. 10. 11. Sydenh. diff. epist. ad G. Cole. Whytt on nervous disorders.

Quatenus specie differat hysteria idiopathica, dicere non possum, nec, ut opinor, recte dixit Sauvagesius. Species enim ab eo recensitae non, nisi ratione causae remotae, varietates esse mihi videntur. Ita habet,

a. Ab emanatione mensium,

Hysteria chlorotica, S. sp. 2. Raulin, cap. 13.

b. A menorrhagia cruenta.

Hysteria a menorrhagia, S. sp. 3. Raulin. Sydenham, diff. epist. ad G. Cole.

c. A menorrhagia serosa, sive fluore albo.

Hysteria

prorsus immutato, narrant. SYDENHAMUM autem ipsum, adeo perspicacem et diligentem, de statu urinae nihil monuisse, mirum videtur; sed, cum scripta WILKINSII, SYDENHAMO satis nota, urinam semper esse dulcem asseruerint, si diversam invenisset SYDENHAMUS, quin id indicasset, nullus dubito.

* Novit quisque, in Nosologia et in Medicina facienda quatenus exercitatus, quam difficile sit inter dyspepsiam, hypochondriasm, et hysteriam semper accurate distinguere. Genera autem vera, et satis a se invicem distincta, indicasse mihi videor: Recte autem, an secus, fecerim, aliis dijudicandum relinquo. Morbos affines facile inter se misceri probe novi; et in quocunque casu, quisnam eorum pro primario sit habendus, per characteres nosologicos indicare, mihi difficillimum fore agnosco. Posteris, ut spero, hanc rem luculentius expositam dabunt.

HYSTERIA. (62)

- Hysteria a leucorrhoea, S. sp. 4. Raulin, cap. 14.
d. A viscerum obstructione.
 Hysteria emphrastica, S. sp. 5. Raulin, cap. 5.
e. A vitio stomachi.
 Hysteria stomachica, S. sp. 7. Raulin, cap. 4.
f. A salacitate nimia.
 Hysteria libidinosa, S. sp. 6*.
 Manifesto symptomaticae sunt,
 Hysteria verminosa, S. sp. 1. Delii Amoenit. A-
 cadem.
 Hysteria febricosa, S. sp. 8. Wedel. in Ephem.
 German. D. I. A. II. Obs. 193.

HYDROPHOBIA. (63)

Potionis cujuslibet, utpote convulsionem pharyngis dolentem cientis, fastidium et horror; plerumque e morfu animalis rabidi.

Hydrophobia, S. gen. 231. Lin. 86. Vog. 30. Sag.
 343. Boerh. 1138. Junck. 124. Mead on poi-
 sons. Default sur la rage. Sauvages diff. sur
 la rage. James on canine madness. Dalby,
 Virtues of cinnaber and musk against the bite
 of a mad dog. Nugent on the hydrophobia.
 Choisel, Nouvelle methode pour le traitement de
 la rage. Journal de Medicine, passim. Lond.
 Med. Obs. and Inquir. Vol. iii. Art. 34. Vol. v.
 Art. 19. 26. and App. Lond. Med. Transf. Vol.
 ii. Art. 5. 12. and 15. Edinb. Med. Ess. v. Art.
 51. Heysham, Diff. inaug. de rab. canin. Edinb.
 1777. Parry, Diff. inaug. de rab. contagios.
 five canin. Edinb. 1778. Soc. Royale I. Mem.
 p. 105, 146. Andry, Recherches sur la rage,
 1780. Soc. Royale ii. Hist. p. 229. 230. 456.
 iii. Hist. p. 167. Vaughan, Cases of hydrophobia,
 second edit. 1778.

1. Hydrophobia (*rabiosa*) cum mordendi cupiditate ex morfu animalis rabidi.

Hydrophobia vulgaris, S. sp. 1.

Hydrophobia

* In speciebus hysteriae recensendis, egregius Sauvagesius Raulinum, theoriae subtili et fallaci, potius quam observationi, innitentem, secutus fuisse videtur. Nec quidem inter caeteras hysteriae species indicasse videtur Sauvagesius, illam quam maxime exquisitam et frequentissimam, cenfeo, illam, scilicet, quae foeminas adultas, laute viventes, sanguineas, plethoricas, valentiores, et a morbo alio quovis immunes, saepe ex pathemate mentis solo adoritur.

HYDROPHOBIA. (63)

2. Hydrophobia (*simplex*) sine rabie, vel mordendi cupiditate.

Hydrophobia spontanea, S. sp. 2. Edinb. Med. Ess. i. 29.

ORDO. IV. VESANIÆ*.

Mentis † judicantis functiones laesae sine pyrexia vel comate.

Paranoiae, Vog. cl. ix.

Deliria, S. cl. viii. ord. iii. Sag. cl. xi. ord. iii.

Ideales, Lin. cl. v. ord. i.

AMENTIA. (64)

Mentis judicantis imbecillitas, qua homines rerum relationes, vel non percipiunt, vel non reminiscuntur.

Amentia, S. gen. 233. Vog. 337. Sag. 346.

Morosis, Lin. 106.

Stupiditas, morosis, fatuitas, Vog. 336.

Amnesia†, S. gen. 237. Sag. 347.

Oblivio,

* Vesaniarum ordinem hic instituere velim, quae cum classe Vogelii nona, Paranoiae inscripta, eadem omnino sit; sed a classe Vesaniarum Sauvagesii et Sagari in eo diversa, quod horum auctorum ordines Hallucinationum et Morositatum prorsus excludat; itidemque a classe Mentalium apud Linnæum diversa, quod hujus auctoris ordines Imaginariorum et Patheticorum etiam omittat.

A classe Vesaniarum autem tum Hallucinationes tum Morositates exclusas esse velim; quia neque causis, neque symptomatis cum Vesaniis stricte dictis ullo modo congruant. Quis enim Syrigmum vel Bulimiam, vel aliam Hallucinationem sive Morositatem, quae a mentis judicio non pendeat Vesaniam appellare vellet? Verum quidem est, tum hallucinationes, tum morositates, cum vesaniis aliquando conjunctas esse, sed simul adsunt alia vesaniae indicia, quae ejusmodi hallucinationes et morositates affectionis magis generalis symptomata tantum esse ostendunt. Ob has rationes, hallucinationes Sauvagesii et imaginarios Linnæi ad morbos locales olim detuli; et nunc morositates Sauvagesii et patheticos Linnæi, antea a nobis omnino omisos, ad locales etiam deferendos esse censui.

† In priore Nosologiae nostrae editione, has functiones simpliciter mentis esse dixi, minus autem recte; nam perceptio falsa sive hallucinatio, et appetitus erroneus sive morositas, quodammodo ad mentis functiones pertinent; cum vero utraque ab hac classe exclusas esse velim, oportebat classis characterem nunc mutare, et mentis judicantis functiones dicere.

† Amnesiam cum amentia ad unum genus retuli, tum quia plerumque conjungantur, tum quia ab iisdem causis plerumque oriantur, et amnesia ingravescentis ad amentiam semper ducatur.

AMENTIA. (64)

Oblivio, Lin. 107. Vog. 338.

Memoriae debilitas, Junck. 120.

1. Amentia (*congenita*) a nativitate constans.

Amentia morosis, S. sp. 8. microcephala, sp. 6.

2. Amentia (*senilis*) ex perceptione et memoria, in-gravescente aetate, imminutis.

Amentia senilis, S. sp. 1. Amnesia senilis, sp. 2.

3. Amentia (*acquisita*) a causis externis, evidentibus, in hominibus sanæ mentis superveniens.

Amnesia febrile, S. sp. 8. Amentia a quartana, sp. 11. Amnesia cephalalgica, sp. 6. plethorica, sp. 4. Amentia rachialgica, sp. 10. Amnesia a venere, sp. 1. a pathemate, sp. 5. Amentia a venenis, sp. 3. a temulentia, sp. 7. Amentia ab icthū, sp. 9. Amnesia traumatica, sp. 3.

Sequentes Sauvagesii species in Nosologia methodica nequaquam recenseri debent, cum causae internae a quibus characteres desumuntur, per signa externa nequaquam dignosci possint.

Amentia ferosa, S. sp. 2. a tumore, sp. 4. a hydatidibus, sp. 5. a ficitate, sp. 7. calculosa, sp. 12.

MELANCHOLIA. (65)

Infania* partialis sine dyspepsia†.

Melancholia, S. gen. 234. Lin. 71. Vog. 332. Sag. 347. Boerh. 1089. Junck. 121.

Daemonomania, S. gen. 236. Sag. 348.

Daemonia, Lin. 69.

Vesania, Lin. 70.

Panophobia, Lin. 75.

Athymia, Vog. 329.

Delirium melancholicum, Hoffm. iii. 251.

Erotomania, Lin. 82.

Nostalgia,

* Infaniam adesse dicimus, quando rerum relationes omnino falsae mente concipiuntur, ita ut hominis vel pathemata vel actiones praeter rationem excitentur.

† Hypochondriasis et Melancholia non semper distingui possunt. Si quando autem possint, nullo alio signo quam per dyspepsiam in hypochondriasi semper praesentem, in melancholia saepe absentem rite, quantum video, distinguendi sunt.

MELANCHOLIA. (65)

Nostalgia, S. gen. 226. Lin. 83. Sag. 338. Junck.
125.

Melancholia nervea, Cl. Lorry de melancholia,
P. i.

Variat pro varietate rerum de quibus homo deli-
rat. Ita est.

- a. Cum hallucinatione de statu corporis sui a levi-
bus causis periculoso; vel de statu rerum suarum
tristi metuendo.

Melancholia vulgaris, S. sp. 1. argantis, sp. 4.
Panophobia phrontis, sp. 3.

- b. Cum hallucinatione de statu rerum suarum ju-
cundo.

Melancholia moria, S. sp. 5. enthusiastica, sp. 13.
saltans, sp. 8.

- c. Cum amore vehementi sine satyriasi vel nympho-
mania.

Melancholia amatoria, S. sp. 2.
Erotomania, Lin. 82.

- d. Cum superstitioso futurorum metu.

Melancholia religiosa, S. sp. 3.

- e. Cum averfatione motus et omnium vitae officio-
rum.

Melancholia atonita, S. sp. 6.

- f. Cum inquietudine et status cujusvis impatientia.

Melancholia errabunda, S. sp. 7.

- g. Cum taedio vitae.

Melancholia Anglica *, S. sp. 11. phrontis, sp. 14.

- b. Cum hallucinatione de sua speciei natura.

Melancholia zoantropica, S. sp. 12. hippantropica,
sp. 9. scytharum, sp. 10.

Dæmonomaniam nullam veram esse censeo †, et
nostra sententia species sub hoc titulo a Sauva-
gesio recensitae sunt, vel,

1. Species melancholiae five maniae, uti

Daemonomania fanatica, S. sp. 5. Indica, sp. 7.

Vel,

* Apud Anglos fortassis taedium vitae non semper a morbo pendet.

† Ita censeo, quia daemonum in nostra corpora, vel hisce temporibus in mentes
nostras, potentiam ullam esse pauci jam credunt.

MELANCHOLIA. (65)

Vel, 2do, Morbi ab adstantibus ad daemonum potentiam falso relati, uti

Daemonomania a vermibus, S. sp. 4. Polonica, sp. 8. a cardiogmo, sp. 9.

Vel, 3tio, Morbi omnino simulati, uti

Daemonomania sagarum, S. sp. 1. vampirismus, sp. 2. simulata, sp. 3.

Vel, 4to, Morbi partim veri, ut No. 2. partim simulati, ut 3tio, recensiti, uti

Daemonomania hysterica, S. sp. 6.

MANIA. (66)

Infania universalis.

Mania, S. gen. 235. Lin. 68. Vog. 331. Sag. 349.

Boerh. 1118. Junck. 122. Battie on madness.

Paraphrofyne, Lin. 66.

Amentia, Lin. 67.

Delirium maniacum, Hoffm. iii. 251.

1. Mania (*mentalis*) omnino a pathemate mentis.

Mania a pathemate, S. sp. 1. Exempla inveniuntur ex melancholia apud Preysingerum de diagnosi morborum capitis; ex terrore, apud Locherum de mania; ex amore apud Ephem. Nat. Cur. Dec. ii. A. X. Obf. 126.; ex ira apud Hoffm. iii. p. 263.

2. Mania (*corporea*) a vitio corporis evidente.

Variat pro varietate vitii corporis; hinc

Mania metastatica, S. sp. 4.

ab ulcere ficcato Amat. Lusitan. Cent. ii. cur. 67.

a resecta plica, Hoffm. tom. iii. p. 263. Ephem.

N. Cur. Cent. i. Obf. 35.

a represso herpete, Locher de mania.

a menstuis retentis, Schenck. Obf. p. 142.

a semine retento, Schenck. ibid.

a repressa scabie, Lorry de melancholia, tom. ii.

P. ii. cap. 3.

a graviditate, Lorry, P. i. cap. 7.

a pariori lactis et lochiorum fluxu, Puzos, 3.

Mem.

Mania lactea, S. sp. 2. hystericalgica, sp. 8. ab hemimicrania, sp. 3. a venenis, sp. 5. Phrenitis inanitorum, sp. 16.

3. Mania

MANIA. (66)

3. Mania (*obscura*) praegressio nullo vel pathemate mentis, vel vitio corporis evidente.

Mania vulgaris, S. sp. 7. Phrenitis apyreta, sp. 10.

Mania periodica, sp. 6.

Maniae species symptomatae sunt,

Paraphrosyne, S. gen. 232. Sag. 345.

- a. Paraphrosyne a venenis,

Paraphrosyne temulenta, S. sp. 1. a datura, sp. 2.

ab opio, sp. 3. a conio, sp. 4. magica, sp. 5.

- b. Paraphrosyne a pathemate, S. sp. 7.

Paraphrosyne hysterica, S. sp. 12.

- c. Paraphrosyne febrilis.

Delirium, Lin. 65. Vog. 330. Paraphrosyne febri-

ciosa, S. sp. 10. critica, sp. 11. calentura, sp. 9.

puerperarum, sp. 8.

ONEIRODYNIA. (67)

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, Vog. 339.

Somnambulismus, S. gen. 221. Lin. 77. Sag. 333.

Hypnobatasis, Vog. 340.

Noctambulatio, Junck. 124.

Ephialtes, S. gen. 138. Lin. 163. Sag. 245.

Incubus, Vog. 211. Junck. 50.

1. Oneirodynia (*activa*) excitans ad ambulationem, et motus varios.

Somnambulismus vulgaris, S. sp. 1.

————— catalepticus, sp. 2.

2. Oneirodynia (*gravans*) ex sensu ponderis alicujus incumbentis, et pectus praecipue comprimentis.

Ephialtes plethorica, S. sp. 1. stomachica, sp. 2.

hypochondriaca, sp. 6. tertianaria, sp. 5. ver-

minosa, sp. 4. ex hydrocephalo*, sp. 3.

CLASSIS

* Cum hydrocephalus per signa externa non semper dignosci possit, haec species minus apte recensetur; sed ideo apposui, quod ephialtes in iis qui simul anasarca crurum, et hydrothorace vel ascite laborant, ad hydrocephalum utcumque referri possit.

CLASSIS. III. CACHEXIÆ.

Totius vel magnae partis corporis habitus depravatus ; sine pyrexia primaria vel neurosi.

Cachexiae, Sauv. cl. x. Vog. cl. viii. Sag. cl. iii.
Deformes, Lin. cl. x.

ORDO I. MARCORES.

Corporis totius macies.

Macies, Sauv. cl. x. ord. i. Sag. cl. iii. ord. i.
Emaciantes, Lin. cl. x. ord. i.

TABES. (68)

Marcor ; asthenia ; pyrexia hectica.

Tabes, S. gen. 275. Lin. 209. Vog. 309. Sag. 100.

1. Tabes (*purulenta*) ex ulcere externo vel interno, vel ex vomica.

Tabes a vomica, S. sp. 15. ulcerosa, sp. 12. apostematodes, sp. 3.

Variat fede ; hinc

Tabes renalis, S. sp. 2. hepatica, sp. 8. a stomacho, sp. 14. a pericardio, sp. 7. catarrhalis,* sp. 13.

2. Tabes (*scrophulosa*) in corporibus scrophulosis.

Tabes glandularis, S. sp. 10. mesenterica, sp. 9. Scrophula mesenterica, sp. 4. Atrophia infantilis, sp. 13. rachitica, sp. 8. Tabes rachialgica, sp. 16.

3. Tabes (*venenata*) a veneno ingesto.

Tabes a veneno, S. sp. 17.

Atrophia *febrisequa*, S. sp. 16. ad tabem purulentam, vel ad genus atrophiae pertinet.

ATROPHIA. (69)

Marcor et asthenia, sine pyrexia† hectica.

Qq

Atrophia

* Si cum catarrho diuturno adfuerit tabes, cum Pyrexia hectica, nihil dubitarem ejusmodi tabem catarrhalem ad purulentam referre.

† Atrophia fortassis nunquam sine Pyrexia, saltem sine pulsu solito frequentiori

ATROPHIA. (69)

Atrophia, S. gen. 277. Lin. 210. Vog. 308. Sag.
102. Junck. 41.

Marasmus, Lin. 211.

1. Atrophia (*inanitorum*) ex evacuatione nimia.

Atrophia a ptyalismo, S. sp. 7. a vomitu sp. 9. ab
alvi fluxu, sp. 6. Tabes nutricum, sp. 4. A-
trophia nutricum, sp. 5. a leucorrhoea, sp. 4.
Tabes dorsalis,* sp. 1. fudatoria, sp. 6. a sangui-
fluxu, sp. 2. Sanguinis inopia, Ill. Lieutaud.
synops. univ. med. vol. i. p. 52.

2. Atrophia (*famelicorum*) a nutrimento deficiente.

Atrophia lactentium, S. sp. 3.

3. Atrophia (*cacochymica*) a nutrimento corrupto.

Atrophia scorbutica, S. sp. 12. Tabes syphilitica,
sp. 11. a hydrope, sp. 5.

4. Atrophia (*debilium*) a nutritionis functione depravata, praegressa nulla vel evacuatione nimia, vel cacochymia.

Atrophia nervea, S. sp. 1. lateralis, sp. 15. senilis, sp. 11.

ORDO II. INTUMESCENTIÆ.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

Intumescenciae, S. cl. x. ord. ii. Sag. cl. iii. ord. ii.

Tumidosi, Lin. cl. x. ord. ii.

§ I. *Adiposae.*

POLYSCARCIA. (70)

Corporis pinguedinosa intumescencia molesta.

Polyfarcia, S. gen. 279. Lin. 213. Vog. 540. Sag.
106.

Steatites, Vog. 390.

Species unica,

Polyfarcia adiposa, Sauv. sp. 1. Lond. Med. obs. iii.
9. Vog. 21. 22. Med. Transf. ii. 18.

§ II.

priori, adest; sed absentia Pyrexiae hecticæ, (pag. 235) fere semper atrophiam a tabe distinguit

* An ad atrophiam inanitorum, an ad atrophiam debiliū, pertinet tabes dorsalis, dubium mihi videtur, et ad posteriorem referre mallet.

§ II. *Flatuosae.*

PNEUMATOSIS. (71)

Corporis intumescencia tenfa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. gen. 280. Vog. 391. Sag. 107.

Emphysema, S. gen. 13. Lin. 228. Vog. 392.

Leucophlegmatia, Lin. 214.

Combustus, de flatulentis corporis humani affectibus.

1. Pneumatosis (*spontanea*) sine causa manifesta.
Emphysema spontaneum S. sp. 1.
Pneumatosis febrilis, S. species aliquot. Lond. Med. obs. vi. 19.
2. Pneumatosis (*traumatica*) a vulnere thoracis.
Pneumatosis a vulnere, S. sp. 2. Lond. Med. obs. ii. 2. iii. 4. 35. 36. Cheston, chap. 1.
Pneumatosis febrilis, S. species aliquot.
3. Pneumatosis (*venenata*) a veneno injecto vel applicato.
Pneumatosis a veneno, S. sp. 1.
4. Pneumatosis (*hysterica*) cum hysteria.
Pneumatosis hysterica, S. sp. 3.

TYMPANITES. (72)

Abdominis intumescencia tenfa, elastica, sonora; alvus adstricta; cæterarum partium macies.

Tympanites, S. gen. 291. Lin. 219. Vog. 316. Sag.

118. Boerh. 226. Junck. 87.

Affectio tympanitica, Hoffm. iii. 339.

Meteorismus S. gen. 292.

1. Tympanites (*intestinalis*) cum tumore abdominis saepe inaequali, et cum rejectione aëris frequenti, tensionem et dolorem levante.
Tympanites intestinalis, S. sp. 1. Edinb. Med. Ess. i. 31. enterophysodes, sp. 3. verminosus, sp. 7. spasmodicus, sp. 5. Meteorismus ventriculi, sp. 1. abdominis, sp. 2. hystericus, sp. 3. a manzilla, sp. 4.
2. Tympanites (*abdominalis*) cum resonitu evidentiore, tumore magis aequabili, et emissione flatuum rariori et minus levante.

Tympanites

Tympanites abdominalis, S. sp. 2. asciticus, sp. 4.
 Ascites flatulento-peritoneus, sp. 28. Tympanites Stewartii, sp. 6.

PHYSOMETRA. (73)

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. gen. 290. Sag. 117.

Hysterophyse, Vog. 317.

Species sunt,

Physometra ficca, S. sp. 1.

Tympanites uteri ficca, Astruc, sur les malad. des femmes, l. ii. cap. 9.

Physometra humida, sp. 2.

Tympanites uteri humida, Astruc, loc. cit.

§ III. *Aquosa, sive Hydropes.*

ANASARCA. (74)

Corporis totius vel partis ejus intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. gen. 281. Lin. 215. Vog. 313. Sag. 108. Boerh. 1225. Hoffm. iii. 322. Junck. 87. Monro on the dropsy, 1765. Milman, Animadversiones de hydropse, 1779.

Phlegmasia, S. gen. 282.

Angina aquosa, Boerh. 791.

1. Anasarca (*serosa*) a retento sero ob evacuationes solitas suppressas, vel ab aucto sero ob ingestam aquam nimiam.

Anasarca metastatica, S. sp. 1. *a.* Anasarca periodica. *b.* Anasarca ab adiapneustia. Phlegmatia lactea, S. sp. 3. a menostasia, sp. 5. Anasarca urinosa, sp. 11. hydropotarium, sp. 10.

2. Anasarca (*oppilata*) a compressione venarum.

Anasarca gravidarum, S. sp. 5. Phlegmatia gravidarum, sp. 4. cruralis, sp. 9. Angina Loweriana, sp. 2. Angina oedematosa, Boerh. 791.

3. Anasarca (*exanthematicum*) post exanthemata, et praecipue post erysipelas, suborta.

Anasarca exanthematica, S. sp. 3. Phlegmatia exanthematica, sp. 10. ulcerosa, sp. 6. Malabarica, sp. 7. elephantina, sp. 8. Anasarca Americana, sp. 7.

4. Anasarca

ANASARCA. (74)

4 Anasarca (*anæmia*) a tenuitate sanguinis per hæmorrhagiam producta.

Anasarca a fluxu, S. sp. 2.

5. Anasarca (*debilium*) in debilibus a morbis longis, vel ab aliis causis.

Phlegmatia vulgaris, S. sp. 1. Anasarca a febris, sp. 4. hysterica sp. 2. Phlegmatia hysterica, sp. 2. Anasarca rachialgica, sp. 8. Phlegmatia Deliensis, sp. 11.

Anasarca purulenta, S. sp. 9. vix ad anasarcam referri potest.

HYDROCEPHALUS. (75)

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. gen. 285. Lin. 216. Boerh. 1217.

Hydrocephalum, Vog. 384.

Species unica,

Hydrocephalus exterior, S. sp. 2.* Lond. Med. obs. v. 13. Med. Trans. ii, 18. Edinb. Med. Ess. iii. 22.

HYDRORACHITIS. (76)

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis, exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. gen. 287. Morgagn. de sed. xii. 9. et seq.

Spinola, Lin. 289.

Spina bifida, Vog. 386.

HYDROTHORAX. (77)

Dyspnœa; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et spontanea ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, Sauv. 150. Vog. 311. Boerh. 1219. Species sunt,

Hydrothorax vulgaris, S. sp. 3. febrifequens, sp. 4. a scabie, sp. 9.

Sequentes minus recte recensentur, cum liquidi intus contenti neque natura, neque fons, neque sedes, per signa externa dignosci queat:

Hydrothorax chylosus, S. sp. 1. Willis, Pharm. rat. P. i. sect. i. cap. 13.

Hydrothorax

* Hydrocephalum internum, antea hic recensitum, ad Apoplexiam, sub nomine Apoplexiæ Hydrocephalicae, jam supra retuli.

HYDROTHORAX. (77)

Hydrothorax hydatidosus, S. sp. 5. Morg. de fed. xiv. 33.

————— mediastini, S. sp. 6.

————— pleurae, S. sp. 7. Hoffm. iii, p. 337.

Bergeron, diss. de hydrope pectoris.

————— pericardii, S. sp. 8 Morgagn. de fed.

xvi. 34, 36 Senac de coeur, tom. ii. p. 349.

Edinb. Med. Eff. v. 56. 58, 59.

Minus recte a Sauvagesio hic recensetur

Hydrothorax ab omento, S. sp. 2.

ASCITES. (78)

Abdominis intumescencia tenfa, vix elastica, fed fluctuosa.

Ascites, S. gen. 288. Lin. 217. Vog. 314. Sag.

115. Boerh. 1226. Hoffm. iii. p. 322. Junck. 87.

D. Monro on dropsy, 1765. Med. Transf. ii. 17.

Milman, Animadversiones de hydrope, 1779.

1. Ascites (*abdominalis*) cum tumore totius abdominis aequali, et cum fluctuatione satis evidente.

Ascites vulgatio, S. sp. 1.

Variat,

1. Ratione causae.

- a. Ab oppilatione viscerum.

Ascites ab oppilatione, S. sp. 2. ab hepate, sp. 3.

a liene, sp. 4. scrophulosus, sp. 5. artificialis, sp. 10.

- b. A debilitate.

Ascites ab exanthematis, S. sp. 8. arthriticus, sp.

9. febrilis, sp. 12. ex quartana, Werlhof. scorbuticus, sp. 11.

- c. A tenuitate sanguinis.

Ascites a sanguifluxibus, S. sp. 7.

2. Ratione liquidi effusi.

Ascites purulentus, S. sp. 21.* urinosus, sp. 22.

chylosus, sp. 23. oleosus, sp. 24.

2. Ascites (*saccatus*) cum tumore abdominis, saltem initio, partiali et cum fluctuatione minus evidente.

Ascites ab ovariis S. sp. 6. ovarii sp. 19. a. Ascites

saccatus. Hydrometra ovarii, sp. 6. Ascites

cruentus, sp. 20. Edinb. Med. Eff. v. 63.

stomachi, sp. 16. omentalis, sp. 18. intercus,

sp. 14. sanguineo-intercus, sp. 26. sanguineo-

peritonæus, sp. 27. purulento-peritonæus, sp. 29.

HYDRO-

* De hisce et pluribus aliis Ascitis speciebus recensitis, idem notandum est, ac in pag. 309.

HYDROMETRA. (79)

Hypogastrii in mulieribus paulatim crescens tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansve; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. gen. 289. Sag. 116. Boerh. 1224.

Species per externa signa distinguendae vix dari possunt; sed sequeutes ex Sauvagesio recensentur.

Hydrometra ascitica, S. sp. 1. gravidarum, sp. 2. hydatica sp. 4. Ascites uterinus. sp. 15. Hydrometra sanguinea, sp. 3. Ascites sanguineo-uterinus, sp. 25. Hydrometra puriformis, sp. 5.

HYDROCELE. (80)

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. gen. 41. Vog. 388. Oscheophyma, Sag. gen. 44. Hydrops scroti, Vog. 389. testium, Boerh. 1227.

Species sunt,

Oscheocele aquosa, S. sp. 2. Monro in Edinb. Med. Ess. vol. v. art. 21. Sharp's operations and critical inquiry. Douglas on the hydrocele. Pott's remarks on the hydrocele. Le Dran, Operations de Chirurgie. Bertrandi in Mem. de l'acad. de chirurgie, vol. iii.

————— hydatidosa, S. sp. 3.

————— Malabarica, S. sp. 4. Kempfer, Amoen. exot. fasc. iii. ob. 7.

§ IV. *Solidæ.*

PHYSCONIA. (81)

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. gen. 283. Vog. 325. Sag. 110.

Hypofarca, Lin. 218.

Species sunt,*

1. *Physonia hepatica,*

Cl. Cusson. Bonet. Sepulchr. de graviditate falsa, obs. 3. n. 8. 9. 10. Verduc, Patholog. du rachitis.

a. Schirrho-

* Species sequeutes nequaquam ad normam Nosologiae methodicae recensentur, sed accuratius physconiae species indicare difficile foret. saltem plus exegisset, quam quo nunc fruor otii. Interim Cussoni doctissimi opus summae ad pathologiam utilitatis repetere hic placuit.

PHYSCONIA. (81)

- a. Schirrhodea, G. Segeri M. Nat. Cur. D. i. Ann. iv. obs. 142.
- b. Calculosa Bonet. Sepulchr. de hypochondrii tumore, obs. 5.
- c. Hydatidosa Winckerii Disp. de hydatibus apud Bonet. Med. Septent. T. ii. p. 313.
2. Physconia splenica.
 - a. Emphractica Haller. Disp. pathol. T. iv. Disp. 109. Tulp. obs. med. lib. ii. cap. 30.
 - b. Scirrhodea Bonet. Sepulchr. de ventris tumore, obs. 34. n. 3.
3. Physconia renalis.

Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. n. 7.

 - a. Calculosa Plater. Obs. l. ii. p. 449. River. cent. iv. obs. 34.
 - b. Sarcomatio cystica Haller. Disp. pathol. Disp. 114.
4. Physconia uterina,

Bonet. sepulchret. de gravid. falsa, obs. 2. n. 5. 6. 7.
5. Physconia ab ovario,

Monro, Edinb. Med. Ess. tom. vi. art. 74. obs. 1.
6. Physconia mésentérica,
 - a. Hydatidosa Greg. Horstii, lib. v. obs. 33. Tulp. obs. lib. ii. c. 34.
 - b. Strumosa Bonet. ex Rudnicio de ventr. tumore, obs. x. n. 15. Ambr. Pare, lib. vii. c. 21. Scultet, Animam. chirurg. obs. 38.
 - c. Schirrhodea Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. vii. c. 15. Claudin. consult. sect. ii. consult. 134. Trincavelt, lib. iii. conf. 22. Riolan. Anthropogr. lib. ii. c. 26. Morgagni de sedib. ep. 39. n. 2.
 - d. Sarcomatica Bonet. Sepulchr. de falsa gravid. obs. 3. n. 1.
 - e. Steatomatosa, Barth. Cabrol. Obs. 33. et 35. Tulp. obs. lib. ii. c. 32. et 33. J. Lechellii apud Bonet. Med. sept. T. ii. p. 486. Idem Collect. acad. tom. iii. p. 585. Hierne Collect. acad. tom. iii. p. 226. obs. 166.
 - f. Fungosa, Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3.
7. Physconia

PHYSCONIA. (81)

7. *Physconia intesttinalis.*

a. *Concreto-glomerata*, Morgagn. de fedib. epist. 39. n. 21. 25.

b. *Sarcomatica*, Fontan. Obs. med. selectiores, obs. 11.

8. *Physconia omentalis.*

Frid. Rechman Diff. de omento.

9. *Physconia polysplachna.*

a. *Schirrhodea*, Fabr. Hildani cent. ii. obs. 45.

b. *Schirrhodea et sarcomatica*, Huldreich, Misc. Nat. C. D. I. ann. vi. et vii. p. 321.

c. *Schirrhodea et adiposa*, T. Bartholin. cent. iii. obs. 6.

d. *Hydatidosa*, Volch. Coiter. obs. anat. p. 117. Maur. Cordaei comm. 5. ad lib. priorem, Hippocr. de muliebr.

e. *Hydatidosa et schirrhodea*, Halleri Disp. pathol. tom. v. p. 256.

10. *Physconia visceralis.*

Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. Megalosplachnos Hippocrat. Marc. Donat. Hist. med. mir. lib. vi. c. 2. Schenck. ex Garnerio de liene. lib. iii. obs. 9. Salmuth. cent. i. obs. 21. Bonet, Med. sept. lib. vii. p. 487. Bianchi Hist. hepat. T. i. p. 130.

11. *Physconia externa lupialis.*

Graham Transf. philos. compend. v. ix. cap. 4. p. 187.

12. *Physconia externa scirrhodea.*

Ger. Blas. obs. med. vi.

13. *Physconia externa hydatidosa.*

Bonet. Sepulchr. de gravid. falsa, obs. 3. § 2. 3. 4. 11. &c. Achotzii apud Schenckium, lib. iii. de hydropse, obs. 4. et apud Scholtzium conf. 339. Solenandri conf. 15. sect. v. Riverii obs. communicat. ultim.

14. *Physconia ab adipe subcutaneo.*

a. *Simplex*, Cl. Lieutaud Comp. med. J. Mich. Febr. apud Bonet. Med. sept. T. i. p. 636.

b. *Syphilitica*, observante celeb. Fizes.

15. *Physconia ab excrescentia.*

RACHITIS. (82)

Caput magnum anteriùs maxime tumens; genicula tumida; costae depressae; abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Rachitis, S. gen. 294. Lin. 212. Vog. 312. Sag. 120. Boerh. 1480. Hoffm. iii. 487. Zeviani della rachitide.

Variat,

a. Simplex, sine alio morbo.

Rachitis nodosa, S. sp. 1.

Rachitis Britannica,* sp. 2. Glisson de rachitide.

b. Aliis morbis conjuncta.

Rachitis strumosa, S. sp. 3. Polonica, sp. 5. elephantiaica, sp. 6.

Neque rachitis cal mucana, S. sp. 4. neque rachitis a castratione, sp. 7. pro morbo haberi potest.

ORDO III. IMPETIGINES.

Cachexiae, cutem et externum corpus praeipue deformantes.

Impetigines, S. cl. x. ord. v. Sag. cl. iii. ord. v.

SCROPHULA. (83)

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula S. gen. 285. Vog. 367. Sag 121.

Struma, Lin. 284.

1. Scrophula (*vulgaris*) simplex, externa, permanens.
Scrophula vulgaris, S. sp. 1.

2. Scrophula (*mesenterica*) simplex interna, cum pallore faciei, inappetentia, tumore abdominis, et foetore foecum insolito.

Scrophula mesenterica, S. sp. 4.

3. Scrophula (*fugax*) simplicissima, et tantum circa collum,

* Minus recte pro diversis speciebus ponuntur rachitis nodosa et Britannica, cum non differant aliter quam morbus incipiens et confirmatus.

collum, plerumque a resorptione ex ulceribus capitis proveniens.

Scrophula fugax, S. sp. 2.

4. *Scrophula (Americana)* cum framboesia conjuncta.

Scrophula Americana, S. sp. 5.

Neque *scrophula periodica*, S. sp. 6. neque *scrophula Moluccana*, sp. 8. ad genus *Scrophulae* pertinere mihi videtur.

SYPHILIS. (84)

Morbus contagiosus, post concubitum impurum, et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostocopi; exostoses.

Syphilis, S. gen. 3086. Lin. 6. Vog. 319. Sag. 126.

Lues Venerea, Boerh. 1440. Hoffm. iii. 413. Junck.

96. Astruc de lue venerea.

Species unica,

Syphilis venerea, S. sp. 6.

Syphilis Polonica, S. sp. 2. nequaquam ad hoc genus pertinet, et de *Syphilide Indica*, sp. 3. nobis non satis constat, ut pro diversa specie ponatur.

SCORBUTUS. (85)

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; athenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescentes, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. gen. 391. Lin. 223. Vog. 318. Sag.

127. Boerh. 1148. Hoffm. iii. 369. Junck. 91.

Lind, on the scurvy. Hulme, de scorbuto. Rouppe de morbis navigantium. Med. Transf. ii. 18.

21. Milman on the scurvy. Ferris de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine, Ed. 1784.

Variat gradu,

a. *Scorbutus incipiens*. b. *crefcens*. c. *inveteratus*.

Variat etiam symptomatibus,

d. *Scorbutus lividus*, Nitzsch, Theoret. pract. ab

Handl. des Scharbockes, &c. e. *petechialis*,

Nitzsch. ibid. h. *pallidus*, Nitzsch, ibid. g. *ru-*

ber, Nitzsch, ibid. h. *calidus*, Nitzsch, ibid.

ELEPHANTI-

ELEPHANTIASIS. (86)

Morbus contagiosus ; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosâ, pilis destituta ; in extremis artubus anæsthesia ; facies tuberibus deformis ; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. gen. 302. Vog. 321. Sag. 128.

Elephantia Arabum, Vog. 322.

Varietates sunt,

Elephantiasis Orientalis, S. sp. 1. legitima, sp. 2.

Lond. Med. Obs. vol. i. art. 19. Soc. Royale, i. mem. p. 161. leonina, sp. 3. Tyria, sp. 4. Alopecia, sp. 5. syphilitica, sp. 6. Javanensis, sp. 7.

Elephantiasis Indica, sp. 9.*

LEPRA. (87)

Cutis escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepa, S. gen. 303. Lin. 262. Sag. 129.

Lepa Græcorum, Vog. 320.

Varietates sunt,

Lepa Græcorum, S. sp. 1. ichthyosis, sp. 2. Indica, sp. 3. Asturienfis, sp. 4. herpetica, sp. 5.

malum mortuum, sp. 6.

FRAMBOESIA. (88)

Fungi, mori, vel rubi idæi fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Framboesia, S. gen. 229. Sag. 125.

Varietates sunt,

Framboesia Guineensis, S. sp. 1. Edinb. Essays, vol. vi. art. 71.

Framboesia Americana, sp. 2.

TRICHOMA. (89)

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. gen. 311. Sag. 137.

Plica, Lin. 313.

Plica five Rhopalosis, Vog. 323.

Species sunt,

Trichoma cirrosum, S. sp. 1. villosum, sp. 2.

ICTERUS. (90)

Flavedo cutis et oculorum ; faeces albidæ ; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.

Icterus.

* De Elephantiasi, Lepa, Framboesia, et Trichomate, utpote morbis a meipso nunquam visis, amplius statuere non ausus sum.

ICTERUS. (90)

Icterus, Lin. 224. Vog. 306. Boerh. 918. Junck. 90.

Aurigo, S. 306. Sag. 132.

Cachexia ictérica, Hoffm. iii. 301.

* *Idiopathicae.*

1. Icterus (*calculatus*) cum dolore in regione epigastrica acuto, post paſtum acuto, et cum dejectione concretionum bilioſarum,

Aurigo calculoſa, S. ſp. 9. Edinb. Med. Eff. i. 33.

ii. 28. Med. Tranſ. ii. 10.

2. Icterus (*ſpaſmodicus*) ſine dolore, poſt morbos ſpaſmodicos et pathemata mentis.

Aurigo hyſterica, S. ſp. 13.

Species quædam, quæ a Sauvageſio ſub titulo Auriginis a venenis, recensentur.

3. Icterus (*hepaticus*) ſine dolore, poſt morbos hepatis.

Aurigo hepatica, S. ſp. 11. ab obſtructione, ſp. 6. purulenta, ſp. 7.

4. Icterus (*gravidarum*) ſub graviditate oriens, et poſt partum abiens. Van Swiet. ad Boerh. Aph. 950.

Aurigo plethorica, S. ſp. 5.

5. Icterus (*infantum*) in infantibus haud diu poſt natales oriens.

Aurigo neophytorum, S. ſp. 12.

** *Symptomaticae*

ſiquidem recte icteri dicantur.*

Aurigo febrilis, S. ſp. 1. febricoſa, ſp. 8. acci-

dentalis. ſp. 2. typhodes, ſp. 10. rachialgica,

ſp. 14. a venenis, ſp. 4.

Aurigo Indica, S. ſp. 3. ſive quarundam gentium color naturalis; nequaquam pro morbo haberi poteſt.

CLAS-

* Flavedo cutis oriri poteſt, vel a bile non, ut ſolet, excreta, ſed in vaſa ſanguifera excepta, et inde ſubter cuticulam effuſa; vel a ſero ſanguinis ſaepe flaveſcente, ſubter cuticulam. ut in ecchymoli, effuſo. In quibuſdam caſibus, an flavedo cutis ab una vel altera illarum cauſarum oriatur, apud medicos non ſemper conſtat; ſed tantum ex prima ictærum genuinum, et ab altera morbum diverſum, quique, quantum fieri poſſit, diſtingui debet, oriri cenſemus.

CLASSIS IV. LOCALES.*

Partiſ, non totius corporis, affectio.

Vitia,† S. cl. i. Lin. cl. xi. Vog. cl. x, Sag. cl. i.

Plagae, S. cl. i. ord. vii. Sag. cl. ii.

Morbi organici Auctorum.

ORDO I. DYSÆSTHESIÆ.

Sensus depravati aut deleti, ex organorum externorum vitio.‡

Dysæsthesiæ, S. cl. vi. ord. i. Sag. cl. ix. ord. i.

Hallucinationes, S. cl. viii. ord. i. Sag. cl. xiii. ord. i.

Privativi, Lin. cl. vi. ord. iii.

CALIGO: (91)

Vifus imminutus, vel prorfus abolitus, ob repagulum opacum, inter objecta et retinam, oculo ipfo vel palpebris inhærens.

Caligo, S. gen. 153. Vog. 288. Sag. 259.

Cataracta, Lin. 109.

1. Caligo (*lentis*) ob maculam opacam pone pupillam.

Cataracta,|| S. gen. 152. Lin. 109. Vog. 239. Sag. 26.

Apud

* Fortaffis aliquando ambiguum effe poteft, utrum ad univerfales, vel ad locales, morbi quidam referri debent; de plerifque vero, utri claffi referendi fint, fatiſ obvium erit; et ex institutione hujus Localium claffis, quamplurimos morbos rectius et facilius, quam in aliorum noſologorum ſyſtematibus, diſponi poſſe contendimus.

† Vitia hic dixi, utpote ſub hac claſſe Localium comprehenſa; morbos vero multo plures comprehendit hic claffis, ita ut vox Vitia pro hujus ſynonymo nequaquam haberi poteſt, et idem de Plagis Sagari dictum velim.

‡ Vereor ne in ſequentibus aliquando ſpecies recenſuerim quæ characteri ordinis non prorfus reſpondent, quafdam, ſcilicet, dysæſtheſias quæ ex organorum externorum vitio non pendeant. Hujusmodi ſpecies quidem aliquando recenſui; ſed paucae omnino ſunt, et feci, quia ſpecies affines, et hic loci expectandas, ſeparare nolui.

|| Non video quod, cum Sauvageſio, Cataracta pro diverſo a Caligine genere haberi poſſit; et judicent periti, annon ideo recte Caliginis characterem mutaverim, et cataractam pro ejus ſpecie poſuerim.

CALIGO. (91)

Apud Sauvagesium species sunt, veræ vel spuria:

Verae varietates sunt, Cataracta vera, S. sp. 1.
 Glaucoma Woolhouffii. C. antiglaucoma, sp. 2.
 glaucoma, sp. 3. Glaucoma Maitre Jan et St.
 Ives.

Spuriae varietates sunt, Cataracta membranacea, S.
 sp. 4. secundaria, sp. 5.

2. Caligo (*corneae*) ob corneam opacam.

Achlys, Vog. 242.

Variat pro varietate morbi opacitatem facientis.

Caligo a nephelio, S. sp. 5. a leucomate, sp. 6.
 ceratocele, sp. 10. a staphylomate, sp. 11. a
 pterygio, sp. 12. hyposphagma, sp. 13.

3. Caligo (*pupillae*) ob obstructam pupillam.

Variat pro varietate causae.

Caligo ab ectasi, S. sp. 18. Amaurosis a lynchysi,
 sp. 6. a myosi, sp. 7. Caligo a synizefi, sp. 19.
 Synizefis, Vog. 240.

4. Caligo (*humorum*) ob vitium vel defectum humo-
 ris aquei.

Glaucoma, Vog. 241.

Variat pro diverso humoris statu.

Caligo hypoaemia, S. sp. 15. lactea, sp. 16. a
 rhytidosi, sp. 17. Amblyopia hydrophthalmica,
 sp. 7.

5. Caligo (*palpebrarum*) ob vitium palpebris inhae-
 rens.

Variat pro varietate vitii palpebrarum.

Caligo a symblepharosi, S. sp. 1. ancyloblepharo,
 sp. 2. a blepharoptosi, sp. 3. a pacheablepha-
 rosi, sp. 4. a lupia, sp. sp. 7. a sarcomate, sp. 8.
 a cancro, sp. 9.

AMAUROSIS. (92)

Visus imminutus vel prorsus abolitus, sine vitio oculi evi-
 dente; plerumque cum pupilla dilatata et immobili.

Amaurosis, S. gen. 155. Lin. 110. Vog. 238. Sag.
 261.

Mydriasis, Vog. 237.

Amblyopia, Lin. 108. Vog. 236.

1. Amaurosis (*compressionis*) post causas et cum signis
 congestionis in cerebro.

Variat

AMAUROSIS. (92)

Variat pro varietate causae remotae.

Amaurosis pituitosa, S. sp. 2. scrophulosa, sp. 3.
plethorica sp. 4. intermittens, sp. 13. exanthem-
atica, sp. 11. venerea, sp. 10. traumatica, sp. 1.

2. Amaurosis (*atonica*) post causas et cum signis debilitatis.

Amaurosis congenita, S. sp. 5. exhaustorum, sp. 16.
rachialgica, sp. 14. arthritica, sp. 17. Ambly-
opia absoluta, sp. 6.

3. Amaurosis (*venenata*) a veneno ingesto vel applicato.

Amaurosis a narcoticis, S. sp. 12. foriciorum, sp. 9.

DYSOPIA.* (93)

Visus depravatus, ita ut non nisi certa luce, vel ad certam distantiam, vel in certa positura, objecta clare videantur.

Amblyopia, S. gen. 154. Sag. 258.

1. Dysopia (*tenebrarum*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia crepuscularis, S. sp. 1.

2. Dysopia (*luminis*) in qua non nisi in obscura luce objecta videntur.

Amblyopia meridiana, S. sp. 2.

3. Dysopia (*diffitorum*) in qua longe distantia non videntur.

Amblyopia diffitorum, S. sp. 3. Myopia, Lin. 309.

Myopiasis, Vog. 515.

4. Dysopia (*proximorum*) in qua proxima non videntur.

Amblyopia proximorum, S. sp. 4.

Presbytia, Lin. 308.

5. Dysopia (*lateralis*) in qua non nisi oblique posita videntur.

Amblyopia lufcorum, S. sp. 5.

PSEUDOBLEPSIS. (94)

Visus depravatus, ita ut quæ non existant homo se videre imaginatur, vel quæ existunt aliter videt ac revera se habeant.

Suffusio, S. gen. 217. Sag. 329.

Phantasma, Lin. 73. Vog. 289.

1. Pseudo-

* Verbum Amblyopia. quo pro hujus generis nomine utitur Sauvagesius, alio sensu intelligunt tum veteres, tum Linnæus et Vogelius; ideoque hujus generis nomen mutare necessarium duxi.

PSEUDOBLEPSIS. (94)

1. Pseudoblepsis (*imaginaria*) in qua quæ non existunt conspici videntur.

Variat pro varietate phantasmatis.

- a. Suffusio myodes, S. sp. 1. b. reticularis, sp. 2.
c. scintillans, sp. 3. Marmaryge, Vog. 290. d.
Suffusio coloris, sp. 4. Hæmalopia, Vog. 239.

2. Pseudoblepsis (*mutans*) in qua objecta revera existentia aliquomodo mutata apparent.

Variat pro varia objectorum mutatione.

- a. Suffusio metamorphosis, S. sp. 5. b. nutans, sp. 7.
c. dimidians objecta, sp. 6. d. multiplicans. Diplopia, S. gen. 218. Sag. 330. Dyfopia Vog. 291.

Diplopia iterum variat pro varietate causæ remotæ.

- a. Diplopia pyretica, S. varietas 1. β. a spasmo, var. 2. γ. a paralyfi, var. 3. δ. ab ancyloblepharo, var. 4. ε. a catarrho, var. 5. ζ. a debilitate, var. 6. η. a contusione, var. 8. θ. a terrore, var. 9. ι. a temulentia, var. 10. κ. remotorum, var. 7.

DYSECOEA. (95)

Auditus imminutus vel abolitus.

Dysecoea, S. gen. 158. Vog. 246. Sag. 264.

Cophosis, S. gen. 160. Lin. 112. Sag. 266.

Surditas, Vog. 247.

1. Dysecoea (*organica*) ob vitium in organis sonos ad internam aurem transmittentibus.

Variat pro varietate vitii et partis affectæ.

- a. Dysecoea monotonon seu malcorum, S. sp. 1. b. a meatu obstructo, sp. 2. Cophosis a meatu, sp. 1.
c. Dysecoea a myringæ atonia, sp. 3. Cophosis a tympano, sp. 4. d. Dysecoea a myringæ duritie, sp. 4. e. a myringa perforata, sp. 5. f. a tympani fistula, sp. 6. g. a hydrotympano, sp. 7. h. a tuba obstructa, sp. 8. Cophosis a tuba, sp. 3. i. Dysecoea syphilitica. Cophosis syphilitica. Cophosis congenita, sp. 8.

2. Dysecoea (*atonica*) sine organorum sonos transmittentium vitio evidente.

Variat pro varietate causæ.

- a. Cophosis critica, sp. 2. Dysecoea febrilis. b. Cophosis a comate, sp. 7. c. serosa, sp. 6. d. a steatomate, sp. 9.

PARACUSIS. (96)

Auditus depravatus.

Paracusis, S. gen. 159. Sag. 265.

Syrigmus, S. gen. 219. Sag. 231.

1. Paracusis (*imperfecta*) in qua soni ab externis venientes percipiuntur, non autem accurate vel cum solitis conditionibus.

Variat,

- a. Cum auditu gravi.

Paracusis barycoea, S. sp. 1.

- b. Cum auditu nimis sensibili.

Paracusis oxycocæ, S. sp. 2.

- c. Cum sono unico externo a causis internis duplicato.

Paracusis duplicata, sp. 3.

- d. Soni quos homo audire velit, nisi sono alio vehementi simul excitato non audiuntur.

Paracusis Willifiana, S. sp. 4.

2. Paracusis (*imaginaria*) in qua soni extrinsecus non existentes ab internis causis excitantur.

Syrigmus, Sauv. gen. 219. Sag. 231. Syringmos, Lin. 72. Sufurrus, Vog. 292.

Variat,

- a. Pro varietate soni percepti.

a. Syrigmus fibilus, S. sp. 4. b. sufurrus, sp. 5. c. bombus, sp. 11.

- b. Pro varietate causæ remotæ.

d. Syrigmus a debilitate, S. sp. 1. e. criticus, sp. 2. f. plethoricus, sp. 3. g. vertiginosus, sp. 10. h. cephalalgicus, sp. 6. i. a ventriculo, sp. 7. k. catarrhalis, sp. 8. l. ab oxycocæ, sp. 9.

ANOSMIA. (97)

Olfactus imminutus vel abolitus.

Anosmia, S. gen. 156. Lin. 113. Vog. 248. Sag. 262.

1. Anosmia (*organica*) ob vitium in membrana nares internas investiente.

Variat pro varietate vitii.

Anosmia catarrhalis, sp. 1. a. siccitate, sp. 6. a. polypo, sp. 3. ab ozaena, sp. 2. syphilitica, sp. 4. verminosa, sp. 5.

2. Anosmia

ANOSMIA. (97)

2. Anosmia (*atonica*) sine vitio membranae narium evidente.

Anosmia paralytica, S. sp. 7.

AGHEUSTIA. (98)

Gustus imminutus vel abolitus.

Agheustia, S. gen. 157. Sag. 263.

Agheustia, Lin. 114.

Apogeusis, Vog. 449.

1. Agheustia (*organica*) ob vitium in membrana linguae, a nervis sapida arceus.

Agheustia febrilis, S. sp. 1.

2. Agheustia (*atonica*) sine vitio linguae evidente.

Agheustia paralytica, S. sp. 2.

ANAESTHESIA. (99)

Tactus imminutus vel abolitus.

Anaesthesia, S. gen. 161. Lin. 118. Sag. 267.

Anodynia, Vog. 274.

Sequentes species a Sauvagesio recensentur, et, cum de iis mihi non satis liqueat, nihil mutare volui.

Anaesthesia a spina bifida, S. sp. 1. plethorica, sp. 2. nascentium, sp. 3. melancholica, sp. 4.

ORDO II. DYSOREXIÆ.*

Appetitus erroneus vel deficiens.

§ I. *Appetitus Erronei.*

Morositates, S. cl. viii. ord. ii. Sag. cl. xiii. ord. ii.

Pathetici, Lin. cl. v. ord. 2.

Hyperæstheses, Vog. cl. vii.

BULIMIA. (100)

Appetitus esculentorum majori copia quam quæ digeri possit.

Bulimia, S. gen. 223. Lin. 79. Sag. 335.

Bulimus, Vog. 296.

Addephagia, Vog. 297.

Cynorexia, Vog. 298.

* *Idio-*

* Morositates Sauvagesii minus recte ad Vesaniarum classem referri, supra dixi, et nunc ad Locales detuli. Recte, ni fallor, cum dysorexiæ fere omnes manifesto partis singularis, potius quam totius corporis, affectiones sint. Nostalgia sola, si quidem revera morbus sit, minime, pro locali haberi potest; sed morbum incertum a cæteris dysorexiis separare non bene potui.

BULIMIA. (100)

* *Idiopathicae.*

1. Bulimia (*belluonum*), sine morbo ventriculi, cibi majorem solita copiam appetens.
Bulimia esurigio, S. sp. 4.
Addephagia, Vog. 297.
2. Bulimia (*syncopalis*) cibum frequenter appetens, ob sensum famis syncopen minitantis.
Bulimia cardialgica, S. sp. 2.
Bulimus, Vog. 296.
3. Bulimia (*emetica*) cibum magna copia appetens, et mox per vomitum rejiciens.
Bulimia canina, S. sp. 1.
Cynorexia, Vog. 298.

** *Symptomaticae.*

Bulimia verminosa, S. sp. 3. addephagia, sp. 5.
convulsorum, S. sp. 6. ab acidis, sp. 7.

POLYDIPSIA. (101)

Appetitus majoris solitae copiae potulentorum.

Polydipsia, S. gen. 224. Lin. 80. Vog. 275. Sag. 336.

Polydipsia fere semper symptomatica est, et variat tantum pro varietate morborum quos comitatur; hinc

Polydipsia febrilis, S. var. a. hydropica, var. b. fluxuum, var. c. a venenis, var. d.

PICA. (102)

Desiderium non esculenti ingerendi.

Pica, S. gen. 222. Sag. 334.

Citta, Lin. 78.

Allotriophagia, Vog. 299.

Malacia, Vog. 300.

Cum de speciebus Picae mihi non fatis liqueat, sequentes ex Sauvagesio recensco.

Pica infantilis, S. sp. 1. chlorosiantium, sp. 2. malacia, sp. 3. abscorbuticorum, sp. 4. voluntaria sp. 5.

SATYRIASIS. (103)

In maribus effraenis veneris cupiditas.

Satyriasis, S. gen. 228. Lin. 81. Sag. 340.

Satyriasm pro specie maniae habet Vogeliu.

1. Satyriasis

SATYRIASIS. (103)

1. Satyriasis (*juvenilis*) cum veneris cupiditate præter modum vehementi, corpore simul parum perturbato.

Satyriasis neogamorum, sp. 5.

2. Satyriasis (*furens*) cum veneris cupiditate effraeni, corpore simul multum perturbato.

Satyriasis acuta, S. sp. 1. Aretæi Cappad. Acut. lib. ii. cap. 12.

Satyriasis chronica, S. sp. 2. ad priapismum pertinet; et satyriasis venerea, sp. 3. necnon satyriasis hydrophobica, sp. 4. manifesto symptomatica est.

NYMPHOMANIA. (104)

In fœminis effraene veneris desiderium.

Nymphomania, S. gen. 229. Sag. 341.

Satyriasis, Lin 81.

Furorem uterinum pro specie maniae habet Vogelius.

Nymphomaniae species unica est, et gradu tantum varians, hinc

Nymphomania salacitas, S. sp. 1. furibunda, sp. 2. fervor uteri, sp. 3. pruriginosa, sp. 4.

NOSTALGIA. (105)

In absentibus a patria, vehemens eandem revivendi desiderium.

Nostalgia, S. gen. 226. Lin. 83. Sag. 338.

Nostalgiam pro specie melancholiæ habet Vogelius.

1. Nostalgia (*simplex*) sine alio morbo.

Nostalgia simplex S. sp. 1.

2. Nostalgia (*complicata*) aliis morbis comitata.

Nostalgia complicata, S. sp. 2.

§ II. *Appetitus deficientes.*

Anepithymiae, S. cl. vi. ord. ii. Sag. cl. ix. ord. ii.

Privativi, Lin. cl. vi. ord. iii.

Adynamiae, Vog. cl. vi.

ANOREXIA.* (106)

Appetitus esculentorum deficiens.

Anorexia, S. gen. 162. Lin. 116. Vog. 279. Sag. 268.

1. Anorexia

* Omnis Anorexia mihi symptomatica esse videtur, et variat tantum pro varietate morbi quem comitatur. Species quidem omnes, quotquot a Sauvagesio fuerant recensitae, ad genus dyspepticae supra retuli; sed fortassis utile hic erit easdem seorsum, et rectius ordinatas, iterum recensere.

ANOREXIA. (106)

1. Anorexia (*humoralis*) ab humore ventriculū gravante.

Anorexia pituitosa, S. sp. 2. biliosa, sp. 6. a saburra, sp. 9.

2. Anorexia (*atonica*) ob tonum fibrarum ventriculi amissum.

Anorexia paralytica, S. sp. 1. exhaustorum, sp. 8. melancholica, sp. 5. cachectarum, sp. 7. arthritica, sp. 12. febrilis, sp. 4.

Incertae naturae sunt, Anorexia plethorica, S. sp. 3. mirabilis, sp. 10. neophytorum sp. 11. Stewartiana, sp. 13.

ADIPSIA. (107)

Appetitus potulentorum suppressio, five fitis feriatio.

Adipsia, S. gen. 163. Lin. 117. Vog. 281. Sag. 269.

Adipsiam sine alio morbo, qualis est Adipsia primaria, S. sp. 1. pro morbo habere nollem; omnemque adipsiam pro sympathica, five symptomate morbi cujusdam, sensorium commune afficientis, habeo; ideoque non ad Locales referendi.

ANAPHRODISIA. (108)

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Anaphrodisia, S. gen. 164. Sag. 270.

Atechnia, Lin. 119.

Agnesia, Vog. 283.

Species verae sunt,

Anaphrodisia paralytica, S. sp. 1. gonorrhoeica, sp. 2.

Species spuriae, five veneris rite exercendae impedimenta, sunt,

Anaphrodisia a mariscis, S. sp. 4.

————— ab urethrae vitio, sp. 5.*

Pro ficta et fals. habenda est Anaphrodisia magica sp. 3.

ORDO III. DYSCINESIÆ.

Motus impediti vel depravati ex organorum vitio.

Dyscinetæ, S. cl. vi. ord. iii. Sag. cl. ix. ord. iii.

APHONIA. (109)

Vocis plena suppressio, citra comam aut syncopen.

Aphonia, S. gen. 166. Lin. 115. Vog. 253. Sag. 272.

1. Aphonia

* Ab Dyspermatismi genus pertinet.

APHONIA. (109)

1. Aponia (*gutturalis*) a tumefactis faucibus et glottide.

Aponia catarrhalis, S. sp. 4. Anginosa Morgagni.

2. Aponia (*trachealis*) a compressa trachea.

Aponia aneurismatica, S. sp. 5. pulmonica, sp. 9.

3. Aponia (*atonica*) a nervis laryngis resectis.

Aponia traumatica, S. sp. 6.

Sequentes symptomaticae esse videntur,

Aponia melancholica, S. sp. 1. paralytica, sp. 8.
temulentorum, sp. 3. hysterica, sp. 7. ab anti-
pathia, sp. 2.

MUTITAS. (110)

Verba articulandi impotentia.

Mutitas, S. gen. 165. Vog. 257. Sag. 271.

1. Mutitas (*organica*) ex lingua ablata vel vitiata.

Mutitas elinguium, S. sp. 4. a ficitate, sp. 5.

2. Mutitas (*atonica*) ex nervis linguae laesis.

Mutitas traumatica, S. sp. 2.

3. Mutitas (*furdorum*) ex furditate congenita, vel puerilibus annis aborta.

Mutitas furdorum, S. sp. 8.

Sequentes symptomaticae sunt,

Mutitas a glossocele, S. sp. 1. a narcoticis, sp. 3.
spasmodica, sp. 6. proaeretica, sp. 7.

PARAPHONIA. (111)

Vocis fonus depravatus.

Paraphonia, S. gen. 168. Cacaphonia, Sag. 274.

Raucedo, Lin. 146. Raucitas, Vog. 252. Afa-

phia, 250. Clangor, 251. Leptophonia, 254.

Oxyphonia, 255. Rhenophonia, 256.

1. Paraphonia (*puberum*) in qua, circa pubertatis tempus, vox ab acutiori et suavi in graviolem et ingratam mutatur.

Paraphonia puberum, S. sp. 1.

2. Paraphonia (*rauca*) in qua, ob ficitatem vel tumorem faucium flaccidum, vox fit rauca et scabra.

Paraphonia catarrhalis, S. sp. 3. Raucedo, Lin. 146.

Raucitas, Vog. 250.

3. Paraphonia (*resonans*) in qua, ob obstructas nares, vox fit rauca, cum fonitu per nares sibilante.

Paraphonia

PARAPHONIA. (III)

Paraphonia nasalis, S. sp. 2. a polypo, sp. 8. Rhenophonia, Vog. 256.

4. Paraphonia (*palatina*) in qua, ob deficientem vel divisam uvulam, plerumque cum labio leporino, vox fit rauca, obscura, et ingrata.

Paraphonia gutturalis, S. sp. 5.

Asaphia, Vog. 250.

5. Paraphonia (*clangens*) in qua vox in acutam, clangentem, et exilem mutatur.

Paraphonia ulcerosa, S. sp. 4. sibilans, sp. 7. Clangor, Vog. 251. Leptophonia, 254. Oxyphonia, 255.

6. Paraphonia (*comatosa*) in qua, ob laxatum velum palati et glottidem, sonus inter inspirandum editur.

Paraphonia stertens, S. sp. 6.

PSELLISMUS. (III)

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. gen. 167. Lin. 138. Sag. 273. Psellotis, Vog. 259. Traulotis, 258. Ischnophonia, 260. Battarismus, 261.

1. Psellismus (*haesitans*) in quo sermonis verba, praefertim prima, non facile proferuntur, et non nisi prima syllaba saepius repetita.

Psellismus ischnophonia, S. sp. 1. Ischnophonia, Vog. 261. Battarismus, 261.

2. Psellismus (*ringens*) in quo sonus literae R. semper aspiratur, et quasi geminatur.

Psellismus rottacismus, S. sp. 2.

Traulotis five blaefitas, Vog. 258.

3. Psellismus (*lallans*) in quo sonus literae L fit liquidior, vel loco literae R pronunciatur.

Psellismus lamdacismus, S. sp. 3.

4. Psellismus (*emolliens*) in quo literae durae in molliores mutantur, et litera S multum usurpatur.

Psellismus traulotes, S. sp. 4.

5. Psellismus (*balbutiens*) in quo, ob linguam magnam vel tumefactam, literae labiales magis audiuntur, et saepe loco aliarum proferuntur.

Psellismus balbuties, S. sp. 5. a ranula, sp. 11.

6. Psellismus (*acheilos*) in quo literae labiales vix vel non omnino pronunciari possunt.

Psellismus

PSELLISMUS. (112)

Psellismus mogilalia, S. sp. 6.

7. Psellismus (*lagostomatum*) in quo, ob divisum palatum, literæ gutturales minus recte pronunciantur.

Psellismus lagostomatum, S. sp. 10. cotacismus, sp. 8.

STRABISMUS. (113)

Oculorum axes optici non convergentes.

Strabismus, S. gen. 116. Lin. 304. Vog. 514. Sag. 222.

1. Strabismus (*habitualis*) a consuetudine prava oculo tantum uno utendi.

Strabismus vulgaris, S. sp. 2.

2. Strabismus (*commodus*) ab unius oculi, præ altero, debilitate vel mobilitate majori, adeo ut uterque oculus non commode adhibeatur.

Strabismus Buffonii, S. sp. 3. spasmodicus, sp. 4. paralyticus, sp. 5. catarrhalis, sp. 6.

3. Strabismus (*necessarius*) ob mutatum situm vel figuram partium oculi.

Strabismus a luscitate, S. sp. 1. caligantium, sp. 11. a crystallino, sp. 12. myopum, sp. 9.

De Strabismo aequinoctiali mihi non liquet.

Minus recte, ut mihi videtur, ad Strabismum referuntur sequentes; Strabismus symptomaticus, S. sp. 7. lagophthalmos, sp. 8.

DYSPHAGIA. (114)

Molestia deglutitionem impediens sine respirationis læsione vel phlegmasia.

Dysphagia, S. gen. 199. Sag. 216.

Acataposis, Vog. 149.

Species a Sauvagesio recensitæ sunt,

Dysphagia, S. sp. 1. hysterica sp. 2. paralytica, sp. 3. pharyngea, sp. 4. œsophagea, sp. 5. lætentium, sp. 6. tussiculosa, sp. 7. hydrophobica, sp. 8. nauseosa, sp. 9. a deglutitis, sp. 10. a datura, sp. 11. a sarcomate, 12. ab schirro, canina, sp. 14. valsalviana, sp. 15. aneurismatica, sp. 16. a labatio, sp. 17. a siccitate, sp. 18. ab hypostaphyle, sp. 19.

CONTRACTURA. (115)

Artus unius vel plurium contractio diuturna, rigida.

Contractura, S. gen. 119. Lin. 299. Sag. 225.

Obstipitas, S. gen. 11.

Caput obstipum, Vog. 513.

Digitum Vog. 221.

1. Contractura (*primaria*) a musculis contractis, rigidis.

a. A musculis ab inflammatione rigidis.

Contractura dolorifica, S. sp. 2. arthritica, sp. 7.

catarrhalis, sp. 8. Obstipitas catarrhalis, sp. 3.

b. A musculis a spasmō rigidis.

Contractura spasmodica, S. sp. 11. Obstipitas spaf-

modica, sp. 6. renuens, sp. 1. lateralis, sp. 5.

Contractura hypochondriaca, sp. 1.

c. A musculis, ob antagonistas paralyticos, contractis.

Contractura paralytica, S. sp. 4. rachialgica, sp. 5.

Bohemica, sp. 6. Obstipitas annuens, sp. 2.

d. A musculis ab acrimonia irritante contractis.

Contractura scorbutica, S. sp. 3.

2. Contractura (*articularis*) ob artus rigidos.

Contractura anchylosis, S. sp. 9. syphilitica, sp. 10.

Obstipitas gibbosa, sp. 4.

ORDO IV. APOCENOSES.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetive fluidorum aucto.

Apocenosēs, Vog. cl. ii. ord. ii.

Fluxus, S. cl. ix. Sag. cl. v.

Morbi evacuatorii, Lin. cl. ix.

PROFUSIO. (116)

Fluxus sanguinis.

Profusio, Lin. 239.

Hæmorrhagia, Vog. 81. Boerh. 218.

Ex sanguifluxibus, a Sauvagesio recensitis, sequentes, ad hunc locum pertinere videntur.

Hæmorrhagia passiva, S. sp. 1. ab hirudine, sp. 7.

Hæmoptysis traumatica, sp. 12. ab hirudine, sp. 13.

Hæma-

Hæmatemesis traumatica sp. 3. ab hirudine,
sp. 4. *Hæmaturia traumatica*, sp. 14. violenta,
sp. 2.

EPHIDROSIS.* (117)

Sudoris præter naturam évacuatio.

Ephidrosis, S. gen. 258. Sag. 194.

Sudor, Lin. 208.

Hydropedesis, Vog. 121.

Species idiopathica unica est,

Ephidrosis, spontanea, S. sp. 1.

Ephidroses symptomaticae variant, pro varietate morbi quem comitantur, et simul pro varietate fudoris eliciti, et quodammodo pro varietate partitis maxime fudantis. Hinc

Ephidrosis febrilis, S. sp. 3. febricosa, sp. 7. hæctica, sp. 5. exanthematum, sp. 6. syncoptica, sp. 4. scorbutica, sp. 2. a saburra, sp. 18. lactea, sp. 9. mellea, sp. 10. vinosa, sp. 11. viridis, sp. 12. nigra, sp. 13. lutea, sp. 14. urinosa, sp. 15. cruenta, sp. 16. cærulea, sp. 17. acida, sp. 19. arenosa, sp. 20. lateralis, sp. 8.

EPIPHORA. (118)

Fluxis humoris lachrymalis.

Epiphora, S. gen. 259. Lin. 172. Vog. 99. Sag. 195.

Ex speciebus a Sauvagesio recensitis, nulla pro idiopathica haberi potest, nisi Epiphora frigida, S. sp. 8.

Cæterae omnes symptomaticae sunt,

Epiphora a pathemate, S. sp. 1. ophthalmica, sp. 3. calida, sp. 9. ex variolis, sp. 4. arthritica, sp. 12. cruenta, sp. 10. ex rhyade, sp. 2. ex aegilope, sp. 5. ab ectropio, sp. 6. ab anchylope, sp. 7. sebacea, sp. 11. lactea, sp. 13.

PTYALISMUS. (119)

Fluxus salivæ.

Ptyalismus, S. gen. 261. Lin. 176. Vog. 103. Sag. 197.

Si quis ptyalismus idiopathicus sit, pro eo habere vellem Ptyalismum a laxitate, S. sp. 4.

Sequentes

* *Ephidrosin* minus recte ad morbos locales relatam esse agnosco; cum autem huic morbo nullum in systemate nostro locum idoneum invenerim, ne prius omitteretur, hic cum aliis quodammodo affinis morbis évacuatoriis recensui.

PTYALISMUS. (119)

Sequentes omnes symptomaticae sunt,

Ptyalismus nauseosus, S. sp. 1. hypochondriacus, sp. 8. gravidorum, sp. 14. a pyroxi, sp. 2. Lapponicus, sp. 3. febrilis, sp. 18. variolosus, sp. 6. arthriticus, sp. 9. pthificus, sp. 10. scorbuticus, sp. 7. catarrhalis, sp. 15. aphthosus, sp. 13. a carie, sp. 16. purulentus, sp. 12. a calculo, sp. 17. syphiliticus, sp. 19. viridis, sp. 11. urinosus, sp. 20. mercurialis, sp. 5.

ENURESIS. (120)

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. gen. 264. Lin. 195. Vog. 113. Sag. 200.

1. Enuresis (*atonica*) post morbos sphincterem vesicae laedentes.

Enuresis, herniosorum, S. sp. 3. puerperarum, sp. 5. calculosa, sp. 7. a fistula, sp. 8.

2. Enuresis (*irritata*) a compressione vel irritatione vesicae.

Enuresis gravidarum, S. sp. 4. catamenialis, sp. 6. a sparganosi, sp. 9.

Symptomatica est, Enuresis paralytica, S. sp. 2.

Pro morbo non haberi potest Enuresis infantum, S. sp. 1.

GONORRHOEA. (121)

Humoris ex urethra, in maribus, cum vel absque libidine, praeter naturam fluxus.

Gonorrhoea, S. gen. 268. Lin. 200. Vog. 118. Sag. 204.

1. Gonorrhoea (*pura*) in qua, praegresso concubitu impuro nullo, humor puriformis, sine dysuria vel libidine, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea pura, sp. 1. G. benigna Auctorum.

2. Gonorrhoea (*impura*) in qua, post concubitum impurum, humor puriformis cum dysuria ex urethra fluit.

Gonorrhoea syphilitica, S. sp. 4. maligna Auctorum.

Hujus sequela est,

Gonorrhoea (*mucosa*) in qua, post gonorrhoeam impuram

GONORRHOEA. (121)

ram, humor mucosus, cum minima vel nulla dysuria, ex urethra subinde fluit.

Anglis, a *Gleet*.

3. Gonorrhoea (*laxorum*) in qua, humor plerumque pellucidus, sine penis erectione. sed cum libidine, in vigilante, ex urethra subinde fluit.

Gonorrhoea libidinosa, S. sp. 2.

4. Gonorrhoea (*dormientium*) in qua liquor seminalis cum erectione et libidine, in dormientibus, ex fomnio libidinoso, ejicitur.

Gonorrhoea oncirogenos, S. sp. 3.

Species spuriae, utpote in quibus ex urethra fluxus non fit,

Gonorrhoea spuria, S. sp. 5. Astruc, lib. 3. cap. 3. § 2. G. balani, sp. 6.

ORDO V. EPISCHESES.

Excernendorum suppressiones.

Epischeses, Vog. cl. iii.

Suppressorii, Lin. cl. viii. ord. ii.

Suppressiones, Sag. cl. vi.

OBSTIPATIO. (122)

Dejectio faecum nulla vel solito rarior.

Obstipatio, Lin. 166. Vog. 128. Sag. 221.

1. Obstipatio (*debilium*) in hominibus laxis, debilibus, et plerumque dyspepticis.
2. Obstipatio (*rigidorum*) in hominibus fibrae rigidae saepe hypochondriacis.
3. Obstipatio (*obstructorum*) cum symptomatis Colicae imae, 2dae, 4tae, vel 7mae supra dictae.

ISCHURIA. (123)

Urinae suppressio absoluta.

Ischuria, S. gen. 293. Lin. 167. Vog. 129. Sag. 212. Home's Clinical Experiments, sect. xv. Lond. Med. Obs. v, Append.

1. Ischuria

ISCHURIA. (123)

1. Ischuria (*renalis*) praegresso renum morbo, cum dolore vel molesto gravitatis sensu in regione renum, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae; hinc*

- a. Nephritica, a renum inflammatione, S. sp. 1.
- b. Nephrolithica, a renum calculo, sp. 2. Edinb. Med. Eff. ii. 31.
- c. Nephroplethorica, a plethora, sp. 3.
- d. Lunatica, periodica, sp. 4.
- e. Nephrospastica, spasmodica, sp. 5.
- f. Nephrelmintica, verminosa, sp. 6.
- g. Nephrothromboides, a sanguine congrumato, sp. 7.
- h. Nephropyica, a renum purulentia, sp. 8.
- i. Nephrophlegmatica, pituitosa, seu mucosa, sp. 9.
- k. Nephroplegica, paralytodæa, sp. 10.
- l. Suppleta, ab alia evacuatione suppleta, sp. 11.

2. Ischuria (*ureterica*) praegresso renum morbo, cum doloris vel molestiae sensu in quadam ureteris parte, et sine hypogastrii tumore, vel ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae; hinc

- a. Ureteritica, inflammatoria, sp. 12.
- b. Ureterolithica, calculosa, sp. 13.
- c. Ureterothromboides, a sanguinis grumo, sp. 14.
- d. Ureterophlegmatica, a pituita, S. sp. 15.
- e. Ureteropyica, purulenta, sp. 16.
- f. Ureterostomatica, ab orificii ureterum inferioris clausura, sp. 17.

3. Ischuria (*vesicalis*) cum tumore hypogastrii, dolore ad cervicem vesicae, et frequenti ad mingendum stimulo.

Variat pro varietate causae; hinc

- a. Cystitica, a vesicae inflammatione, S. sp. 18.
- b. Cystolithica, a vesicae calculo, sp. 19.
- c. Cystospastica,

* Doctissimi Cussoni Collectanea egregia de ischuria, licet ad leges nosologiae methodicae minus confecta, non prorsus omittenda putavi. Simul autem metuens, ne iis in hoc secundo tomo locus commodus esset, in tomo primo cum systemate Sauvagesiano inserui. Cum vero hic specierum ischuriae characteres nosologicos dare volui, ut tota res sub uno conspectu appareret, species Cussoni summam hic repetere placuit. Loca autem auctorum, in quibus ischuriae varia exempla inveniri possunt, ex primo tomo adhuc petenda sunt. Vid. pag. 37. et seq.

ISCHURIA, (123)

- c. Cystospastica, a sphincteris vesicae spasmō, sp. 20.
 - d. Cystoplegica, a vesicae paralyfi, sp. 21.
 - e. Polyurica, a vesica distenta lotio diutius cohibita, sp. 22.
 - f. Cystopyica, purulenta, sp. 23.
 - g. Cystothromboides, a sanguinis grumo, sp. 24.
 - h. Cystophlegmatica, a muco, sp. 25.
 - i. Ectopocystica, a vesicae ectopia, sp. 26.
 - k. Cystoproctica, ab intestino recto scybalis, calculo, flatibus, inflammatione, abscessu, hæmorrhoidibus, turgente, sp. 27.
 - l. Hyterocystica, ab utero, sp. 28.
 - m. Atretarum, a menstruis in vagina retentis, sp. 29.
 - n. Paradoxa, sp. 30.
4. Ischuria (*urethralis*) cum tumore hypogastrii, frequenti ad mingendum stimulo, et dolore in aliqua parte urethrae.

Variat pro varietate causae; hinc

- a. Perinaealis, a perinaei tumore, sp. 31.
- b. Urethrolithica, a calculo urethrae impactō, sp. 32.
- c. Urethrophlegmatica, a muco urethram infarciēte, sp. 33.
- d. Urethrothromboides, a sanguinis grumo urethram opplente, sp. 34.
- e. Urethropyica, a pure urethram obstruente, sp. 36.
- f. Urethrohymenodes, a membrana in urethram impacta, sp. 36.
- g. Urethrelmintica, verminosa, sp. 37.
- h. Urethritica, ab urethrae inflammatione, sp. 38.
- i. Carunculosa, a morbis ut vocant urethrae, sp. 39.
- k. Hydrocelodes, ab urethrae ruptura in scrotum hiantē, sp. 40.
- l. Cryptopyica, a penis intra corpus retractione, sp. 41.
- m. Peridesmica, a vinculo strictiori peni injecto, sp. 42.
- n. Phimosica, a phimosi, sp. 42.
- o. Aspadialis, ab urethrae clausura, sp. 44.

DYSURIA. (124)

Dolorifica et quodammodo impedita urinae emissio.

Dysuria,

DYSURIA. (124)

Dysuria, S. gen. 265. Lin. 57. Vog. 164. Sag. 213.
Stranguria Auctorum.

1. Dysuria (*ardens*) cum ardore urinae sine morbo vesicae evidente.

Dysuria primaria, S. sp. 5. a cantharidibus ingestis vel applicatis. arsuria, sp. 7. neonympharum, sp. 14.

2. Dysuria (*spasmodica*) a spasmo ex aliis partibus cum vesica communicato.

Dysuria hysterica, S. sp. 1. rachialgica, sp. 11. diabetica, sp. 17. nephralgica, sp. 3.

3. Dysuria (*compressionis*) a vicinis partibus vesicam prementibus.

Dysuria gravidarum, S. sp. 13. a cystocele, sp. 8. ab hysteroloxia, sp. 10. atretarum, sp. 16.

4. Dysuria (*phlogistica*) a vicinis partibus inflammatis.

Dysuria ab hysteritide, S. sp. 9. haemorrhoidalis, sp. 6. venerea, sp. 4. a caruncula, sp. 5.

5. Dysuria (*irritata*) cum signis calculi vesicalis.

Dysuria calculosa, S. sp. 12.

6. Dysuria (*mucosa*) cum excretionem mucii copiosa.

Glus, Lin. 200.

Pyuria mucosa, S. sp. 6.

Pyuria viscida, S. sp. 5.

Rarus vesicae morbus, Hoffm. T. IV. Consult. Med. Centur. II. cas. XCIII.

Catarrhus vesicae Lieutaud. Syn. p. 272.

Pyuria arthritica, S. sp. 9.

De dysuria ab infectis, S. sp. 15. mihi non fatis liquet.

DYSPERMATISMUS. (125)

Seminis in actu venereo tarda, impedita, et ad generationem insufficiens emissio.

Dyspermatismus, S. gen. 260.

Sterilitas, Lin. 171. Sag. 211.

Agenesia, Vog. 283.

1. Dyspermatismus (*urethralis*) a morbis urethrae, S. sp. 1.

2. Dyspermatismus (*nodosus*) a nodis corporum cavernosorum, S. sp. 2.

3. Dyf-

DYSERMATISMUS. (125)

3. Dysermatismus (*praeputialis*) ab angustiori praeputii orificio, S. sp. 3.
4. Dysermatismus (*mucosus*) a muco urethram infarciente, S. sp. 4.
5. Dysermatismus (*hypertonicus*) a validiori penis erectione, S. sp. 5. Edinb. Eff. I. 35.
6. Dysermatismus (*epilepticus*) ab epilepsia spasmodica in coitu adveniente, S. sp. 6.
7. Dysermatismus (*apraetodes*) a genitalium ignavia, S. sp. 7.
8. Dysermatismus (*refluus*) in qua nulla feminis in coitu emissio, ob refluxum ejusdem ex urethra in vesicam, S. sp. 9.

De dysermatismo feroso, S. sp. 8. mihi non satis constat.

AMENORRHOEA. (126)

Menses tempore quo fluere solent, vel solito parciore, vel non omnino fluentes, citra graviditatem.

Amenorrhoea, Vog. 130.

Dysmenorrhoea, Lin. 168. Sag. 218.

1. Amenorrhoea (*emanfionis*) in puberibus quibus post fluxus tempus solitum, menses non jam prodierint, et cum simul variae affectiones morbidae adsint.
2. Amenorrhoea (*suppressionis*) in adultis, quibus menses, quae jam fluere solebant, suppressae sunt.
3. Amenorrhoea (*difficilis*) in qua menses parcius et cum dolore fluunt.

Menorrhagia difficilis, S. sp. 1.

ORDO VI. TUMORES.

Partis magnitudo aucta sine phlogosi.

Tumores protuberantes, Lin. cl. x. ord. v.

ANEURISMA. (127)

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. gen. 32. Lin. 282. Vog. 408. Sag.

35.

U u

VARIX.

VARIX. (128)

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. gen. 33. Lin. 282. Vog. 407. Sag. 36.

ECCHYMOMA. (129)

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. gen. 6. Vog. 451. Sag. 5.

Sugillatio, Lin. 230.

SCHIRRUS. (130)

Partis, plerumque glandulae, tumor durus, non dolens, ægre suppurans.

Schirrus, S. gen. 14. Lin. 283. Vog. 374. Sag. 19.

Boerh. 392.

CANCER. (131)

Tumor schirrodeus dolens, in ulcus mali moris abiens.

Cancer, S. gen. 20. Vog. 375. Boerh. 492. Sag. 25.

BUBO. (132)

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, Lin. 271.

Bubo, S. gen. 16. Vog. 368. Sag. 21.

Parotis, S. gen. 17. Vog. 370. Sag. 22.

SARCOMA. (133)

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. gen. 23. Lin. 294. Vog. 376. Sag. 28.

Polypus, Vog. 377.

Porrus, Vog. 427.

VERRUCA. (134)

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. gen. 25. Lin. 277. Vog. 426. Sag. 30.

CLAVUS. (135)

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, Lin. 278. Vog. 428.

Callus five Tylloma, 429.

LUPIA. (136)

Extuberatio subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

Lupia, S. gen. 37. Sag. 40.

Atheroma, Lin. 285.

Encystis, Vog. 420.

GANGLION.

GANGLION. (137)

Extuberatio durior, mobilis, tendini infidens.

Ganglion, Lin. 287. Vog. 379.

HYDATIS. (138)

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. gen. 34. Sag. 38.

Phlyctaena, Lin. 273. Vog. 442.

HYDARTHROS. (139)

Articulorum, genu potissimum, tumor, parum primo emi-
nens, cuti concolor, dolentissimus, et mobilitatem immi-
nuens.

Hydarthrus, S. gen. 38.

Anglis, a *White Swelling*.

Reimarus de fango articulorum, Leid 1757.

Cheston Path. Inq. chap. v.

Edinb. Ess. iv. 18. 19. 20.

EXOSTOSIS. (140)

Tumor durus ossi infidens.

Exostosis, S. gen. 29. Lin. 290. Vog. 417. Sag. 34.

Hyperostosis, Vog. 418.

ORDO VII. ECTOPIÆ.*

Pars ex sua sede dimota tumorem faciens.

Ectopiae, S. cl. i. ord. vi. Sag. cl. i. ord. vi.

HERNIA. (141)

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, Lin. 291. Gaub. Pathol.

PROLAPSUS. (142)

Partis mollis ectopia nuda.

Prolapsus, Lin. 292.

Prolapsus et procidentia, Gaub. Pathol.

LUXATIO. (143)

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, Gaub. 226. Vog. 472.

Exarthrema,

* Ectopiarum genera et species, quantum ad pathologiam pertinent, opera fo-
lertissimi Cussoni, enumerata in pag. 8va. et seq. inveniri, et summa cum fructu
perlegi possunt.

Exarthrema, S. 60. Sag. 67.
 Diastasis, S. 61. Sag. 68.
 Luxatura, Lin. 237.

ORDO VIII. DIALYSES.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

Plagae, S. cl. i. ord. vii. Sag. cl. ii.
 Vitia dialytica et solutiones continui, Lin. cl. xi. ord.
 ii.
 Exulcerationes, Lin. cl. xi. ord. iii.
 Diffolutiones, Vog. cl. x. ord. vi.

VULNUS. (144)

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis, a corpore duro
 moto.

Vulnus, S. gen. 63. Lin. 241. Vog. 465. Sag. 78.
 Boerh. 145.
 Punctura, S. gen. 64. Lin. 243. Sag. 79.
 Laceratura, Lin. 242.
 Amputatura, S. gen. 70. Lin. 243. Sag. 86.

ULCUS. (145)

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. gen. 71. Lin. 250. Sag. 89.
 Exulceratio, S. gen. 72. Sag. 90.
 Sinus, S. gen. 73. Vog. 492. Sag. 92.
 Fistula, S. gen. 74. Lin. 254. Vog. 491. Sag. 91.
 Boerh. 413.
 Cacoethes, Lin. 250. Vog. 485.
 Phagedaena, Vog. 488.
 Moma, Lin. 251. Vog. 489.
 Carcinoma, Lin. 252. Vog. 487.
 Ozaena, Lin. 253. Vog. 500.
 Achor, Lin. 265. Vog. 494.
 Crusta, Vog. 494.
 Therioma, Vog. 486.
 Sycofis, Vog. 390.

HERPES. (146)

Phlyctenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dy-
 sepuleta.

Herpes, S. gen. 7. Lin. 269. Vog. 443. Sag. 11.

TINEA.

TINEA. (147)

In cute capillata ad radices capillorum ulcuscula, humorem,
in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, Lin. 263. Vog. 497. Sag. 131.

PSORA. (148)

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male
habens.

Psora, Lin. 266.

Scabies, S. gen. 304. Vog. 444. Sag. 130.

FRACTURA. (149)

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. gen. 67. Lin. 235. Vog. 468. Sag. 98.
Boerh. 339.

CARIES. (150)

Offis exulceratio.

Caries, S. gen. 77. Lin. 493. Sag. 94.

CATALOGUS.

CATALOGUS

Morborum a nobis omifforum, quos omiffiffe fortaffis non oportebat. Vide Prolegomena, pag. 210.

Aglactatio, Lin. Agalaxis, Vog. Alopecia. Anchylops. ~~Egilops.~~ Anchylofis, Lin. Anchylofis, Vog. Angina, Sag. et Lin. Angina pectoris Antipathia. Beriberia. Cardiogmus. Cephalæa. Cephalalgia. Distortio. Aglutitio. Acataposis. Oefophagismus. Dystocia. Parturitio, et alii gravidarum et parturientium morbi. Elcosis. Effera. Hemicrania. Leucorrhoea ex vitio locali. Lithiasis in organis uropoeticis, et in aliis corporis partibus. Malis. Cocyta, Lin. Melæna. Melasicterus. Melanchlorus, Vog. Myocœlites. Necrosis. Odaxismus. Dentitio, et alii infantum morbi. Paralyfis partis singularis ex vitio musculorum. Physocephalus. Pnigma. Catarrhus suffocativus. Pyuria. Puoturia. Sterilitas utriusque sexus. Acyifis, Vog. Stymatofis. Tarantismus. Venena. Vermes.

CATALOGUS

Specierum Sauvagesii, quae in systemate nostro sub nominibus genericis diversis inveniuntur.

Amaurosis a myosi, a synchyfi, Amblyopia hydrophthalmica, *Caligo*. Amphimerina anginosa, *Cynanche*. A. biliosa, cardiaca, epiala, hæmitritæus, humorosa, hungarica, paludosa, phricodes, pseudo-hæmitritæus, semiquintana, syncopalis, *Tertiana*. A. catarrhalis, tussiculosa, *Catarrhus*. A. peripneumonica *Pneumonia*. A. semiquartana, spasmodica, *Quartana*. A. tussiculosa, *Pertussis*. Angina spasmodica, *Trismus*. Aphonia paralytica, *Paralyfis*. Arthritis rheumatica, *Podagra*. Ascites flatulento-peritonæus, *Tympanites*. Ascites, uterinus, sanguineo-uterinus, *Hydrometra*. Asphyxia a carbone, congelatorum, flatulenta, foricariorum, a fumis, hysterica, immerforum,

rum, a mephitide, a musto, a pathemate, fideratorum, spinalis, suspenforum, et Asthenia a hydrocephalo, *Apoplexia*. Asthma catarrhale, febricosum, a gibbo, metallicum, pneumodes, a polypo cordis, pulverulentorum, *Dyspnoea*. Atrophia febrile, infantilis, rachitica, *Tabes*.

C.

Cardialgia inflammatoria, *Gastritis*. C. sputatoria, *Pyrosis*. Catarrhus Bellinsulanus, *Cynanche*. Cephalæa febricosa, Cephalalgia intermittens, *Quotidiana*. C. catarrhalis, *Catarrhus*. C. inflammatoria, *Phrenitis*. Cholera sicca auriginosa, *Colica*. Convulsio Indica, *Tetanus*. C. a nervi punctura, *Trismus*. C. raphania, ab ustilagine, *Raphania*.

D.

Diarrhœa carnosa, *Dysenteria*. Dysenteria a catharticis, a mesenterii vomica, Parisiaca, *Diarrhoea*.

E.

Eclampsia febricosa, *Tertiana*. E. typhodes, *Raphania*. Enteritis mesenterica, *Peritonitis*. Ephemera Britannica, sudatoria, *Typhus*. E. dichomene, Vid. Erraticae. Epilepsia febricosa, *Tertiana*. Erysipelas ambustio, symptomaticum, a veipis, *Phlogosis*.

H.

Hepatalgia apostematosa, *Hepatitis*. Herpes Zoster, *Erysipelas*. Hydrometra ovarii, *Ascites*. Hysteralgia febricosa, *Quotidiana*. Hysteria febricosa, *Tertiana*.

I.

- Ischias ex abscessu, *Arthropuosis*. I. intermittens, *Quotidiana*.

L.

Lumbago apostematosa, ab arthrocace, ploadica, *Arthropuosis*.

M.

Menorrhagia difficilis, *Amenorrhoea*. Miliaris nautica, purpurata, sudatoria, *Typhus*. Mutitas a glossolyfi, *Paralysis*.

N.

Nephralgia arenosa, arthritica, calculosa, purulenta, *Nephritis*. N. febricosa, *Quotidiana*. N. rheumatica, *Rheumatismus*.
Ophthalmia

O.

Ophthalmia febricosa, *Quotidiana*. Orthopnœa hysterica, spasmodica, *Asthma*.

P.

Phrenitis apyreta, inanitorum, *Mania*. Pleuritis hepatica, *Hepatitis*. P. periodica, splenica, *Splenitis*. Pleurodyne parapleuritis, verminosa, *Pneumonia*. P. vomica, *Vomica*. Psudracia a vespis, *Phlogosis*. Pyuria arthritica, mucosa, viscida, *Dysuria*.

Q.

Quotidiana deceptiva, epileptica, soporosa, *Tertiana*.

S.

Scelotyrbe festinans, verminosa, *Convulso*. Scrophula mesenterica, *Tabes*. Splenalgia suppuratoria, *Splenitis*. Synocha catarrhalis, *Catarrhus*. S miliaris, dysenteriodes, *Synochus*. Synochus hiemalis, pleuritica, rheumatizans, scorbutica, *Synocha*.

T.

Tabes dorsalis, a hydrope, nutricum, a sanguifluxu, sudatoria, syphilitica, *Atrophia*. Tetanus, febricosus, *Tertiana*.

INDEX GENERUM.

Numeri indicant paginam.

A.

ABORTIO, 90.
Abortus, 31, 65, 159.
Abscessus, 68, 112.
Acataposis, 95.
Achlys, 101.
Achor, 71, 122.
Acrochordon, 117.
Acyefis, 104.
Addephagia, 106.
Adiapneustia, 164.
Adipsia, 24, 58, 104, 174, 326.
Adynamia, 100.
Aedopsophia, 34, 163.
Aegilops, 123.
Aestus volaticus, 99.
Agalaxis, 93.
Agenesia, 104.
Ageusia, 23, 58, 173, 323.
Agalactatio, 63, 164.
Agglutitio, 62.
Agomphyasis, 121.
Agrypnia, 31, 59, 105, 192.
Algor, 26, 155.
Allotriophagia, 106.
Alopecia, 44, 75, 125, 153.
Alvifluxus, 197.
Amatoria, 82.
Amaurosis, 23, 58, 101, 173, 319.
Amblyopia, 23, 58, 101, 172.
Ambustio, 146.
Amenorrhœa, 93, 337.

X x

Amentia,

- Amentia, 30, 55, 110, 192, 300.
 Amnesia, 31, 192.
 Amphimerina, 15, 50, 187.
 Amputatio, 145.
 Amputatura, 13, 69.
 Anacatharsis, 33, 162.
 Anæsthesia, 23, 58, 173, 323.
 Anaphrodisia, 24, 174, 326.
 Anapleuris, 121.
 Anasarca, 35, 66, 108, 148, 308.
 Anatrope, 104.
 Ancyloblepharon, 123.
 Ancyloglossum, 123.
 Anchylomerisma, 143.
 Anchylops, 113.
 Ancylosis, 73, 123.
 Aneurisma, 7, 72, 116, 138, 337.
 Angina, 22, 53, 85, 165.
 ——— convulsiva, 98.
 Angone, 98.
 Anhelatio, 62.
 Anomia, 110.
 Anodynia, 104.
 Anorexia, 24, 58, 104, 174, 325.
 Anosmia, 23, 58, 102, 173, 322.
 Anthrax, 6, 72, 112, 136.
 Antipathia, 30, 56, 105, 190.
 Anxietas, 26, 56, 94, 155.
 Apella, 75, 126, 143.
 Apepsia, 104.
 Aphonia, 24, 58, 102, 174, 326.
 Aphtha, 49, 123, 180, 261.
 Aphthosa, 85.
 Apnoea, 103.
 Apogeusis, 102.
 Apogeusia, 105.
 Apomyttosis, 20, 168.
 Apoplexia, 25, 57, 100, 274.
 Apoplectica, 88.
 Apostema, 7, 138, 238.
 Apofyrma, 121.
 Aquula, 118.
 Archoptoma, 115.
 Arctura, 71.

Ardor,

Ardor, 26, 155.
 Argemon, 122.
 Aridura, 35, 68, 148.
 Artetiscus, 127.
 Arthritis, 26, 54, 94, 154, 198.
 Arthrocece, 13, 70, 146.
 Arthrodynia, 252.
 Arthropuosis, 254.
 Asaphia, 102.
 Ascites, 36, 66, 108, 149, 310.
 Asphyxia, 25, 57, 103, 175.
 Astodes, 83.
 Asthenia, 25, 57, 100, 175.
 Asthma, 22, 62, 103, 171, 201, 289.
 Atecnia, 58.
 Atheroma, 73, 116.
 Athymia, 109.
 Atocia, 96.
 Atonia, 58.
 Atreta, 75, 126.
 Atrophia, 35, 66, 107, 147, 202, 305.
 Attritio, 121.
 Aurigo, 43, 152.

B.

Bacchia, 71, 135.
 Balbuties, 102.
 Batrachus, 102.
 Beriberia, 21, 60, 169.
 Blaefitas, 102.
 Bläterismus, 102.
 Blepharoptosis, 8, 139.
 Blepharotis, 111.
 Blestrismus, 94.
 Boa, 119.
 Bombus, 106.
 Borborismus, 59.
 Bronchocele, 6, 113.
 Bubo, 5, 72, 113, 136, 338.
 Bubonoccele, 115, 140.
 Bulimia, 29, 56, 190, 323.
 Bulimus, 105.
 Bullosa, 85.

Cachefcia,

C.

- Cachexia, 67, 107.
 Cacoethes, 70, 121.
 Cacophonia, 174.
 Cacofitia, 56.
 Caligo, 23, 105, 173, 318.
 Callus, 117.
 Calvities, 125.
 Cancer, 6, 113, 137, 202, 338.
 Canities, 125.
 Capistrum, 99.
 Caput obstipum, 124.
 Carcinoma, 42, 70, 122, 150.
 Cardialgia, 27, 53, 95, 156.
 Cardiognus, 27, 95, 156.
 Carditis, 18, 86, 182, 246.
 Carebaria, 94.
 Caries, 13, 70, 122, 146, 341.
 Carphologia, 20, 60, 109, 167.
 Carus, 25, 57, 100, 176.
 Cataclasis, 98.
 Catalepsis, 25, 59, 100, 176.
 Cataphora, 25, 57, 101, 176.
 Cataplexis, 94.
 Cataracta, 23, 58, 101, 173.
 Catarrhalis, 88.
 Catarrhexis, 89.
 Catarrhus, 26, 90, 155, 269.
 ——— suffocativus, 103.
 Catoche, 100.
 Catochus, 19, 59, 97, 167, 200.
 Caufos, 83.
 Cedma, 96.
 Celsa, 106.
 Cephalæa, 27, 94, 155.
 Cephalalgia, 27, 53, 94, 155.
 Cephalitis, 18, 184.
 Cercosis, 125.
 Cerion, 122.
 Chemosis, 85.
 Chilon, 113.
 Chlorosis, 43, 67, 107, 152, 282.

Cholera,

- Cholera, 32, 64, 91, 160, 295.
 Cholerica, 64, 83.
 Cholosis, 125.
 Choreia, 60, 98, 286.
 Chylaria, 91.
 Cicatrix, 75, 123.
 Cillofis, 98.
 Cinclefis, 98.
 Cionis, 95.
 Cirfocele, 116.
 Citta, 56.
 Clamor, 98.
 Clangor, 102.
 Claudicatio, 20, 168.
 Clavus, 72, 94, 117, 338.
 Clitorismus, 74.
 Clunefia, 96.
 Cocyta, 70.
 Coeliaca, 32, 64, 91, 160.
 Coilima, 113.
 Colica, 27, 53, 95, 156, 199, 292.
 Coloboma, 125.
 Colpoccele, 141.
 Colpoptosis, 140.
 Coma, 101, 201.
 Combustura, 69.
 Condyloma, 6, 73, 113, 137.
 Contractura, 19, 74, 167, 330.
 Contusio, 12, 121, 144.
 Contufura, 69.
 Convulsio, 20, 60, 97, 168, 200, 285.
 Cophosis, 23, 58, 173.
 Coryza, 33, 63, 90, 161.
 Crampus, 19, 98, 167.
 Crepitus, 65.
 Cripforchis, 126.
 Crithe, 118.
 Crusta lactea, 122.
 Cyasma, 120.
 Cynanche, 18, 52, 181, 240.
 Cynorexia, 106.
 Cyphosis, 124.
 Cyrtoma, 115.
 Cystitis, 87.
 Cystirrhagia,

Cystirrhagia, 90, 268.
 Cystitis, 17, 51, 87, 183, 250.
 Cystocele, 10, 115.
 Cystoptosis, 115.

D.

Dacryoma, 123.
 Dactylion, 123.
 Daemonia, 55.
 Daemonomania, 30, 192.
 Decimana, 81.
 Deliquium, 201.
 Delirium, 55, 109.
 Deuteria, 93.
 Diabetes, 33, 65, 91, 162, 297.
 Diabrosis, 121.
 Diachalasis, 121.
 Diaphthora, 104.
 Diaphragmitis, 182.
 Diaria, 49.
 Diarrhoea, 32, 64, 90, 160, 295.
 Diastasis, 12, 142.
 Digitium, 68, 99, 158.
 Dionysiscus, 126.
 Diplopia, 29, 189.
 Distortio, 74.
 Distrix, 125.
 Diuresis, 91.
 Dolor capitis, 198.
 ——— ventriculi, 199.
 Duplicana, 50.
 Dyscoeca, 23, 101, 173, 321.
 Dysenteria, 32, 64, 91, 159, 272.
 Dyshæmorrhœis, 165.
 Dyslochia, 63, 93, 164.
 Dysmenorrhœa, 63, 96, 165.
 Dysodia, 34, 92, 163.
 Dysopia, 105, 320.
 Dyspepsia, 104, 280.
 Dyspermatismus, 34, 336.
 Dysphagia, 27, 165, 329.
 Dyspnoea, 22, 62, 103, 171, 201, 290.
 Dysstocia, 28, 96, 165.

Dysuria,

Dysuria, 33, 54, 95, 164, 335.

E.

Ecchymoma, 4, 119, 134, 338.

Eclampsia, 20, 97, 169, 200.

Ecphyse, 92.

Ecplexis, 110.

Ecstasis, 25, 109, 176.

Ecthlymma, 121.

Ecthymata, 112.

Ectropium, 74, 124.

Eilema, 95.

Elcosis, 44, 153.

Elephantia Arabum, 108.

Elephantiasis, 43, 108, 151, 316.

Elodes, 83.

Elytrocele, 115.

Emphysema, 5, 68, 115, 136, 202.

Empyema, 22, 62, 112, 172, 201, 246.

Encanthis, 117.

Encauma, 119.

Encaufis, 95, 111.

Encephalocele, 11, 114, 142.

Encystis, 116.

Enteritis, 17, 51, 86, 183, 248.

Enterocoele, 10.

———— ovularis, 115.

Enthusiasmus, 110.

Entropium, 124.

Enuresis, 33, 65, 91, 162, 332.

Ephelis, 4, 75, 118, 134.

Ephemera, 14, 82.

Ephialtes, 21, 62, 170.

Ephidrosis, 33, 161, 331.

Epiala, 82.

Epidosis, 143.

Epilepsia, 21, 60, 97, 169, 200, 287.

Epinyctis, 5, 118, 135.

Epiphlogisma, 96.

Epiphora, 33, 63, 90, 161, 331.

Epiplocele, 10.

Epiploitis, 17, 183.

Epistaxis, 89, 263.

Episthotonos, 97.

Epulis,

- Epulis, 113.
 Erotomania, 56.
 Errana, 50.
 Erratica, 15, 188, 227.
 Erysipelacea, 87.
 Erysipelas, 16, 49, 111, 179, 258.
 Erythema, 5, 136.
 Eschara, 13, 72, 121, 146.
 Etoche, 118.
 Effera 17, 179.
 Exania, 9, 139.
 Exarthrema, 11, 142.
 Excoriatio, 12, 144.
 Excoriatura, 69.
 Exoche, 118.
 Exocyste, 9.
 Exocystis, 139.
 Exomphalus, 7, 139.
 Exoneirofis, 92.
 Exophthalmia, 8, 139.
 Exostosis, 6, 73, 126, 138, 339.
 Expectoratio, 64.
 Exulceratio, 13, 116.

F.

- Fatuitas, 110.
 Favus, 122.
 Febris continua, 194.
 ----- intermittens, 195.
 ----- remittens, 95.
 ----- exanthematica 195,
 ----- Hæctica, 196.
 Fissura, 12, 120, 147.
 Fistula, 13, 70, 122, 146.
 Flatulentia, 34, 62, 93, 163.
 Flemen, 117.
 Fletus, 61.
 Fluxus humoralis, 198.
 Fractura, 12, 69, 120, 147, 341.
 Framboesia, 42, 151, 316.
 Frigeraria, 186.
 Frigus, 97.
 Fungus, 115.

Furor

Furor uterinus, 109.
Furunculus, 6, 112, 136.

G.

Galactia, 65, 92.
Galactirrhœa, 34, 162.
Galbulus, 127.
Galiancôn, 127.
Ganglion, 73, 114, 339.
Gangræna, 44, 68, 109, 153, 238.
Gastrica, 53.
Gastritis, 17, 51, 86, 183, 247.
Gastrocele, 10, 116, 140.
Gastrodynia, 27, 156.
Gelasmus, 99.
Gibber 74. 124.
Gibbositas, 7, 142.
Glaucoma, 101.
Glossagra, 94.
Glossocèle, 98.
Glossocoma, 98.
Glus, 65.
Gonagra, 94.
Gongrona, 113.
Gonorrhœa, 34, 65, 91, 162, 332.
Grando, 118.
Gravedo, 53, 93.
Graviditas, 36, 67, 149.
Grypofis, 125;
Gutta rosea, 4.
—— rosacea, 118.

H.

Hæmalopia, 105.
Hæmataporia, 148.
Hæmatemesis, 31, 64, 89, 158, 268.
Hæmatopedesis, 90.
Hæmaturia, 31, 65, 89, 159, 268.
Hæmeropathos, 135.
Hæmodia, 94.
Hæmoptoe, 89.
Hæmoptysis, 31, 64, 89, 158, 263.
Hæmorrhagia, 31, 63, 89, 158, 197.

Y y

Hæmor-

- Hæmorrhoidalis, 88.
 Hæmorrhoids, 32, 65, 159, 265.
 Hæctica, 14, 50, 88, 187, 235.
 Hemalopia, 101.
 Hemerolopia, 101.
 Hemicrania, 27, 53, 94, 155.
 Hemiplegia, 24, 58, 100, 175.
 Hemitritæa, 50.
 Hepatalgia, 28, 157.
 Hepatica, 53.
 Hepatirrhoea, 32, 89, 159.
 Hepatitis, 18, 52, 86, 184, 248.
 Hepatizon, 75.
 Hepatocele, 10, 116.
 Hermaphroditus, 116.
 Hernia, 73, 339.
 Herpes, 5, 71, 118, 135, 340.
 Hidroa, 5.
 Hieranefos, 60, 97, 200.
 Hieropyr, 111.
 Himantosis, 95.
 Hippos, 60, 98.
 Hirsuties, 75, 125, 143.
 Hordeolum, 6, 72, 118, 137.
 Horror, 97.
 Humoraria, 186.
 Hyarthrus, 7, 138, 339.
 Hydatis, 7, 138, 339.
 Hydrenterocele, 116.
 Hydroa, 119, 135.
 Hydrocele, 114, 311.
 Hydrocephalum, 114.
 Hydrocephalus, 36, 66, 149, 309.
 Hydrocistis, 108.
 Hydriometra, 36, 149, 311.
 Hydromphalos, 114.
 Hydropedefis, 92.
 Hydrophobia, 30, 56, 83, 191, 200, 299.
 Hydrophthalmia, 114.
 Hydrops, 202.
 ——— scroti, 114.
 Hydrorachitis, 36, 149, 309.
 Hydrothorax, 22, 107, 171, 201, 309.
 Hygrosiffocele, 116.

Hyper-

Hypercatharsis, 92.
 Hyperartetiscus, 127.
 Hyperostosis, 116.
 Hypnobatasis, 110.
 Hypochondriasis, 29, 55, 99, 189, 282.
 Hypogastrocele, 115.
 Hypophasis, 101.
 Hypopyon, 112.
 Hypofarca, 66.
 Hypospydiaeos, 126.
 Hypostaphyle, 8, 139.
 Hysteralgia, 28, 54, 96, 157.
 Hysteria, 21, 59, 99, 169, 298.
 Hysteritis, 52, 87, 250.
 Hysterocele, 10, 116.
 Hysteroloxia, 11, 142.
 Hysterophyse, 108.
 Hysteroptosis, 9, 115, 139.

I.

Ictericodes, 83.
 Icterus, 67, 107, 202, 316.
 Ileus, 32, 95, 160.
 Iliaca, 64.
 Illofis, 98.
 Impetigo, 120.
 Incubus, 99.
 Inflammatio, 68, 136, 196.
 Intertrigo, 69, 123.
 Ionthos, 118.
 Ischias, 28, 157.
 Ischiatocele, 115.
 Ischioccele, 141.
 Ischnophonia, 102.
 Ischnotis, 126.
 Ischuria, 36, 63, 93, 164, 199, 333.
 Judicatoria, 186.

L.

Labarium, 74.
 Labium leporinum, 125.
 Laceratura, 69.

Lactes

Lactea, 88.
 Lagocheilos, 125.
 Lagophthalmia, 74.
 Lagophthalmus, 124.
 Lagoftoma, 75, 143.
 Languor, 57.
 Laparocele, 140.
 Lassitudo, 26, 57, 100, 155.
 Leiopodes, 126.
 Leiopothymia, 25, 175.
 Leipyria, 83.
 Lenta, 49, 88.
 Lentigo, 75, 119.
 Leontiasis, 42, 151.
 Lepra, 43, 71, 151, 316.
 ——— Arabum, 108.
 ——— Grecorum, 108.
 Leptophonia, 102.
 Lethargus, 25, 57, 83, 176.
 Leuce, 120.
 Leucoma, 4, 134.
 Leucophlegmatia, 66.
 Leucorrhœa, 33, 65, 92, 162.
 Leucorrhœis, 91.
 Lichen, 120.
 Lienteria, 32, 64, 91, 161.
 Lipothymia, 57, 103.
 Lippitudo, 71.
 Lithiasis, 96, 199.
 Lochiorrhœa, 162.
 Lordosis, 7, 74, 142.
 Loxarthrus, 12, 142.
 Lues Venerea, 202.
 Lumbago, 28, 157.
 Lupia, 7, 138, 338.
 Luxatio, 121, 339.
 Luxatura, 69.
 Lyngodes, 83.

M.

Macropncea, 103.
 Madarosis 125.
 Malacia, 106.

Malacia

Malacosteon, 125.
 Malis, 42, 151.
 Mania, 30, 55, 109, 192, 303.
 Marasmus, 66.
 Marisca, 7, 138.
 Marmaryge, 105.
 Mastodynia, 28, 95, 157.
 Mediaстина, 86.
 Malæna, 32, 159.
 Melanchlorus, 107.
 Melancholia, 30, 55, 109, 192, 301.
 Melasicterus, 43, 152.
 Melasma, 75.
 Meliceris, 116.
 Menorrhagia, 31, 65, 90, 266.
 Menstrua, 81.
 Merocele, 115, 140.
 Mesenteritis, 87.
 Meteorismus, 36, 150.
 Metritis, 17, 185.
 Metrorrhagia, 159.
 Miliaria, 48, 259.
 Miliaris, 16, 84, 179.
 Mola, 65, 127.
 Monstrositas, 126.
 Morbilli, 119.
 Morbillofa, 84.
 Morosis, 58.
 Morphoea, 75.
 Morsura, 69.
 Morsus, 144.
 Morta, 48.
 Mortificatio, 202.
 Mutitas, 24, 102, 174, 327.
 Mydriasis, 101.
 Myocoilitis, 87.
 Myopia, 74.
 Myopiasis, 124.
 Myositis, 182.
 Myrmaecium, 72.

N.

Nævus, 4, 75, 126, 134.

Natta,

Natta, 73.
 Nausea, 32, 64, 95, 160.
 Nebula, 120.
 Necrosis, 44, 153.
 Nefrendis, 127.
 Nephralgia, 28, 157.
 Nephritica, 54.
 Nephritis, 18, 52, 87, 184, 249.
 Noma, 70, 122.
 Nonana, 81.
 Nostalgia, 30, 56, 190, 325.
 Nyctalopia, 74, 101.
 Nymphomania, 30, 191, 325.
 Nyctagmus, 20, 167.

O.

Oblivio, 58, 110.
 Obstipatio, 63, 93, 166, 333.
 Obstipitas, 19, 167.
 Octana, 81.
 Odaxismus, 94.
 Odontalgia, 27, 53, 156, 198, 252.
 Odontorrhoea, 89.
 Oedema, 5, 68, 114, 136.
 Oesophagismus, 99.
 Omentitis, 87.
 Omphalocele, 115, 140.
 Oneirodynia, 304.
 Onychia, 111.
 Onyx, 112.
 Operatio, 145.
 Ophiafis, 125.
 Ophthalmia, 27, 53, 111, 156, 238.
 Ophthalmites, 85.
 Ophthalmorrhagia, 89.
 Opisthotonos, 97.
 Opodeocele, 140.
 Orgasmus, 60.
 Orthopnoea, 22, 62, 103, 171, 201.
 Oscedo, 21, 170.
 Oscheocele, 7, 115.
 Oscheophyma, 139.
 Oscitans, 83.

Oscitatio,

Oscitatio, 61, 103.
 Osteocopus, 96.
 Osteosarcosis, 202.
 Ostocopus, 26, 34, 154, 198.
 Otalgia, 27, 53, 95, 156, 199.
 Otites, 85.
 Otoplatos, 90.
 Otopuosis, 90.
 Otorrhoea, 34, 63, 89, 162.
 Oxyphonia, 102.
 Ozæna, 70, 123.

P.

Pædarthrocace, 116.
 Palpitatio, 20, 59, 99, 168, 288.
 Panaritium, 87.
 Pancreatica, 87.
 Pandiculatio, 20, 61, 103, 168.
 Panophobia, 30, 55, 190.
 Papula, 72, 135.
 Paracentesis, 145.
 Paracufis, 23, 109, 173, 322.
 Paracyifis, 109.
 Paraglossa, 9, 113, 139.
 Paralysis, 24, 58, 100, 174, 201, 277.
 Paraphymosis, 111.
 Paraphonia, 24, 327.
 Paraphrenesis, 17, 51.
 Paraphrenitis, 86.
 Paraphrosyne, 30, 55, 191.
 Paraplegia, 58, 100.
 Paraplexia, 24, 175.
 Paronychia, 6, 70, 111, 137.
 Parorchydium, 11, 142.
 Parotis, 6, 113, 136.
 Parturitio, 65.
 Parulis, 112.
 Pavor, 110.
 Pelada, 125.
 Pelioma, 119.
 Pemphigus, 16, 177, 261.
 Pemphingodes, 85.
 Periadynia, 95.

Pericarditis.

- Pericarditis, 86.
 Perineocele, 141.
 Peripneumonia, 18, 52, 86, 184, 243.
 Peritonitis, 87, 246.
 Peritonæorexis, 141.
 Pernio, 70, 111.
 Pertussis, 292.
 Pestilentialis, 84.
 Pestis, 16, 48, 177, 257.
 Petechia, 48, 119.
 Petechialis, 84.
 Phagedæna, 122.
 Phalacrotis, 125.
 Phalangosis, 125.
 Phantasma, 55, 105.
 Phimosis, 6, 74, 111, 137.
 Phlegmatia, 35, 149.
 Phlegmone, 5, 52, 112, 181.
 Phlogosis, 99, 236.
 Phlycthæna, 72, 118, 135.
 Phlyzacion, 119.
 Phoenigmus, 43, 152.
 Phoxos, 124.
 Phrenismus, 85.
 Phrenitis, 17, 51, 82, 182, 239.
 Phricasmus, 169.
 Phricodes, 83.
 Phthyriasis, 44, 109, 153.
 Phthisis, 35, 66, 107, 147, 264.
 Phygethlon, 112.
 Phyma, 112.
 Physconia, 35, 109, 149, 202, 311.
 Physocèle, 116.
 Physocephalus, 36, 149.
 Physometra, 36, 150, 308.
 Pica, 29, 106, 190, 324.
 Pinnula, 117.
 Piptonychia, 121.
 Pituitaria, 91.
 Pladarotis, 117.
 Plancus, 126.
 Plantus, 126.
 Plethora, 67, 148.

Pleuritica,

Pleuritica, 53.
 Pleuritis, 17, 51, 86, 182, 244.
 Pleurodyne, 22, 171, 199.
 Plica, 75, 108.
 Plicatio, 120.
 Pneumatosis, 35, 95, 114, 148, 307.
 Pneumonia, 242.
 Pneumonica, 53.
 Pnigma, 103.
 Podagra, 96, 252.
 Podagrica, 87.
 Polydipsia, 30, 56, 105, 190, 324.
 Polymerisma, 143.
 Polypus, 113.
 Polysarcia, 35, 66, 126, 148, 202, 306.
 Porriago, 121.
 Porrus, 117.
 Presbytia, 74.
 Pressura, 71.
 Priapismus, 19, 59, 96, 167.
 Proctalgia, 28, 157, 200.
 Proctica, 54.
 Proctitis, 51.
 Proctorrhoea, 161.
 Profusio, 69, 330.
 Prolapsus, 73, 339.
 Proptoma, 9, 139.
 Pruritus, 26, 54, 94, 155.
 Psellismus, 24, 60, 174, 328.
 Psellotis, 102.
 Pseudoblephitis, 320.
 Psophos, 96.
 Psora, 71, 108, 341.
 Psoriasis, 96.
 Psudracia, 5, 135.
 Pterygium, 6, 74, 117, 137.
 Ptilosis, 125.
 Ptosis, 101.
 Ptyalismus, 33, 63, 90, 162, 331.
 Ptyriasis, 121.
 Pudendagra, 28, 54, 158.
 Punctura, 12, 69, 144.
 Puorrhoea, 91.
 Puoturia, 91.

Z z

Purpura,

- Purpura, 16, 119, 178.
 ——— scorbutica, 118.
 Pustula, 72, 134.
 Pyrosis, 27, 156, 292.
 Pyuria, 33, 162.

Q.

- Quartana, 15, 50, 81, 188, 225.
 ——— duplex, 82.
 ——— triplex, 82.
 Quintana, 81.
 Quotidiana, 15, 50, 81, 188, 228.
 ——— continua, 82.

R.

- Rabies, 56, 191.
 Rachialgia, 28, 157.
 Rachitis, 42, 66, 107, 150, 314.
 Rachosis, 123.
 Ranula, 114.
 Raphania, 60, 98, 286.
 Raucedo, 61.
 Raucitas, 102.
 Renschus, 103.
 Rhagas, 13, 69, 120, 146.
 Rhenophonia, 102.
 Rheuma, 22, 171.
 Rheumatica, 88.
 Rheumatismus, 26, 54, 94, 154, 198, 250.
 Rhicnosis, 126.
 Rochmos, 103.
 Rhoeas, 124.
 Rhopalosis, 108.
 Ryffemata, 124.
 Rigor, 20, 60, 97.
 Rifus, 61.
 ——— sardonicus, 99.
 Rodatio, 125.
 Ronchus, 103.
 Rubeola, 16, 48, 178, 256.
 Ructus, 64, 99.

Ruminatio,

Ruminatio, 99.

Ruptura, 13, 69, 120, 145.

S.

Saniodes, 126.

Sarcocele, 116.

Sarcoma, 6, 74, 113, 137, 338.

Sarcoftosis, 202.

Sardiafis, 59, 99.

Satyriafis, 30, 56, 191, 324.

Scabies, 43, 118, 152.

Scarlatæ, 119.

Scarlatina, 16, 84, 178, 256.

Scelotyrbe, 21, 98, 169.

Scirrhus, 5, 73, 113, 136, 338.

Sclopetoplaga, 144.

Scoliosis, 124.

Scorbutus, 43, 67, 108, 151, 202, 315.

Scotomia, 58.

Screatus, 64.

Scrophula, 42, 113, 150, 202, 314.

Seifis, 124.

Seline, 120.

Septana, 81.

Serpigo, 71, 118.

Sextana, 81.

Singultus, 21, 61, 99, 170.

Sinus, 13, 122, 146.

Siriafis, 84.

Soda, 53, 95.

Somnambulismus, 29, 55, 190.

Somnium, 110.

Somnolentia, 57, 101.

Spanopogon, 127.

Sparganosis, 113.

Spasma, 121.

Spasmus, 59.

——— œsophagi, 99.

——— cynicus, 99.

——— maxillæ inferioris, 99.

Sphacelismus, 52.

Sphacelus, 68, 109, 238.

Spina bifida, 114.

Spinola,

- Spinola, 73.
 Splenalgia, 28, 157.
 Splenica, 55.
 Splenitis, 18, 52, 86, 184, 249.
 Splenocele, 116.
 Staphyloma, 7, 117, 138.
 Staphylosis, 117.
 Steatites, 114.
 Steatoma, 116.
 Sterilitas, 63, 164.
 Sternutatio, 21, 61, 98, 170.
 Stertor, 22, 62, 171.
 Stigma, 119.
 Stomacace, 31, 63, 89, 158, 268.
 Strabismus, 19, 74, 124, 166, 329.
 Stranguria, 65, 95.
 Stridor, 60.
 Struma, 73.
 Stupiditas, 110.
 Stupor, 26, 58, 155.
 Stymatosis, 90.
 Subluxatio, 121.
 Subfultus, 60, 168.
 Sudamen, 75.
 Sudamina, 119.
 Sudor, 65.
 Suffocatio, 62.
 ——— hysterica, 98.
 Suffusio, 29, 189.
 Sugillatio, 68.
 Suppuratoria, 88.
 Surditas, 101.
 Suspirium, 61, 103.
 Sufurrus, 105.
 Sutura, 145.
 Sycofis, 122.
 Syncopalis, 83.
 Syncope, 25, 57, 103, 175, 279.
 Synizesis, 101.
 Synocha, 14, 49, 230.
 Synochus, 14, 49, 82, 235.
 Syphilis, 43, 48, 108, 151, 315.
 Syrigmos, 29, 189.
 Syringmos, 55.

T.

- Tabes, 35, 66, 107, 147, 305.
 Talpa, 116.
 Tarantismus, 30, 56, 191.
 Tenesmus, 33, 65, 96, 161.
 Terminthus, 114.
 Tertiana, 15, 50, 81, 188, 219.
 ----- duplex, 82.
 Testudo, 116.
 Tetanus, 19, 59, 97, 167, 200, 283.
 Tetartophya, 15, 50, 187.
 Therioma, 122.
 Thlasia, 120.
 Tinea, 43, 71, 122, 152, 341.
 Tofus, 117.
 Torpor, 100.
 Tortura, 74.
 Trachelophyma, 137.
 Traulotis, 102.
 Tremor, 20, 59, 97, 168, 279.
 Trichiasis, 75, 124.
 Trichoma, 44, 153, 316.
 Trismus, 19, 59, 99, 166, 200, 285.
 Tritæophya, 15, 187.
 Tritæus, 50.
 Tussis, 22, 62, 98, 171.
 Tylloma, 117.
 Tympanites, 36, 67, 108, 150, 202, 307.
 Typhomania, 25, 57, 83, 176.
 Typhus, 14, 187, 231.

V.

- Vaga, 81.
 Valgus, 126.
 Varicella, 85, 119, 256.
 Variola, 16, 48, 119, 177, 255.
 Variolosa, 84.
 Varix, 7, 73, 116, 138, 338.
 Varus, 71, 118, 126, 135.
 Verruca, 6, 72, 117, 137, 338.
 Vertigo, 29, 55, 105, 189.
 Vefania, 55.

Vibex,

Vibex, 75, 120.
Vitiligo, 4, 120, 134.
Ulcus, 13, 70, 145, 340.
Vociferatio, 61.
Volatica, 54, 96.
Vomica, 64, 90, 246.
Vomitus, 32, 64, 99, 160.
Uredo, 49.
Urorrhoeas, 126.
Urticaria, 112, 119, 260.
Urticata, 84.
Vulneraria, 88.
Vulnus, 12, 69, 120, 144, 340.

X.

Xirafia, 125.

Z.

Zoster, 111.
Zunizefis, 123.

F I N I S.

EXCUDEBANT C. STEWART ET SOCIJ.

567050



